





53198 / A

C II

18/w

WAINRIGHT, J.

C

TRACTATUS MECHANICUS

DE
NON NATURALIBUS.

*Qui est brevis explicatio mutationum,
quas in humano corpore producunt
Aër, Diæta, &c. simul cum inquisi-
tione in naturam & usum balneorum.
Quibus præfixa est Doctrina Secretio-
nis, pluribus in propositionibus.*

A Domino Josepho de MARCO Doctore
Medico in Linguam Latinam ex
Anglicâ conversus.



AVENIONE

Apud FRANCISCUM GIRARD, in
Plateâ Sancti desiderii.

M. DCC. XLVIII.

Cum Superiorum permissu.



PRÆFATIO AUCTORIS

AGgredi aliquid in cujuslibet
utilis artis profectum, tum
præprimis verò medentium, quæ
omnium maximè proficua humano
generi est; id est quod quisquis doc-
tus reipublicæ debet; omnis enim
civilis societas jure, singulorum pri-
vata bona, veluti sua considerare;
& in publica commoda potest con-
vertere. An verò sequentes paginae,
prædicto fini respondeant æquissimis
rerum æstimatoribus decernendum
relinquo; nec omnibus, qui se me-
dicos profitentur, quantumvis mag-
ni nominis de certis demonstratis
judiciis ferendi jus debetur: ac li-
cet non sola geometrica ratiocinia
in usum advocem, certus tamen sum
eos qui non parumper Euclidem in-
telligunt, huic operi judicando mini-
mè esse idoneos; neque contendo me-
dicinæ praxim, multò minus quàm

hactenus est , matheseos certitudinis
objectum esse futuram , sed illud au-
deo dicere quotquot hactenus habuit
vel habitura est progressus medicinæ
theoretica pars , ii omnes arithme-
tica & geometria præceptis unice
innixi fuerunt , vel imposterum
regentur.

Hominis corpus machina est ad-
miranda , tantumque artificis ut et
excellentissimi peritiam excedit ,
quantum divina sapientia finita
mentis intelligentiam superat. Ni-
hilominus tamen iisdem subjacet
motus legibus quibus infinita sapiens
Creator universum gubernat.

Componitur ex solidis & fluidis ,
quæ ambo reguntur gravitatis , im-
pulsus & reactionis legibus ; muta-
tiones , quæ in animali æconomia
contingunt , motu materiæ iis legi-
bus recte nullomodo absque mathe-
seos auxilio æstimari possunt.

Axioma est universum receptum

*ibi incipere debere medicum ubi
physicus desinit , & omni procul du-
bio medicus philosophus esse debet ,
verum philosophia quæ ad usque hæc
tempora viguit nihil est aliud quam
heroicorum facinorum fabulosa nar-
ratio si excipiamus quod à celeberrimo
Newtono scriptum fuit & à pau-
cis aliis qui philosophica sua ratio-
cinia mathematicis principiis firma-
runt. Miranda quæ invenit egre-
gius ille vir ratiociniis geometricis,
certa sunt & verè admiratione dig-
na: neque dubito quin , si aliquis
eodem ingenio præditus , simili me-
thodo uteretur in indagandis mor-
borum causis & medicaminum natu-
râ , brevi aliquid æque notabile de-
tegeret in mycrocosmo nostro ac cele-
ber , ille auctor in universo detexit.*

*Specimina nonnulla eorum , quæ
ex tali methodo promanant , habere
possumus in scriptis Borelli : Belli-
ni & in nostrâ insulâ Pitcarnii ,*

Mead & Cheyne , & paucorum ,
qui plura in economia animali pa-
lam fecerunt , quam plurima ante
acta secula se aperuisse gloriari pos-
sint , quam inchoarunt methodum
prælaudati viri , prosecutus sum ip-
se : si quod in apricum protuli , ali-
quam reipublicæ afferat utilitatem ,
erit laboris præmium , sin verò non
culpandus , non enim primus in sus-
ceptis deceptus ero.

Operi præfixi nonnullas propositio-
nes de animali secretione , nedum
ut iterationes evitarem cum sæpè ad
eas recurrere cogar , sed etiam quia
altè siluerunt de hoc , vel parùm lo-
cuti sunt auctores , si excipias quod
in quibusdam ex præfatis auctoribus
invenitur , ad hæc nihil in arte
majorem inquisitionem meretur ,
quàm secretionum doctrina ; cum
perpauci sint affectus qui absque
augmento , vel imminutione alicujus
evacuationis non sanentur.

Capiti de aëre quadam subtexui
cogitata de actione balnei sive frigi-
di sive calidi in corpus humanum ,
effectumque quem producant ex pon-
dere, & frigore vel ex calore &
humiditate aquarum elicui; ad cal-
culum pariter reduxi pondus aqua,
quod in balneo sustinemus, & de-
monstravi jugem perspirati transcutis
poros expulsionem insufficientem im-
pediendo aditui aqua in corpus, dum
aquis nos profundimus. Ostendi pa-
riter quomodo gestatio pannorum la-
neorum debilibus noceat. Cetera in
hoc opere adducta materiae suae con-
gruunt. Quod stylum attinet utut
rudis & incultus, modo capi possit,
satis erit ad propositum, nec diffiteri
possum totam opus in accuratum esse,
ultimamque manum desiderare, mul-
toque magis adhuc impolitum & in-
cultum maneret nisi in illud ins-
pexisset ingeniosus amicus D. Coths.
Verum utut sit, persuasum habeo id

bono consilio fuisse confectum, illud-
que posse si absque præjudicatis opinio-
nibus legatur, ad metam collima-
re, eò usque saltem ut acrioria inge-
nia excitare valeat ad errata emen-
danda & quæ deficiunt addenda.



CAVEAT LECTOR.

Pagina 24. antè capitulum de secretionem, quod est primum hujus operis de morbis ventriculi, omissa fuit sequens introductio.

INTRODUCTIO

QUo accuratiori methodo tradere possim, quæ ex regulari non naturalium usu cum ad sanitatem tuendam tum ad debellandos morbos proveniunt emolumenta explanabo quædam ex magis obviis symptomatis morborum cum chronicorum tum acutorum ut exindè pateat quam benè *non naturalia* à medico perito adhibentur; nedum ad confirmandam valetudinem, sed & ad eam restaurandam, eaque pluries efficaciora esse omnibus illis pharmacis,

quæ officinæ suppeditant.

Plura quam necesse est inveniuntur exempla hominum, qui aëris mutatione aut victûs immoderati in vitæ institutum temperatum (talis fuit Cornarus) vel qui ex diæta carnea in lacteam aut vegetabilem transferunt, vel qui longa suscepunt itinera vel qui sponte excitato vomitu, catharsi vel allecto sudore ab iis liberati fuerint morbis, qui remediis ut ut vi efficacissimâ pol-
lentibus restiterant.

Hunc sequar ordinem primum. non nullas ventriculi ægritudines enucleabo, mox historiam & theoriam trium notabilium morborum. *asthmatis* nempè, *consumptionis* & *hydropis*. Deindè magis conspicua morborum acutorum præsertim febrium symptomata explicabo quædam subnectendo indicia pro meliori stabilienda ad eorum curationem methodo, quam quæ in genere à medicis usurpatur.



TRACTATUS MECHANICUS

D E

NON NATURALIBUS.

*Qui est brevis explicatio mutationum
quas in humano corpore produciunt
Aër , Dieta , &c. simul cum inquisi-
tione in naturam & usum Balneorum.
Quibus prefixa est Doctrina Secretio-
nis , pluribus in propositionibus.*

DE SECRETIONE ANIMALI. PROPOSITIO I.



A inest fluidis proprie-
tas, ut partes habeant exi-
guas sphaericas , aut iis
accedentes leves , vel ta-
les , quæ super se mutuò facilè ex-
currere possint ; & si fluidum ho-
A

2 TRACTATUS

homogeneum fuerit , partes æqualis densitatis habeat oportet. *Borell. propos. 147. de motibus naturalibus à gravitate factis.*

PROPOSITIO II.

Cum undequaque ita premant fluida , ut eorundem pressio perpendicularis sit lateribus vasis atque in omni puncto quaque versum exerceatur, patet secretionem duplici motu absolvendam fore , altero directo , altero transverso.

PROPOSITIO III.

Fluidi heterogenei , si in corpore quieverit , atque ex æquo pressum fuerit , liquidissimæ præprimis partes ex cæterarum consortio cogentur.

PROPOSITIO IV.

Fluidi heterogenei (ut putā sanguis) ex moleculis diversæ den-

MECHANICUS. 3

fitatis coalescentis , per id temporis , quo perficitur coagulatio , particulæ ponderosiores imo , leviores verò sursum petunt , iisque omnibus juxta variam quam obtinent gravitatem specificam propriæ ac peculiare assignantur sedes : atque cum fluidum neutiquam stagnat , sed motu adhuc agitur : sejunctio partium ponderosarum à levioribus proportionata erit tardigrado motui ipsius fluidi.

PROPOSITIO V.

Pars fibrosa , rubra , quiescentis sanguinis hinc inde à lateribus continentis se subducens , in se ipsam quasi delitescit , atque à centro nidulans serum ad circumferentiam vasis expellit.

COROLLARIUM.

Quò segnior est cruoris motus , eò plus feri è sinu suo dimittit.

PROPOSITIO VI.

Maximum objectura sunt obicem fluida illorum corporum (motui,) queis majores respectu habito ad soliditatem, superficies contingerint, vel quod idem est, gravitates specificæ minores fuerint.

PROPOSITIO VII.

Viscidiores liquidi serosi partes, cæteris leviores sunt, id est, partes illæ feri quæ per narium, oris, palati, asperæ arteriæ, ventriculi, intestinorum glandulas fecernuntur, cum aquæ sero minus ponderosæ innatent.

COROLLAR. *ex 2^a precedente propositione.*

Quæ maximè glutinosæ sunt feri sanguinei partes nullius prorsus motûs sunt capaces, vel difficillimè arteriosa pererrant vasa.

PROPOSITIO VIII.

Fluidum pulsum motumque per cavum quodvis cylindricum majori celeritate movetur, versùs axim quàm ad latera ex *propof.* 215. *de molib. à gravitate pond. Boyell.* cujus cursus adhuc multò perniciosior futurus est ad axim, quàm ad superficiem internam cavam vasis si hoc conicâ figurâ donatum.

PROPOSITIO IX.

Sanguinis motum per axim arteriæ Ranæ cujusdam celerrimum observavit *Baglivius de praxi medic.* p. 398. atque hinc fit ut partes sanguinis quæ-utpotè cæteris leviores, minus suscipiendo motui idoneæ sunt, ad latera tubi urgeantur, adeò ut ubicumque tardigrado, ac lento motu fertur per vasa cruor, ibi partes leviores (quia cæteris viscidiores *ex propof.*

6 TRACTATUS

7.) feri , secedere à totâ massâ necessesse (sit.)

COROLLARIUM I.

Inferes visciditatem liquoris secreti futuram esse , ut celeritas fluidi purpurei circulantis in orificio secernentis reciprocè , seu eò tenaciorem laticem per secernentia cola suppeditabit sanguis , quò segniùs atque tardiùs ad vasa secretoria appellit.

COROLLARIUM II.

Cum sanguinis velocitas juxta secernentium tubulorum orificia fluentis numero circumvolutionum in quas plicantem diversimodè se prodit arteria , respondeat ex. *Bellin. de motu cordis prop. 40.* sequitur visciditatis diversos gradus , majori vel minori copix ejusmodi plicationum arteriosi tubi tribuendos fore.

PROPOSITIO X.

Ubi tardè admodum vasa sua circumfluit sanguis, hujus partes quæ magis serosæ, in illos detru-
dentur arteriosos canales, qui exi-
guissimi, maximè contorti, atque à
vitali principio, corde inquam, re-
moti extiterint. Siquidem lento
existente sanguinis fluxu, major so-
litò purpureorum globulorum,
juxta longitudinem axis arteriæ
tranabit quantitas, atque rubra
pars perniciosiori motu quàm sero-
sa (ex 8. & 9. prop.) movebitur,
& qui indè sequitur celerior tran-
situs liquidi per illas arterias in
quibus minor ei offertur resistentia
vel quæ per ampliores alveos se
expandunt, quæve tandem cordi
proximiores. Quamobrem neces-
sitate quadam serum in has adige-
tur arterias quæ vel exilissimæ aut
maximè convolutæ, quæve tan-

8 TRACTATUS

dem in summâ à corde distantia
extiterint.

PROPOSITIO XI.

Glandulæ naturam circumvo-
luta arteria constituit (cujus exte-
ma tunica ramis & nervis, quem
admodum in omnibus tubis vene-
fis, & arteriosis, contingere sole
diffeminata conspicitur spiræ in
modum dispositis, (ut exindè præ-
stantius contorqueant,) quæ à lateri
suo vas excretorium dimittit, ut
indè in venam congenerem tran-
seat. *Cheyne propos. I.*

PROPOSITIO XII.

Intestina speciem quamdam
glandulæ exhibent, ac tubi lactei
à fistulæ intestinalis latere emer-
gentes, veluti totidem vasa secre-
toria habendi sunt. *Cheyne pro-
positio 4.*

PROPOSITIO XIII.

Vasorum excretoriorum orificia, in quavis glandula circularem figuram obtinere exinde liquet, quod omnia vasa, quæ fluida nostri corporis pererrant, cava sint, cylindrica, vel conica, cum enim fluidi pressio semper perpendicularis sit lateribus vasis in quo continetur, atque per lineas à centro ad omnia circumferentiæ puncta æquales exerceatur, oportet ut ambitus tubi internus quaquaversum æquali distrahatur nisu seu sectio perpendicularis axi vasis circulus sit hinc necesse est ut vas, sit vel cylindricum, vel conicum. Hanc propositionem fusiùs demonstratam (vide apud) *Pitcarium de circulatione sanguinis.*

COROLLARIUM I.

Cùm in diversis glandulis tubu-

10 TRACTATUS

lorum excretoriorum oscula differant penes magnitudinem & capacitatem, sequitur fore ut in variis colis fluida separata non nisi in cohaesionis, & fluiditatis gradu discrepent.

COROLLARIUM II.

Quaecumque in sanguine peccaverit materia, hæc evacuari per quamvis glandulam poterit, modo incernicula ita comparata fuerint, ut sufficienter ampliatam diametrum habeant.

COROLLARIUM III.

Unius excretionis aucta quantitas, necessario alterius diminuit, atque è converso non poterit ulla evacuatio imminui quin necessitate quadam altera increascit.

PROPOSITIO XIV.

Omni bus glandulis tunica ex

MECHANICUS. 11

fibris muscularibus conflata contingit quibus fibris instructæ nisu contractivo contenta expellere queant, atque eo fortior censendus hujusmodi textus, quo major est(materiæ)secretæ copia seu quo potentiùs, vegetiusve secreta materia foras dimittitur.

PROPOSITIO XV.

Relaxatio tunicarum(quampiam) glandulam constituentium visciditatem secretæ materiæ auget, & vice versa materiæ separandæ per incernicula quævis tenacitas eadem magis laxat siquidem secreta liquida eo nomine diuturniori morâ in glandulis contractâ lentiora fiunt, quod subtilioribus, mediante loci calore evaporatis partibus, materiæ reliquum iners, magisque crassum evadat.

COROLLARIUM.

Opiatæ & quævis *Laudani* titulo insigniuntur medicamina, ebrietas, & quodvis generali relaxationi inducendæ aptum erit, necessario materiæ in omnibus conglomeratis glandulis tenacitatem intendet.

PROPOSITIO XVI.

Ex glandulæ, quarum arteriæ componentes magis convolutæ viscidiorè à sanguine materiam sequestrant.

Demonstratur. Esto ramosus canalis, qualem subjecta oculis figura exhibet cujus ramus unus *c* extremitatem occlusam habeat: alter verò apertus. Hoc factò alicujus instrumenti interventu impellatur per truncum *a* cujusvis speciei, viscidum tamen liquidum, ut putà sanguis, vel tale, ut componentes

ponentes sui partes alias magis .
 minus verò fluxiles alias obtineat ,
 ac æquali nitatur impetu in ambos
 ex trunco emergentes ramulos do-
 nec ramus *c* plenus evadat. Hisce
 sic constitutis , liquor aliàs per
 ramulum *c* urgendus , transeat
 oportet per *b* ita ut omnis liquidū
 per truncum *a* devoluti copia de-
 beat pariter eodem temporis in-
 tervallo ramusculum *b* pervadere.
 Jam verò cum ramus *b* augustior
 trunco à quo procedit existat ne-
 cesse est liquorem præfatum ma-
 jori celeritate perniciofique motu
 trudi per tubulum *b* quàm per
 truncum *a*. Ex 3^o. Coroll. 10.
Theorematis D. Keilli Lectiones
Physicæ.

Sic igitur ex liquoris partes quæ
 facillimè moventur omnium pri-
 mæ per *b* : transeunt. Dum aliæ
 quæ minùs in se motùs suscipiunt ,
 vel quod perindè est , quæ visci-

diores sunt, ingressum sollicitant in furculum alterum *c* inque eundem nitentur. Porro materiæ huic tenaci semper denegabitur ingressus in prædictum ramulum, quandiu partes maximè mobiles seu fluidissimas liquoris in *c*. Contenti, in ramum *b* non nititur expellere, extruditve : quare ramus *c*. Constantè implebitur hac tenaci ac glutinosa materie, atque eò usque, donec ulterius nequeat. Si fortè igitur extremum cujusvis arteriosi ductûs omninò oppilari contigerit aptius futurum est viscidiori humori à massâ sanguineâ secernendo. Hoc autem petendum ex eo quod tardiori passu progrediatur per obstructum ramusculum sanguis, porro in cujusvis arteriæ ramis per quos segnior est sanguinis motus, quod viscidius est à massâ sanguineâ per occlusum ramum separari necessum est, cum quod

MECHANICUS. 15

fluidius per liberos atque omni
resistentiâ immunes tubulos per-
meat. Jam verò cum convoluta
arteria majorem liquidis circulan-
tibus obicem opponat, eadem
dumtaxat angustatâ sanguinis flu-
xus admodum segnis evadit cujus
lentor plicationum in arteriâ nu-
mero respondebit. Hinc in tubis
arteriosis nimium contortis, san-
guinis per eos commeatu pigerri-
mo ac lentissimo existente, visci-
ditas ejusdem major quoque exis-
tit. Hinc quæ glandulæ ex arteriis
nimis complicatis emergunt, eæ
materiam viscidiorẽ sanguinis
lacu sequestrant, quod erat de-
monstrandum.

PROPOSITIO XVII.

Quantitas materiæ fluidæ in qua-
vis glandula secretæ est in ratione
composita ex illa quantitatis san-
guinis; ejus celeritatis ad orificia

16 TRACTATUS

vasorum excretoriorum ; amplitudinis tubulorum emittentium directâ ; & ex ratione reciproca tenacitatis sanguinis appellentis. Demonstratur velocitate motûs sanguinis , osculorum ampliacione , ac visciditate ejusdem liquidi purpurei , datis , quantitas secreta erit directè ut illa sanguinis , cum major sanguinei fluidi ad colatoria appellentis copia , major est , minor autem minorem materiæ secretæ determinet quantitatem. Sanguinis hujus lentore , atque emissariorum hiatu iisdem manentibus vis secretæ materiæ celeritati respondebit quò enim rapidius fertur per vasa cruor , eò uberior materies ab ipso secedet. Quò verò tardiùs per adferentia vasa labitur , eo minor , si sanguinis vis seu copia , ejusdemque motûs velocitas ac lentor supponantur , materia secreta eam proportionem obtine-

bit, quam inter se habent emissariorum orificia diducta cum magis hiantia tubulorum oscula plus materiæ secernant, minùs verò si illa arctiora extiterint, copiâ sanguinis ejusdemque velocitate cum orificiorum amplitudine datis, clarum est liquidi à sanguine segregati per incernicula quantitatem reciprochè futuram esse ut sanguinis provoluti tenacitatem : unde quò major hujus fuerit lentor, eò minus materiæ per cola secedet, cum è converso, plus per secretoriorum ora diffundetur, si minus lentescat cruor ; quamobrem quantitas liquidi glandularum ope à sanguine segregata, si cætera paria sint, erit ut copia sanguinis.

PROPOSITIO XVIII.

Auctâ sanguinis copiâ necessario augmentur secretiones fluidæ multo majori proportionem quam viscidæ

18 TRACTATUS

seu liquorum viscidorum.

Demonstratur ut primum sanguinis copia vasa pervadentis increvit, omnium canalium diametrum dilatandam fore consequens est: at dispari profectò ratione, quippe eadem vi impellente posita, uberior liquidi sanguinei in arterias explicatas seu minimè convolutas appulsi copia has distrahet extrorsum diducet, unde diameter necessariò in iis arteriis major quàm in complicatis arteriosis canalibus futura est. Ut pote in posterioribus objectus sanguini transfluenti obex magis adversus est quam in primis omni complicatione destitutis. Atque hæc sanguini oblata repagula eò majora futura sunt, quo copiosiores convolutiones habuerit arteria, ut sanguinis mora ad auctum inflexionum arteriæ numerum, rationem directam habeat. Porro cum

quantitas secretæ materiæ amplitudini canalium secretoriorum respondeat. Ut in præcedenti propositione diximus. Fit ut copiâ secretus per canales arteriosos evolutos expeditosque (queis tamen diameter in hoc casu amplior existit , liquor longè superet illum qui per eosdem tubos magis tamen implicatos , à massa sanguinis segregandus , & quoniam per glandulas , quæ arterias nimis involutas habent lentior , viscidiorque secernatur humor , fluidior verò dilutior per cola arteriis. Liberis explicatisve instructa , oportet ut aucta sanguinis copia quæ faciliùs arteriarum orificia minimè convolutarum diducit , augetque exinde diametrum , quam illarum flexuosè ac contorte incedentium : intendat & quoque liquidas præviscidis separationes quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XIX.

Imminuta sanguinis quantitas fluidarum secretionum diminutionem necessario advocat & hoc magis quàm viscidarum. Hoc nulla probatione indiget cum prægressæ propositioni tantum opponatur, contrariorumque (ut loqui amant) eadem sit ratio.

PROPOSITIO XX.

Ad auctâ quomodocumque sanguinis per vasa decurrentis celeritas, fluentium liquidorum secretionem intendet magis quam viscidorum, & è converso effectus sanguinis cursus dispendia majora in fluidis quam in lentis secretionibus inducit.

Demonstratur. Rapidiori existente sanguinis fluxu, impetus ratione cujus arteriarum tunicæ ab axi recedunt, vel earum perime-

ter dilatatur, major futurus erit, sicque majores in minùs contortas arterias exeret vires, quàm in flexuosos arteriosos canales. Hinc uberior ac abundantior, limpida fluidaque à sanguinis torrente separatio quàm crassa ac lenta seu humorum tenacium viscidorumque (vide rationes datas in *propof.* 18.) insuper quoniam adaucta sanguinis celeritas quâ in minimas conteritur moleculas illum fluxiliorem reddat ut exinde majorem illarum particularum copiam suppeditare queat, quæ glandulis minimâ diametro præditis pertranseundis aptæ sint, sequitur idcirco fluidorum humorum quoties celerius per vasa sua fertur sanguis, à lacu sanguinis segregationes, illas viscidorum ac lentescentium longè superaturas.

PROPOSITIO XXI.

Si quarumcumque in universum glandularum ora capaciora solito esse contigerit, fluidæ secretiones majori quàm viscidæ copiâ suppetabuntur, & è converso posteriores quæ fiunt à sanguine secretiones majore proportionē *liquidas* excedent, si colatoriorum orificia angustiora evaserint.

Demonstratur. Diametri minimorum orificiorum dilatatæ transitum materiis per ea fecernendis sive ex fluidæ sive tenaces extiterint: liberum ac expeditum præbent. Ast humores per diversa corporis organa glandulosa separatos tantummodo penes diversos co hæ sionis & fluiditatis gradus docuimus suprà (1. coroll. 13. *propos.*) orificia igitur minima glandularum, vel parvæ admodum glandulæ ampliata viscidiorē

quàm qui ex cæteris colis sequestraretur humorem eructant & quod inde sequitur. Minor peragetur in illis glandulis, quæ viscidis humoribus separandis inserviunt, quam quæ fluidis destinantur, secretio; ut certum exinde sit universaliter in quibusvis glandulis osculorum secernentium dilatationes fluidorum à sanguine secessum per eadem cola magis quàm viscidorum promovere quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXII.

Cum augetur sanguinis lentor fluidorum secretionem magis diminui quam viscidorum necesse est. Et è converso dum fluxilior ille existit liquidas magis quàm lentas secretiones intendit.

Demonstratur. Dum minori celeritate fertur per vasa sanguis, fluxilior materia minus quam tenax

per glandulas secedet, (*ex 2. prop.*) porro velox sanguinis motus in ea proportionē decreſcet, quā repa- gula tranſeunti objecta intendun- tur. Cum igitur reſiſtentia major, ubi ſanguinis craſis viſcidior eſt, exiſtat; ut pote qui tunc per ca- pillares arterioſos canales ægerri- mē fluat, ſequitur adauctum ob diminutam motūs velocitatem, ſanguinis lentorem, minori quan- titate fluida per cola quā tenacia ac glutinoſa ſuppeditare.

CAPUT PRIMUM.

De Ventriculo ejuſque morbis.

§. I. **N** Emini non notum Ven- triculum deſtinatum at- que idoneum eſſe digerendis af- ſumptis alimentis qua mediante coctione ingeſta in moleculas adeò parvas dividuntur quæ lacteorum itinere

itinere perfecto in sanguinis lacum
ad vires refocillandas nutriendum-
que corpus , permeare queant.
Viscus porrò hoc ex quibusdam
fibris muscularibus , membranis ,
quæ copiosissimis arteriis , venis ,
nervis , glandulisque intertexuntur
compaginatum emergit , quarum
glandularum ministerio certa hæc-
que tenax ac lenta à sanguine se-
cernitur materia in prædicti visce-
ris cavum ad optimos à naturâ
destinatos fines eructanda.

§. II.

Ex prædicto viscido humore
aucto vel diminuto sive quantitas
sive ejusdem lentor spectetur ,
quamplurimæ stomachi propullu-
lant ægritudines quales sunt appeti-
tûs imminutio , nausea , vomitus qui
præprimis manè evenire solet ;
quique temulentis acribusque po-
tatoribus familiaris est , distensio
ventriculi post pastum.

§. III.

Ventriculus ope fibrarum suarum muscularium accedente diaphragmatis musculorumque abdominalium motu, sat aptus undequaque exagitandis, movendisque cibariis; ut si hic motus digestionis peragenda non sufficiat, velut tamen (ex Pitcarnio dissertatione de motu quo cibi in ventriculo rediguntur ad normam sanguini reficiendo idoneam) principium ejusdem instrumentum habendus est. Musculorum vis huic digestionis operi impensa omnem fidem superare videtur quippe si musculorum robur inter se collatorum se habeat ut illorum soliditas, seu gravitas, & illa flexoris pollicis libras 3720. juxta computum Borellii æquet (*de motu animalium* propos. 1. pag. 126.) quam ingens statuenda erit

musculorum quos mox diximus simul sumptorum virtus ? (quæ assurgit juxta Pitcarnii computum ad libras 26000.) & profectò vis musculorum digestionì famulantium plus quàm sufficiens apparebit attendenti coctionis munus illud necessariò requirere , ut assumpta alimenta in tot ac tam parvas se dividi sinant moleculas ac comminui quarum maxima diameter semper venarum lactearum diametro minor existat , utut verò illud sit. Id certum ac stabile apud omnes manet præfatos musculos principem obtinere in digestionem locum. Hinc quæcumque musculorum digestivorum actionem intendunt , vel imminuunt iis omnibus assumptorum in chymum conversionem accelerandam vel retardandam consequens est.

§. IV.

Aucta sanguinis copia digestioni opitulatur, demonstravit siquidem Doctor Cheyne in 3. lem-mate theoriæ februm quod cætera si sint paria vires diversorum animalium ejusdem speciei, vel ejusdem corporis animali in variis temporis intervallis, sint in ratione triplâ quantitatis sanguinis in diversis animalibus existentis vel in eodem in diversis tamen temporibus: atque tota animalis vis in omnium muscutorum conjunctim consideratorum vigore consistit, & consequenter quod vis robur animalis intendit, illud omne & cæterorum muscutorum, & eorum qui digerendis assumptis inserviunt, vim & tonum adaugebit. Ast inconcussâ manente præfati lemmatis veritate, certum est sanguinem eò usque certis in casi-

bus copiâ augescere , ut vires
 diminuat : æquilibrium enim san-
 guinem inter & vasa destructo ,
 mirum in modum animalis infrin-
 gitur robur , ut clarum est ex
 quamplurimis locis de fibrâ mo-
 trice Baglivii. Derepente sup-
 pressa cutanea excretio , etsi liqui-
 dorum adaugeat copiam , juxta
 Sanctorii calculum vires tamen
 diminuit ex eo quod retineatur
 quod aliàs evacuandum erat ,
 quo fit ut eatenus sanguinis tex-
 tus alteretur donec inidoneus ac
 ineptus fiat exercendis musculo-
 rum contractionibus , ponè nunc
 massæ sanguineæ auctum adjunc-
 tum cum majori ipsius liquidi vis-
 ciditate tunc eò minore existente
 partium mobilium è sanguinis pe-
 nu separatione quò major fuerit
 liquidi tenacitas sequitur fluidi ce-
 rebrosi secretionem diminuendam.
 Cum autem fibrarum tensivus to-

nus proportionetur fluidi nervei quantitatis in fibras appulsui, eadem ineptæ librando majori ponderi sanguinis futuræ sunt; sicque vires labefactatum iri consequens est.

§. V.

Bellinus in 49. propositione de motu cordis jam demonstravit quod sanguine ita vitato ut vires augeat vel minuat perindè est ac si sanguis qualitate quidem naturaliter se haberet sed imminutâ vel adauctâ esset quantitate, quare sanguis à naturali crassi ubi recessit, diminuere vires musculorum contractivas poterit, ut digestionem pervertat. Nihilo tamen minus nonnullis in casibus ita inquinatur ac à statu naturali degenerat ut vires auctitet, & tunc ventriculi coctionem adjuvat. Hinc appetitus vorax ac vegeta alimenterum in massam chymaceam con-

versio nequaquam pro infallibilibus sanæ sanguinis craseos signis habenda sunt.

Ex his clarum est quare alimenta parcâ manu sed læpiùs sumpta languidam atque effætam suscitent coctionem quemadmodum etiam cur qui hecticâ febre consumuntur tam pravè assumpta cibaria elaborant in quibus tamen sanguinis copia maximoperè diminuta sit ut nulli dubitandi locum suis rationibus reliquerit D. Cheyne (*new theory of Fevers pag. 134.*)

S. VI.

Quæcumque vomitum ciere apta sunt amara chalybeata, exercitia præprimis sub frigido, siccoque cælo egregiè promovent digestionem, quod roborent & confirmant fibras, undè muscularis contractio intenditur, quod æquè viscerum muci in cavum ventriculi

32 TRACTATUS

eructantis à glandulis ipsius visceris secreti quantitatem imminuant. Hoc autem vomitoria directè præstant exercitia verò insensibilem per cuticulares meatus excretionem intendendo : undè cæterarum evacuationum imminutio. Abundantio rem enim aliquam excretionem (ut Pitcarnius demonstravit) alterius cujusvis necessariò sequitur imminutio. Amarore donata , atque chalybeata sanguinem lentum dividunt , ejusque motum velociorem reddunt. Undè magis aptus secretioni materiæ insensibilis perspirationis evadet & spirituum animalium carneas fibras corroborantium , sicque auxiliatur muscutorum contractioni , uti clarum est ex 20. propos. de secretionem animali.

Quantum sese exercentibus in aëre frigido & sicco roborentur fibræ ac augetur perinde vis ac fa-

nitas colligi potest ex 7. 8. & 27.
aphor. Sanctorii. ex §. 38. confer
cum 34. & 35. aphor.

§. VII.

Quàm multæ necessitatis sit car-
 nearum ventriculi fibrarum relaxa-
 tio atque mollities. Ubi illæ tensæ
 atque rigidæ evaserint, facile est
 demonstrare. Quoties enim cum-
 que coquentis hujus visceris villi
 plus æquo rigescunt, vibrationes
 justò vividiores edunt ut sensatio
 acutior vividiorque indè excitetur;
 utiquè ingratum ac molestum ven-
 triculo erit quod paulò antea gra-
 tum ac jucundum. Status hic se
 prodit gravitatis aliquo pondere
 caput occupante, dolorificâ sen-
 satione siti morbosâ. accedit sto-
 machum cuivis vel blandissimo
 humido ferendo imparem pror-
 sùs, quin de repentè illud vomitu
 extrorsum trumat.

Prætereà glandularum ostiolis contractis angustatis imminui , magnam partem liquoris istius visceri qui jugiter in ventriculi cavum depluendo illud tutatur , proveni-
 tum necesse erit. Materiæ enim per organa secretoria separata copia proportionem ex illa areæ orificiî & velocis liquidi transcurrentis motûs compositam habet , ut qui antea demonstraverim (17: propos. de secretionem) tandem humor à sanguinis massâ derivatus non tantùm imminutus existit , verum etiam tenuis admodùm est quò magis acria in sanguine contenta salia extricare valeat. His itaque de causis salinis moleculis prægnans potentiùs membranam exquisitissimî sensûs , quâ intùs viscus præfatum obducitur , irritat. Atqui ductuum ventriculi secretientium constrictio non est unica causa , ob quam solito fluidior

ac tenuior gastricus à sanguine derivetur liquor. Verùm illi adjungendum censemus celeritatem motûs , quo per vasa convulsa ventriculi fertur sanguis. Quod autem hic celerius per ductus angustatos provolvatur evidens est ex coroll. 3^o. primi theorematis *Doctor Keill. lection. physic.* præsertim si universalis extiterit contractio , ut aliquandò ratione consensûs accidere demonstratur. Vide *Bellin. de stimul. Bagliv. de fibra motrice* , & passim apud *Sanctor. Medic. stat.*

Quî autem fiat ut celer sanguinei liquidi cursus augere debeat tenuitatem materiæ secernendæ , difficiliùs est quàm ut explicari valeat. Quandoquidem sanguis æquè dispositus videtur ad serum ex suo sinu trudendum dum velocius fluit. Quemadmodùm clarum fit ex experimentis Lovveri , ac

66 TRACTATUS

ubi immotus in scutella manet. Verum facillimam hujus nodi solutionem reperiet quicumque adverterit serum quamvis magis fluxam ac labilem sanguinis partem constituat utrumque opportunum magnis alterationibus quod fluorem ejus attinet subeundis ac ipsum liquidissimum evadere si præcipiti magis fluxu per ductus suos transfertur. Gravitas specifica feri eam habet proportionem ad illam aquæ quam 6. ad 5. juxta Boilei observata : Ast pronunciatum hoc variè secundum varia subiecta intelligendum.


Cum per arteriosos ductus tenfos rigidos celerius fluat sanguis quorū ob id ipsum diastoles ac sistoles celeriores, debet necessario dividi, atteri in suis partibus, quo tenuis ac fluidus fiat fluxilibus multum humoribus fecernendis magis idoneus, pariterque tenaces adhuc
existentes

MECHANICUS. 37

existentes moleculæ intimè cum cæteris magis attenuatis magisque fluidis commisceantur, ac simul quaquavorsum per torrentem sanguinis abripiantur quin ullo modo separari possint.

§. VIII.

Salivalis liquor auget vel dimi-
nuit digestionem prout uberior
vel parcior secretus fuerit (*ut*
Doct̃or Cockburne, æcon. animal.
p. 15.) simulque modum decla-
ravit quo aëris atmospherici pon-
dus ad secretionem peragendam
concurrat.



CAPUT SECUNDUM.

De Asthmate.

§. I.

Asthmatis nomine venit illa respiratio, quæ laboriosè ac difficilè peragitur, quæ in tres dispescitur species Dyspneam scilicet, Asthma propriè sumptum, ac Orthopneam.

1°. Dyspneam constituit frequens ac densa respiratio. 2°. In Asthmate verò præter sæpiùs iteratam, eamque validam spirationem in quâ musculi huic operi destinati nimis vehementer agitantur; accedit insuper stertor quidam & sibilus, quandoque ægri fortiter ac lentè pulmones agunt. 3°. Orthopnea omnium maximè difficilem respirationis constituit

gradum, quâ vexati erectâ cervi-
ce spiritum ducere conantur ac
tantum non suffocantur. In om-
nibus hisce, quas retuli differen-
tias inspiratio multo difficilior ex-
piratione cernitur. Hos tres affec-
tus si quis curiosius investiget non
tantum penes vehementiæ gradus
diversos discrepare animadvertet,
illosque sub eodem Asthmatis no-
mine comprehensos quo circa hoc
modo de omnibus agam.

§. II.

Cum Asthma majorem vel mi-
norem in captando aëre laborem
includat, quodcumque respiratio-
nis exercitium interrumpet, illud
Asthmaticum insultum productu-
rum. Ast ut respiratio facili ne-
gotio contingat : 1°. Thoracis
claustra amplianda, ut facilius li-
quidum aëreum pulmonis substan-
tiam subire valeat. 2°. Desidera-

D ij.

40 TRACTATUS

tur in aëre atmosferico certum pondus, certaue elasticitas quibus destitutus inflandis sufficienter pulmonalibus vesiculis ad faciliorem expeditioremque sanguinis per ipsas transfluxum impar foret. Porro si aëris ambientis gravitass atque elaterium modum excesserint, eo usque ingresso expandentur eæ, quas modo dixi vesiculæ, ut amisso eo, quo naturaliter possident tono, ac robore majorem sanguinis per substantiam pulmonarem cursui obicem objiciant.

3°. Requiritur talis in sanguine fluiditas quâ aptè pulmonis textum præterlabi valeat.

§. III.

Et ut rem in pauca conferamus si liquidi nervosi in musculos respiratorios affluxum majorem vel minorem solito esse contigerit, (nimirum *intercostales internos* &c.)

*externos , subclavium , serratum
anticum majorem , serratum posti-
cum superiorem, vel triangularem,
serratum posticè positum ac infernè,
sacrolumbum & diaphragma) pec-
toris costæ hinc inde plus vel mi-
nus assurgent , seu amplior vel
angustior evadet capacitas , exin-
de impiedietur aëris in pulmo-
nes haustus , quin si eosdem pul-
mones , asperam arteriam vel
thoracis membranas laxari , sic-
cari vel tendi nimium , prop-
ter aliquam spasmodicam con-
tractionem, vel inclusos flatus ,
si viscidâ lentâ pituitâ infarciri ,
tuberculis premi , calculosis con-
cretionibus vexari. Si materiem
aliquam , vel aquam in pectoris
cavo colligi , aut hydrope im-
pleri abdomen , si tumoribus he-
par , vîtriculum , lienem vel me-
senterium obsideri conjecerit Me-
dicus , in omnibus hisce casibus*

42 TRACTATUS
asthamatici insultûs symptomata
expectet.

§. IV

Si maximoperè adaucta fuerit sanguinis copia vel retardatus ipsius motus, si valdè divisus ac attenuatus vel crassus ac lentescens, pulmones ægerrimè pervadet, hinc illi non nisi parum ac circumspicte (sic dixerim.) dilatantur, quamobrem Asthma producetur.

§. V.

Asthmatis periodum servantis cuius considerationi ac examini incumbat Medicus, paroxysmus semel in spatio quindecim dierum affligere consuevit (modo non frigida ac prava aëris constitutio, vel aliquod vitium in victu præmaturè illum accerferint) quandoque semel in mense. Puellam novi, quæ semper eo corripie-

tur quoties ipsi catamenia fluunt ac licet per multos annos multa, eaque varia medicamina usurpata fuerint, nullum tamen exinde emolumentum; quin potius in pejus omnia ruere mihi testata, ubi primum ipsam invisi: nihilo minus tamen remedii cujusdam ope huic adversæ valetudini magis appposito mirum in modum sublevata fuit ex quo tempore melius se habere cæpit per duos fere subsequentes annos, pergitque etiamnum, quantum ex contrariorum, quæ se prodire solebant signa, defectu conjectari mihi licet. Verum in universum asthmaticum insultum antecedere flatulentia atque distensio ventriculi atque deinde patientemprehendit hora 1^a. vel 2^a. circiter matutina, hunc, si violentus fuerit è lecto surgere ac erecto capite se liquastro federe cogit; prægrandis angustia pec-

tus opprimit, quo fit ut eo omnes ægrotantis colliment vires omnisque tendat opera, ut majorem spiritûs copiam in pulmones hauriat: urina uberius excernitur, & ipsa pallida. Qui autem hoc morbo tenetur, nec extussire, nec sternutare, nec exspuere, nec libere loqui. Jam verò summa ventriculi distensio percipitur, quæ à quibuscumque assumptis adhuc augetur: excitato vomitu, catharsis promota prægresso jejunio, paroxysmus mitescit; ubi immaniter detentum affliget; tunc & palpitat cor, & intermittit pulsus, & nigrescit penè facies, ipseque æger deliquio obnoxius. Postquam morbus spontè sæviit, atque à magno impetu inclinare, tunc copiosum sputum, cujus nihil antea, egeritur aliquando concoctum, interdum, ut aiunt, crudum, quæ anacatharsis catharsis.

ægrotantem postea liberum, quo usque denuò morbus invadat, relinquit. Lotium intensè coloratum in paroxysmi declinatione, quævis verò derepente adorientur corpora, mutationum anni varietates paroxysmum advocare consueverunt.

Hedera terrestris, hyssopus, ruta, syrupus allii, sulphuris, tinctura lavendulæ, spiritus cornu cervi, myrrha, crocus, balsamum auratum, peruvianum, sulphuratum, anisatum, succinatum, terebinthinatum, sulphuris tinctura cum syrupo hedera terrestris, aqua calcis, infusio millepedum, marrubii ad libram semi. in sex cerevisiæ vel alterius liquoris congiis, vomitum cientia, phlebotomiæ, alvum ducentia, omnia hæc incassum, omnisque successûs expertia tentata in morbi remissione, ut tradit merito hic audiendus optimus Judex Floyer

26 TRACTATUS

(*Tractatu de Asthmate*) victus
 plenus ac præprimis liberior vi-
 vendi licentia , flagiliofaque libi-
 do morbi insultum ferociorem
 reddunt , cæli , tempestatisque
 sicca constitutio hoc morbo de-
 tentis convenit , qui paroxysmo
 aliunde immunes sunt , si bruma vel
 gelidum tempus obtineat ; mo-
 do non impensè sæviat acerbum
 frigus : pluvia , ubi descendit ,
 non secus premantur ac si humi-
 dæ , nebulosæ exhalationes ante-
 cesserint , madentes ædes , loca
 paludosa , venti validi ac striden-
 tes procellæ in his , quos modo
 memoravi , ægris spiritûs tractio-
 nem difficiliorem efficiunt , qui-
 cumque ad eos pertingens fumus
 summè agitat , ast omnium maxi-
 mè lignorum , qui verò è cespiti-
 bus emanat innocuus ; ardente
 syrio , majori impetu ac longè
 sæpius irruit morbus quàm reg-

MECHANICUS. 47

nante hieme : intereà loci spiritus in universum difficiliùs trahitur , sævitiaque mali increfcit , si æger nimis incalverit , five ob ignis calorem , five cubilis. Levatur autem vel remittitur per fenestrarum apertionem. Præterea omnium spirituosorum liquorum usu exasperatur morbus ac recentium maximè quicumque illi fuerint.

Omnia viscida mucilaginositate foeta & flatum gignantia edulia odit hic morbus. Ast carnes quæ minùs , digestionis officinam ventriculum premunt , Asthmate laborantibus conducunt.

Ettmulterus Waldeschemidius , Baglivius , quæ vomitum provocant , commendant *laudanum cum theriacâ Andromac , millepedes , terebinthinam , balsamum peruvianum , sperma ceti anti hysterica , anti-epileptica , solutura*

gummi ammoniacum & alia hujusmodi.

Dominus Floyer quamplurima ex illis quæ recentiorum multi extollunt remedia tentamini subjiciens nullius utilitatis invenit, multum tamen incommodi percepit ab eorum usu, quæ à veteribus præscribuntur. (*vide Nicol. Myreps de antidotis §. 1. cap. CXXXV. Oribasium libr. IX. cap. 5. & Aeti. tetrabib. lib. II. sermon. IV. cap. LVII.*) & profecto hæc quæ apud medicinæ Patres jussa videmus auxilia magis hujus morbi ætiologiæ congruunt, & quicumque felicem eventum eos in tractando hoc affectu curandū rationes variare oportebit pro diversis causis spiritûs asthmaticam difficultatem producentibus, quibus omnibus causis prægressa jam theoria aliquam affudit lucem.

CAPUT TERTIUM.

De Consumptione

§. I.

Phthisis Carnis quædam consumptionis est sive febris adsit sive absit, hæc autem statuitur vel essentialis vel symptomatica. Prima autem Phthiseos species duas alias continet, est enim vel nervosa quæque *Atrophia* audit, vel *Pulmonaris*: de ultima tantummodo differere constitui, animadvertam imprimis quæ Pulmonarem tabem antecedunt. 2^o. Loco, quæ concomitantur. 3^o. Quæ consequuntur ut non nulla ex maximè obviis phenomena hujus mali pedissequa explanare liceat.

§. II.

Hunc morbum antecedentia sunt suppressio alicujus evacuationis.

E

50 TRACTATUS

nis, five naturalis, five præternaturalis non castigatâ tamen nec correctâ causâ à qua processerit, gravia quibus limantur animi pathemata, spirituosorum liquorum prætermodum haustorum usus, desidiosa ac otio torpens vita, lucubratae noctes studiis, paludosus, ponderosus, atque humidus aër, congenita dispositio, trunci curvitas vel gibbositas, thoracis claustra angustata, quodcumque humerum in pulmones decubitus efficit, morbi perperam curati, ac frigus contractum in certis casibus.

Concomitantur autem præfatum malum. 1^o. Tussis quæ ità à catarrho distinguitur ut hæc tuberculis vel cuivis alteri prægressæ pulmonum labi debeat, ad hæc perceptio cujusdam rei pectus prementis gravantisque, spiritûs difficilis tractio : atque in principio sicca tussis deprehenditur, quam-

vis in progressu humidum quid trahat à pectore.

Catarrhus humidus inter initia deprehenditur, paucisque transactis hebdomadis terminatur: molestus attamen ac jugiter penè ægrum vescat atqui è converso contabefaciens tussis exordia mitia promit ac per intervalla recurrit: ager autem siti ardet, anorexiâ laborat, à pastu tussit quousque cibaria sumpta per os rejiciat, vox rauca ac stridula, sensus ponderis major percipitur in uno thoracis latere quam in altero, acerbiorque ipsum quatit tussis pro diverso quem tenet in accubatione situm.

2°. Adest febris, inappetentia, sitis, refusum egeritur lotium, pulsus celer, genæ rubent, ac potissimum post expletam sitis famem, calor in manuum volis, inque pedum plantis persentitur ac

52 TRACTATUS

in hipocondriis. 3^o Carnis emaciatio sensibilis.

Consequentia incipientem talem de quibus dixi mox, si non debelletur, in confirmatum abeunt morbum qui adjuncta habet febrilem æstum, illumque de genere Phlogodeo uti Pleuritidem vel Peripneumoniam, & cum hæc antecesserint putridam eamque incrementem vel intermittentem febrem, tum postmodum exacerbantem tussim, materiam tussiendo ubertim eductam quandoque dulcem interdum foetidam. Ad hæc nocturnos sudores, diarrhæam, crurum tumorem, oris ulcuscula, sensum doloris in jugulo à cujuspiam deglutitione ac tandem *faciem hippocraticam* quæ decimum suppremo die terminatur.

§. III.

Ubi aliqua evacuatio suppressa fuerit sive catameniorum in ama-

bili sexu , five hæmorrhoidum
 urinæ vel materiæ insensibilis pers-
 pirationis &c. necesse est ut ple-
 thora aggeratur quæsi febrem non
 produxerit , quemadmodum il-
 lud haud rarò contingit , tamen
 majori quam in vasa per quæ cir-
 cumducuntur liquida , exercet ,
 pressione , ita ea relaxat ut inido-
 nea circuitui obeundo reddantur eo
 nomine sanguis non ægrius modo
 minimos per arteriosos canales
 provolvetur , verum & parent mu-
 cosam , limosamque materiem in
 quamlibet corporis partem ad hoc
 dispositam deponendam. Porro
 abundantius affluens ad Encephali
 arterias purpureus liquor , eas ul-
 tra tonum diducet , sicque quo-
 dammodo intercipiet spirituum
 per nervos motum , & major il-
 lius lentor simul cum ipsius cele-
 ritate diminutâ parciolem fluidi
 nervei suppeditat secretionem (jur-

14 TRACTATUS

ta 20. & 22. prop. de secretione animali) atque adeò infringitur omnium muscutorum corporis, & quod inde sequitur, respirationi famulantium robur. Ast ut uberior cruoris copia, ejusdemque visciditate comitatâ, facile per pulmonum substantiam tranare queat, oportet ut hæc viscera, magis quam in naturali statu extendantur, majusque occupent spatium secus autem fit in tabidis pulmonis motus nempe minus expanditur : siquidem cum illorum inflatio à majori aëris in pulmonales cellulas irruentis copia oriatur atque illa à majori vel minori claustrorum capacitate, quæ à majore vel minore vi, quâ donantur respirationis muscoli, quæ, ut probatum fuit, minor existit. Hinc intelliges sanguinem idoneum reddi, qui per pulmonum vascula ægerrimè fluat. Itaque in

MECHANICUS. 55

flammationem in ulcus terminandam accersat, vel pone se viscidam ad limi instar materiem relinquat, dimittatque, tubercula in pulmonibus producturam, exinde tussiet æger, verum sine nisu violento, tumores enim illi non multum incommodi detento faceffunt, atque sensus quidam gravedinis in pectore percipitur ac difficilior à celeri quopiam motu aëris haustus, eadem ratione ad tussendum stimulus major erit, & respiratio difficiliùs peragetur quotiescumque pectoris cavum ad angustias redigitur. Quemadmodum saturatus venter expansivum septi transversi motum impediendo, in inspiratione efficere potest. Quamobrem tot ac tantos à cibo tussendi exerit conatus, ut tandem assumpta evomat, itaque ventriculum onerantem cibarium sarcinam deponat.

36 TRACTATUS

§. I V.

Si parva hæc tubera unum tantum pulmonis latus obsederint, ibi gravaminis percipietur sensus, ad quod conversum ægrotantem magis quàm ad alterum exercet tussis : sanguine viscido existente ejusdem motu lento ac tunicarum, ex quibus emergunt glandulæ, relaxatione, viscida non modo majori proportionem quam liquida ex sinu suo dimittet. Sed & adhuc viscidiora (prop. 15. 20. 22. de secretionem) exinde ventriculi, asperæ arteriæ organa secretoria, illaque quæ liquida in os eructant materiam solitam tenacitate superantem fundunt, & uberiori rivulo, hisce intellectis intelligi & illud potest quare, & imminuta fames & potulentorum appetitus ægrum detineant, linguaque spurcitie sit incrustata necnon rauca.

nis quæ omnia ægrum urgent ,
 quod omne à viscidiori sanguinis
 diathesi , imminuto fluidi nervei
 ad partes affluxu , ex summe hiul-
 cis glandularum ostiolis , quo fit
 ut hæctica subsequatur febris (*ex
 theoria hujus febris à Cheyne tra-
 ditâ*) & quæ sequuntur , immo-
 derata sitis , anorexia , rubellus lo-
 tii color , pulsûs celeritas , rubes-
 centes post pastum malæ , calor
 in adversâ manu , ac pedum plan-
 tâ deurens , hypochondriorum ac
 conficiens macies.

§. V.

Verum enim verò si in hoc re-
 rum statu tyrannide hujus mali
 comitatur æger sine ullo artis sa-
 lutaris præsidio vel si perperam
 tractatus ut intensior evaserit (uti
 in genere per pectoralia & balsa-
 mica evenit quibus tractati , ex iis
 pauci morbo convalescunt) mox

38 TRACTATUS

relata symptomata in ultimo erunt: stadio, ac confirmata tabes extemplo se prodet, non secus ac nova de genere phlogodeo, febris; solidorum enim mollitie ac laxitate, incrementum non secus ac minus fluida redditâ humorum massâ, tubercula de die in diem augmentum sument, accedit quod urens æstus, illa ad inflammationem, suppurationem dirigat, quæ lateris dolorem pleuriticum, pulmonis inflammationem ac demum putridam ac per intervalla recurrentem febrem accersent ubi primum abscessuum crepatura facta est, fit ulcerus, ex quo ubertim maleque olens dimanat sanies pari proportionem per tussendi conatus egerenda; ac dum sanguis glutinosior perseverat, ac incernicula seroso latice ubertim prolui pergunt, plenius concoctum profluet phlegma (ex iisdem calatoriis

salivæ separationi destinatis (secretu vel tussi (per præfatam de secretionem propositiōem) adeo ut tussis acerbior , sputum copiosius fiat. Ægerque nocturnis sudoribus diffuset , cuticulares enim pori patentiores , & præsertim somni tempore magisquàm ubi evigilat , sanguinisque cursus lecti calore celerior factus , duplici de hoc nomine sudoris materiam extra cogent , quæ si intus cohibetur altera quævis excretio increset , & hæc *intestinalis* erit ; intestinis enim secretoria organa maxime flaccida existunt eorumque orificia dilatata : quamobrem diarrheæ atque undique copiosis rivis fluens sudor alternis vicibus tabidi vires exhauriunt , devastantque. Verùm si ambas has egestiones suppressi contigerit , retentus liquor in partes eas ruet , quæ lentissimè moventur , minimamque pressio-

50 TRACTATUS

ni obijciunt molem. Ast cum crura maximè diffita sint à corde accerebro, cursusque per ea liquidorum pigerrimus in corporis erecto situ, & fibrarum compaginantium tonus debilissimus, cum fiat vegetus tensionis gradus ad resistendum vi, quâ provoluta liquida conantur vasa ad tactum posita diducere, ipsis deficiat; igitur illa in tumorem assurgent, quotiescumque evacuationes de quibus mox dixi, evanescent. Nihilominus tamen tunicarum glandularum atonia efficit uti foras contenta exprimere nequeant, unde tumorum obortus, & interdum *ulcerationum levium* ut oris cavitas ulcusculis obsessa ceratur ac non sine dolore deglutitio exerceatur.

§. VI.

Discussâ ac enucleata quam brevissimè

vissimè Consumptionis genesi post suppressam quampiam excretionem æquè facilè ejusdem ab aliis ortum demonstrarem, nisi hoc ultra præscriptos à me hujus diatribæ limites duceret de quo forte opportunior alicubi offeretur dicendi locus, cum multa observata ac pericula circa hujus malicurationem fecerim quæ luce meridiana, longè totoque cælo diversa ab iis quibus uti hætenus consuevit medicorum vulgus, auxilia indicari demonstrant.

§. VII.

Examinandum in præsentia incumbit quàm bellè, quamque rectè præsens pectoralium, ut aiunt, nec non balsamicorum ope curandi ratio respondeat à prægressâ theoriâ hujus affectûs desumendis indicationibus: præcipuæ autem illæ sunt humores fluidiores red-

dere , fibras jam tono destitutas ,
 tenfas ; atque viscidam, hærentem-
 que pituitam ad notum discutere ,
 ne ventriculi atque oris incernicu-
 la , quæ prædicto viscido , ac glu-
 tinoso succo infarcta longiori ejus-
 dem morâ ulterius relaxentur.

Quæ pectori dicantur remedia ,
 quæque pharmacopolia in genete-
 promunt sunt *decoctum pectorale* ,
sirupus botryos , *glycyrrhisa* , *scabio-*
sa , *hissopi mel* & *oximel scilliti-*
cum , *succus glycyrrhise* , *looch de*
caulibus , *furfuris decoctio papave-*
ris passularum , *pineorum* , *portu-*
laca diacodium species diatraga-
canthi frigidi , *pulvis Haly*. At-
 que inter simplicicia celeberrima
 sunt vel *saccharum* , *mel* , *liquiri-*
tia. Verum omnia hæc si *mel* ,
oximel scilliticum sirupum scabio-
sa exceperis (ut pote vomitum
 proritantia) dulcem aliquam le-
 nem viscidamque recondunt mu-

cilaginem hinc directè medici con-
 filio hic adversantur quatenùs &
 humectant nimùm solida, fluida-
 que summoperè densant, Stoma-
 chum materiâ quâdam glutinosâ
 ac gravante opprimunt, quo ille
 minùs famis impressioni susci-
 piendæ reddatur idoneus Coctu-
 ram pessumdant atque eâ ratione
 plurimùm sitiet Æger. Quando-
 quidem Pharmaca huic morbo
 debellando dicata contrahendis
 solidis paria, attenuandisque li-
 quidis. Necnon suo tempore ex-
 pellendæ materiæ tenaci in glan-
 dulis nidulanti deberent esse &
 idonea. Hinc leniter vomitum
 cientia, mitia stomachica, mo-
 derata exercitia, potissimum jux-
 tà Sydenhami observata equita-
 tio, siccus, & purus perflatus aër,
 balneorum frigidorum usus modo
 non multum in iis moræ nectat,
 neque morbus multum viribus

64 TRACTATUS

auctus fuerit, vesicantia sæpiùs
 admota, victus digestu facilis,
 hæc & alia similia magis faustum,
 felicemque habebunt eventum dū
 morbus in cunabulis adhuc est.
 Verum ubi eo processit malum,
 ut in ultimo stadio constitutum sit
 non nisi mors expectanda. Id au-
 tem curanti agendum superest,
 ut morbi fœvitiem mitiget leniat-
 que quò meliusculè reliquum
 quod superest vitæ traducat. Sic
 autem stante morbo, non ita fa-
 cile est certum quodque fallere
 nequeat, de ejusdem exitu judi-
 cium adstruere, illudque non se-
 mel fallax ac infidum animadver-
 ti cum Ægrotantes morbo assur-
 gerent, de quibus antea actum
 esse videretur. Similem autem ca-
 sum bis praxeos fortuna obtulit
 primùm Panifici cujusdam (hujus
 generis homines, *Ramazzino* ani-
 madvertentē de morbis Artificum

pag. 184. obnoxii sunt huic morbo quod & observavi) qui cum tussi p r annum conflictatus esset e  usque increverat illa , ut ubi prim m ipsum adii invifendi grati  , ad has angustias compulsus invenerim videlicet ventriculo summ  debilem , sitis ardore  stuantem , his accedebant urina ignea lateritio sedimento donata , lingua fordida , sudores quamvis nocte copiosius ingruentes , tussis pen  jugiter urgens , multa laudabilis tibi sanguineis striis commixti exspuitio , qu  tetrum & minim  ferendum exhalarent odorem , Cutis autem squalida corpusque marcore confectum , ac artuum ea debilitas , ut vix   lecto surgere posset ; in hoc miserando rerum statu ipso percipiente ea pr scripsi qu  symptomatum foevitiei leniend  paria duxi , quin illi ullam convales-

centiæ spem promitterem : verum præter omnem expectationem cessit res, nec me opinantem fefellit eventus, cum paucis post diebus, transactâ nempe hebdomadâ, ipsum invisi; melius enim se habebat & religiosâ, erga Medici præcepta, observantiâ intra mensem par erat epotandis aquis chalybeatis à me præscriptis, & ad eum planè modum sine ullius recidivæ metu convaleuit. Remedia autem quæ in usum advocata, ea erant quæ præcedens theoria indicat, & quod autem balsamica attinet quæque stomachica vel diuretica in usum vocare solet Medicorum vulgus, ea vires has habere videntur ob acidas & salinas mixtiones, cum ex se ipsis si notabili copia intus fumantur & debilitant ventriculum, & incendunt sanguinem, itaque

magis promovent, quàm reprimunt malum. Verum fini ob quem in genere jussa videmus, sunt penè incongrua, ulceratis enim partibus admota parùm emolumenti afferunt, quamobrem plerisque emunctanaris Chirurgis è praxi suâ exauctorata sunt, ast ut ut immediatè languenti parti applicata perparcè sanguinem subeunt magis alteratura quam si per Os assumptæ fuissent quævis balsama spissiora adhuc sunt quævis materiâ in glandulis secretâ cujus tamen lentor numero plicationum arteriæ convolutæ respondet ut clarum est ex 2^o Coroll. prop. 9^a de secretionem. idcirco ut magis lentescens à sanguine per colatoria secedere posset humor quam qui per quælibet fecerni solet ut balsamicus intestinalis tractus, arterioso ductui ex quo Glandula emergit cor-


respondens magis convolvi, intorqueri necessum haberet quilibet arteria, quæ cōm constituit siquidem testiculi humani circumvolutiones, illas, quæ in intestinis notantur quinquagies superant: intestinorum autem plicaturæ sunt nonaginta sex (ut Cheyne observavit *neuv. Theori. of Fevers* pag. 50.) testiculi autem contorsionum multitudo æquatur quatuor mille octingentis. Nam Bellinus narrat (de motu cordis propo. 40.) longitudinem complicatæ Arteriæ testiculi humani æquare 300. ulnas & altitudine illam $\frac{1}{2}$ partis ulnæ. Hinc numerus plicationum statuendus æqualis 4800. jam verò uti 96. ad 4800. sic 1. est ad 50. quare si balsama æquæ viscida essent ac liquor feminalis in dydimis secretus ea ut in lactea intruderent intestina habere deberent longitudinem quinquagies;

naturali majorem ut quinquagies tanto complicatiora esse possent vel balsama quinquagies fluidiora quam naturaliter sunt. Hinc suas notas deperderent ut certum sit balsama quatenus talia nunquam ad affectam partem pervenire itaque nunquam sanare. Putabit fortasse Quispiam, ex mox dictis exiguum valdè diametrum me chili moleculis vasa lactea ingredientibus impertiri dum non minores existunt illæ quam necessarium est ad vitam & sanitatem : Cum si quævis molecula indissolubilis solidæ cujuscpiam materiæ putà lapidis vel mineralium (quæ bina interdum in praxi usurpantur) lactea ingressura esset ejusque esset diametri quæ capillarium orificio in humanâ machinâ major existeret ; profectò in chili-feris hæreret phlogosim induceret, Gangrænâ atque demum mor-

tem. Ast Lewenoëkius intervenit
sui microscopii, in humano Cor-
pore ea detexit vascula quæ diame-
trum habent minorem 79200^{es}
pollicis crassitie atque æquali ad
minimum exilitate gaudere ade-
bent lacteorum oscula.

Coroll. 1. infertur. 1^o. summè
necessaria esse ubi dura ac con-
sistentia exhibentur remedia (uti
chalybs, pulveres testacei) horum
tenuis levigatio, si quid emolu-
menti ex hisce auxiliis expectan-
dum in corpore.

Coroll. 2. sequitur. 2^o. hujus-
modi remedia quemadmodum
vulgo præparari consuefcunt tan-
tummodo in primis viis suas vires
exerere, nec ullius esse usûs ad
corrigendam sanguinis aridam
quæ supponitur diathesim.



CAPUT IV.

De Hydrope.

DEfinitur Hydrops aquosa inflatio vel totius corporis vel partis cujusdam : in binas difpescitur species in Anasarcam scilicet & Ascitem : In anasarcâ crura insolitus occupat tumor, isque major quàm in ascite, & digiti prementis foveam servat, at non diù perseverantem. Uti in leucophlegmatiâ, Lotium pallefcit, ubertim educitur, æger nequaquam siticulosus, quamvis aliundè inappetentiâ laboret, ascitem constituunt crurum tumefactio, imi ventris, & scroti, aquosus latex interdum in abdominis carum adigitur aliquandò verò in vasis aggeritur, & hoc vel ob aliquam membranæ dilatationem

vel lymphaticorum ductum quē-
dam infarctum. Aqua hæc vario
colore tingitur, falsum sapit,
lixiviosa parum corrosiva spumef-
cens cum aquâ miscetur communi,
urina rubro suffusa colore sedi-
mentum ejusdem coloris pauca
tamen mole infrâ dimittens, sitiss
ultrâ modum, cibariorum famess
quam exiguiissima.

Quæ hunc morbum antecedunt
non multum dissimilia videntur
iis, quæ Consumptionem præce-
dere solent, si illa exceperis quæ
potissimum pulmones respiciunt,
quibus præexistens malum potiùs
ad tabem quam Hydropem vergit.
Quæcumque enim sive extenuan-
tem affectum sive Hydropem an-
teire solent, omnia humorum
massam ad lentorem, & solida ad
laxitatem disponunt. Villorum
atonía in Hydrope major simul
magisque universalis quàm in
tabidyy

tabidis existit , sanguisque adeò lentè per vasa fertur ut excretio cutanea tantùm non ex toto suppressa sit : adeò ut feri copia aggesta in eas partes decumbat necesse sit in quibus seroso laticè recipiendo major observatur dispositio , quales sunt pendentes relaxatæque multum partes uti femora crura & viscera. Ascites autem rarò sine ullo vitio renum prægresso adoritur ictero, hepatis tumore , vel alterius visceris , quo fit ut lymphatici ductus aut nimis distrahantur , aut rumpan-
 tur. Ast morbus regius , & præfati tumores facili negotio oriri poterunt à fibrarum mollitie , sanguinisque tenacitate (*Dolæus enciclop. medic. pag. 364. & D. Leich. exercitat. de Hydrope*) omentum observarunt in Hydrope defunctis vel tuberculis refer-
 tum , vel putrefactum , & hæc

est ratio cur inter alios scriptores laudatus Dolæus iter à ventriculo ad vesicam tendens supposuit. Hi autem tumores effectus æquè ac causa mali esse possunt cum & flavus morbus, & jecoris, lienis, pancreatis, mesenterii omenti &c. tumores propter assignatum fluidorum & solidorum statum produci possint, ut suprà demonstratum, at ubi visciditas cruoris in dies crescit in tabe ratione superiori capite assignatâ, ità & in dies aquosior evadit Sanguis, atque arteriæ convolutæ glandulam compaginantes nequeunt factis diduci, eaque propter parum admodum ex liquoris purpurei massa derivant, propterea quod & villi justo laxiores sint, Sanguisque pacatior incedat ut serii copia perpetim adaugeatur, atque tali quem diximus, existente sanguinis fluxu fibrosæ ejusdem

partes in medium canalis, quem ille idem percurrit secedunt, non dissimili planè ritû quo cernimus Sanguinem scutellâ exceptum ferrosam partem ad continentis latera adigere, donec tanta sit pressio quæ ferro per poros vasis trudendo sufficiat ac locando inter interjecta pororum interstitia vel dilatandis eò usque interpositis hisce vacuis ut exindè vesiculæ ferum continentes efformentur.

Ex his breviter enarratis in propatulo est eam curandi rationem sectari oporteat medentem, ut auxilia fibras debiles confirmantia moliatur, fluxiliorem humorum reddat molem, perniciositatem sanguini torpido ac languenti impertiat, promoveat quasdam vel omnes secretiones, quarum binæ illæ urinæ & perspirationis intentioni apprimè respondent. Verum multi extant Hy-

dropis casus , ubi arduum admodum est , aliquam secretionum præprimis lotii intendi , ubi primæ viæ obstructæ sunt. Præstat urinam movere lenibus catharticis diureticis atque compertum habeo tartari præparata quam optimè in hoc morbo desumptæ indicationi conducere , & ubi Stomachus & intestina benè mundata infusionem recentem the in vino rhenano non diureticum modo ac stomachicum , sed & quodque celeritatem Sanguinis motus intendere , sitim extinguere animadverti , cùm è converso quæcumque amara hætenus à me adhibita sitis sensationem intensiorem effecerint.

Sicca edulia , diuresim promoventia , potus dieteticus , exercitium , ut ut violentum modò tamen ægrotantem non multum defatiget , Coelum pariter siccum

balneum frigidum , & grata Societas majus levamen ægrotantibus afferunt quam quælibet medicamina sine illis exhibita.

Villifius quosdam anafarcâ curatos solâ aëris nebulosi in fere-num siccumque mutatione in quem secesserant ; neque dubito quin plures morbi possint æque tuto ac jucundè , si non ità tamen maturè, regulari rerum non naturalium usu , ac quibusvis aliis remediis debellari.

CAPUT V.

*De acutis morbis & præsertim
Febris.*

§. I.

A Cuti affectus potissimum dolore stipati , sive febres, sive pleuritides, sive rheumatismi, sive

78 TRACTATUS

colicæ &c. extiterint in genere aut solito majorem solidorum contractionem pro causâ agnoscunt, vel nimis præcipitem fluidorum motum vel hæc duo simul.

§. II.

Doctor Cheyne in novâ Februm theoriâ fusè latèq; demonstratum reliquit universalem acutarum Februm originem esse vel infarctum vel glandularum crispaturam quâ cum sanguinis, tum fluidi nervalis adaugetur copia, exinde omnium febrilium symptomatum explicatio liquet.

§. III.

Si dolor intensus sit præsertim in membranosis partibus exca-
descentiam febrilem producet, vel intendet; in dolore quippe partes affectæ jugiter contractæ sunt (ut evidens est ex doctrinâ

Belliniana de stimul. oper. de
urinis & pulsib. pag. 85.) exin-
de fit ut sanguis , spiritusque in
motu vel ex toto sistantur vel re-
tardentur ; & pars in tumorem
assurgat , atque à majori vi quâ
canalium latera premunt , uti
semper accidit , ubi directio se-
cundum axim impeditur doloris
sensus increfcet & latè diffunde-
tur contractivusque nifus magis
vel minus cæteris partibus com-
municabitur , fecretiones suppri-
mentur , sanguis copiosior eva-
det , ex quo deinde orietur vel
orta adaugebitur Febris. Ad hæc
dolor ut pote stimulus solidorum
vibrationes vegetiores ac den-
fiores , ut ita dicam , reddit itaque
sanguinem in minimâ attegrat ,
majus exinde spatium occupatu-
rum superficies enim corporum
cum dividuntur non tam decref-
cit quam soliditas : Siquidem fo-

80 TRACTATUS

lidades sunt ut cubi vel in ratione triplicatâ, superficies autem corporum ut quadrata diametrorum ita ut quo magis teruntur ac minuuntur corpora, eò magis sensibilem spatiorum replent locum, perinde ac si molecularum mole inalteratâ manente, earumdem auctus fieret: cum videamus omnes effectus qui ab redundantii copiâ proficiscuntur æque produci ex divisione.

§. IV.

Hæc major liquidi purpurei fluxilitas majorem spirituum animalium suppeditabit copiam ut cuilibet secretionum mechanicâ noverrit, exploratum est. Cumque febris nihil sit aliud quàm velocior sanguinis circuitus. Hujus velocitas cum rationem habeat quæ est: composita ex frequenti, eoque vegeto Cordis pulsu directè:

atque sanguinis resistantiâ reciprochè : Cum constet , quo frequentior , & fortior in cordis fibras carneas esse liquidi cerebrosi affluxus , earumdem contractionem proritaturus , eò celerius fortiusque illud contrahi ; pariter cum notum sit magis fluxilem humorum massam , minorem etiam objicere resistantiam ; sequitur immoderatam sanguinis fluiditatem febrem vel excitare vel excitatam augmentare.

§. V.

Nunc autem quæ magis obvia febris producit , Phœnomena ex velocitate sanguinis adaucta evolvere demonstrare animus est.

§. VI.

Febrilis pulsus vel fortis vel celer uterque tactu percipitur , æger autem calidus, sicus & irrequie-

82 TRACTATUS

tus siticulofus , linguam fordidam
vel exsuccam habens ex fomnis;
adhæc deliria convulfiones & pul-
fus interdum debilis ac intermit-
tens, quandoque fudor undiquè
manat frigidus , & æger moritur.

§. VII.

Sanguis per fanguiveha arterio-
fa perneciter ferri nequit nifi Cor-
dis motus frequentius & fortiùs
peragatur , vel utroque modo :
atqui arteriæ dilatatæ vel pulfus
fyncronus eft cordis contractioni
magisque vel minus illa dilatatur
pro ut magis vel minùs fe con-
trahens cor excurrit fpacium : ita-
que fanguinis in orbem lati cele-
ritas folito major caufa eft pulfus
celeritatis , vel vehementiæ vel
utriufque.

§. VIII.

Citatiore existente fanguinis

fluxu, quælibet corporis pars celeriore illius accipit quantitatem eodem dato temporis intervallo, quam si idem segnius procederet. Cum sanguis semper calear (à quocumque fonte calor ille processerit perinde enim est) fit ut quæcumque pars corporis redundantem liquidi vitalis molem continet, magis exæstuet atque assertum hoc tam facile demonstratu est ut non opus sit huic insistendi videlicet *ceteris paribus calor animalis est in ratione compositâ ex quantitate sanguinis & ejus velocitate* plura alia sunt quæ & suum symbolum in æstu febrientium incitando conferunt. Ast certum & evidens est illum ab adaucto sanguinis motu scaturire.

§. IX.

Ingens hic fervor febrientem reddit & *aridum*, ob exhalan-

tium tenuiorum ex fluidis partium defectum, & *implacidum*, seu quod eodem recidit variè situm in lecto mutat, nunc ad hanc, nunc ad alteram partem accumbit; eo fine ut quid solatii, malo quod patitur, afferat.

§. X.

Operatur autem prædictus febrilis calor quemadmodum omnes in genere stimuli, & quod indè sequitur glandulosum sistema coarctat & exindè quod tenuius est, faciliùsque dilabatur à colis exprimitur; dum remanens sanguinis pars spissior ac densior quàm in naturali statu fit igitur detentus ariditate juxtà atque calore afficietur.

§. XI.

Crassis sanguinis moleculis in hoc casu retentis viscidior ille evadit

dit & adhuc viscidior ac tenacior ob calorem ut experimentis compertum est. Si enim calori minori aquæ ebullientis ferum admoveas in gelatinam vertetur : In febribus sanguinis fervor magis intensus est quam plerique opinantur : calor cutis hominis , cujus arteria intrà minutum sexagies micat eamdem habet rationem ad calorem quem habet ebulliens aqua quam $\frac{12}{1}$ ad $\frac{32}{1}$ ut ex thermometro clarum est ; quamobrem parùm abest quin calor aquæ dum ebullit incitus triplo fervidior sit sanguine hominis sani , jam verò si sanguis eò magis intensivè caleseat quò plures intrà datum tempus falsus edit arteria (uti necesse est si arteria digitum feriat eadem quâ solet , vi , & communiter fortiùs pulsât) homo tunc cujus intrà minutum $\frac{133}{1}$ pulsus eduntur ebullientem aquam calore æqua-

ret hinc ratio reddi potest densitatis quæ in sanguine pleuritico- rum & aliisque morbis in inflammatoriis detentorum cernitur sicque sedulò præcavendum à pernicioſa eorum praxi qui vel ex illis quæ obſervarunt vel ex aliorum relatu quod nempe ſalia volatilia & ſpiritus ut cornu cervi ſaſſammoniacum ſeroſum laticernum ab acidis coagulatum diſſolvant: exindè præpoſterè præſcribant calida ſtimulantia remedia cum imminenti *Ægrotantium* diſcrimine, ſi non ruina atque hoc faciunt: falſæ illi hypoteſi innixæ ſanguinis denſitatem ſoli acidis coagulanti debitam eſſe: cujus contrarium in una ex ſuis diſſertationibus (de opera quam præſtant &c.) ſcitè confecit pit.

§. XII.

Sanguis igitur multiplici di-

nomine visciditatem contrahet
 atque ex tali sanguine parcior sa-
 liva secedet, eaque justocoeno-
 sior magisque lenta, cum quan-
 titas secretæ materiæ sit reciprocè
 ut sanguinis lentor (ex propos.
 17. secret. animali.) prætereà
 quoniam plenissimo rivulo effun-
 ditur salivalis liquor cum sangui-
 nis motus lentissimus est ut de-
 monstratur ligaturâ jugularibus
 injectâ, sequitur linguam aridam
 exsuccam fore.

§. XIII.

Orificiis glandularum angus-
 tatis ob stimulum caloris; è duc-
 tibus emissariis saliva parcius fluer
 & æstu citissimè dissipato quod
 tenuius ac magis fluxile in
 suo sinu gerit; fit ut totum Os im-
 pensè arescat. Indè repetenda si-
 nis illa inextinguibilis de quâ ~~Æg~~
 rotantes conqueruntur.

§. XIV.

Dum celeriori passu fertur sanguis major ejus moles eodem dato tempore ad encephalum appellit, atque celeritas fluidorum increfcens secretionem fluxilem, ita dixerim, præ viscida promovet (ex propof. 20. de secretionem animali) cum spiritus animales qui ob exilitatem fuorum componentium visûs aciem fugiunt, omnium secretorum liquidorum tenuissimi sint duabus hisce de causis sanguine celerius per vasa provoluto, lymphæ nervalis secretio major fiet; hoc spirituum copiosiori affluxu tubuli nervei omnesque carneæ fibræ magis replebuntur & extendentur ultrâ mensuram exindè sensatio valdè vividâ. Porro cum ad somnum villorum relaxatio desideretur simulque sensûs exercitii cessatio, neu

trumque mox dictorum adfit, ubi sanguinis undæ rapidius feruntur sequitur fore ut major sanguinis celeritas somnum intercipiat, ægerque exsomnes transigat noctes.

§. XV.

Accedit his delirium : Nervi enim intus suo liquido magis repleti suis undulationibus *densioribus* seu vividioribus atque frequentioribus nimis vegetum efficiunt sensum, vel minimo impulsu nervorum finibus communicato, excitandum, & quo vividior objectorum in Organa impressio, eo huic magis attendet anima siue illam concomitentur dolor, siue voluptas, & ad hunc modum tota quasi absorpta in præsens objectum, formare ideas negligit; jam considerandus homo in eo statu in quo tam cita tam prompta est sensatio ut hanc

Vel ipsa maximè vulgaria, usque proculcata objecta concitent; supponamus hunc ità esse in aliquod objectum præsens intentum, ut nihil aliud mente agitet atq; de observatis ab eo ità loqui juxtà ac si eadem species animæ objicerentur sine ullo interim judicii exercitio incomparādis ad invicem antea actis. Id rerum ideis in memoriæ promptuario reconditis facile patebit ejus sermonem incohærentem vel incongruum fore, in quo consistit delirii rario.

Ast quoniam sanguis densior est ob suarum fluxilium partium evaporationem, ejusque celeritas tantoperè adaucta impressiones in fibrillarum nervearum extremitatibus ab objectis impressæ oppido acres evadent, hinc reflexus succi nervalis ad Animæ sedem æque promptè perficietur ac si segnius moveretur sanguis,

nervique ab effluviis ab objectis externis manantibus attraherentur adeo ut eadem plane in Animâ suscitentur. Verum imagines quæ excitarentur, si representata in rei veritate adessent, cumque omnes hominis actiones ideis, quæ in cerebro cientur, accommodentur, tales producentur, quæ per objecta externa fieri consueverunt, quamvis nullum horum præsens sit eæ erunt quæ sequuntur gaudium, timorem, angorem, vindictam &c. Hinc astantes concludunt hominem à rectâ rationis semitâ aberrare vel delirare.

§. XVI.

Convulsionum ratio in muscutorum invitâ contractione sita videtur. Hæc autem constrictione ebullitione Sanguinis arteriosi, & fluidi nervei perficitur: hoc autem in musculos derivatur Ani-

mæ nutu ad actum, vel tubulorum nerveorum quos perfluit tremore, qui sit autem ut nervi succutiantur ac tam irregulari motu in suppositis circumstantiis agitentur, evidens est ex eorum ultimâ sectione, verum convulsiones ab hac causâ pendentes universè vegetæ sunt, neque tam frequenter quàm suprâ explicatæ incidunt quæque appellantur *Subsultus tendium*, & hoc modo oriuntur.

Dum Sanguinis cursus velox est: ejusque calor durat, demum ad eum visciditatis gradum perducitur, ut paucas admodum vel nullas exiles fat, ut arcta nervorum ostiola subeant, suppeditet moleculas, subsidio spirituum exinde deficiente, eorum copia eò usque decrescet ut impares retinendis antagonistis in æquabili utrinque nisu contractivo extiterint; fluidi cerebrosi in antagonistam aditus

non intercipitur modò sed etiam cum Spirituosus latex in nervum in musculum crispatum terminandum, subsistant in eum locum retroaguntur ubi minorem reperiunt resistantiam, nempè in musculum antagonistum jam laxatum; exindè musculus hic in motum agetur, & alter à contractione remittit, & sic alternis vicibus contractio & relaxatio peraguntur & quoniam spirituum copia tam tenuis est, musculorum contractio erit & quoque oppido debilis, atque convulsivi motus tremulos illos vel subsultus æmulabuntur.

Insuper cum spirituum in nervos influxus arteriarum micantium ope promotus, alternatus sit, erit & alternatus eorumdem per emissariorum oscula, intrà musculos effluxus, nisi nervorum plenitudo officeret, undè effluxus jugiter fieret. Hac ratione ubi nervi fluido depleti

sunt alternatim ad sensum sese exonerant? ex quo muscoli alternata sequetur contractio, vel *Subsultus Tendinum*.

§. XVII.

Ægroto, debilis isque intermittens est pulsus, ipsumque vexat frigidus sudor, & primum quidem ob inopiam spirituum contractioni cordis famulatium, & quoniam in dies gliscit sanguinis lentor, ob deperditum sudoribus serum, arterias lentiori passu peragratur, quo repagula contracto cordi objecta majorem opponunt remoram: hinc uberior lymphæ nervalis derivanda est in cordis lacertos, ut hanc majorem resistantiam superet, atque multum temporis impendi necessum est antequam in contractionem illud veniat, vel ejusdem temporis intervallo inter duas arteriarum pul-

sationes majora ; verum obice victo, atque cordis villorum contractione, largâ affluentis fluidi nervei copiâ productâ, fortiori existente, velox erit quemadmodum in naturali statu, donec accumulatus obex novam illi obtulerit resistantiam, pulsusque intermiserit.

§. XVIII.

Spirituum penuria oportet ut omnes fibræ laxentur, adeò ut actis syphunculi longè patentiores fiant & quod inde consequitur, æger sudore laboret & cum sanguis adeò lentè pervasâ circumferatur calor ejus magis defervescit, sudoris exindè quoque fervor naturalis mitescit : quamo-
brem frigidus censebitur.

§. XIX.

Cum assiduo profundantur, &

consumantur spirituosii latices atque sanguinis glutem jugiter multiplicatur, inidonei ad cordis motum ciendum futuri sunt sanguinis igitur in orbem lapsus cessabit, vel quod eodem recidit mors sequetur.

§. XX.

Ex præfatis concludere licet quam digni sint nomine medicum qui concreditam sibi habeant ægrotantium vitam qui acrius sanguinem suis ut aiunt calidis, cardiacis necnon alexipharmacis incitant, stimulantque cum illis potius frigidis, dilutis atque lenibus evacuantibus furens sanguis compescendus esset.

Tametsi non omnia morborum prædictorum symptomata explicanda susceperim (ne limites quos breves proposueram hujus diatribe transcurrerem) ex recensitis
tamen

tamen quam plura ad praxim pertinentia deduci queunt corollaria quæ Medicos ad faniozem dirigunt methodum quam quæ vulgò exercetur, & ut omnes norunt valdè infelici eventu.

CAPUT VI.

De Aëre.

§. I.

AEr quem jugiter respiramus, quique semper nos circumstat suos benignos vel malignos impertire influxus necessum habet penes varias quas subit alterationes, quales sunt, quæ in illius gravitate elaterio humiditate, siccitate, calore, frigore sese prodere solent, vel prout magis vel minus heterogeneis partibus ex minerali, vegetabili, ac animali

regno depromptis imprægnatus fuerit.

Aër compressibile ac dilatabile constituit fluidum mare, terramque tegens ad notabilem altitudinem cujus inferiores partes semper magis quam superiores premuntur, spatiaque intra quæ dirigiqueant, nunquam non ponderibus comprimentibus reciprocè proportionalia sint, & cum liquidi aëri densitas eamdem rationem habeat quam illius compressio ejusdem particulæ ab invicem recedent, vi reciprocè proportionata distantiiis suorum centrorum ut Nevvton demonstravit Princip. Phy. Mathes. Princip. 23. lib. 2.)

§. II.

Aëra verè ponderare omnium primus adinvenit Galileus in exploranda altitudine ad quam aqua exanh-

lando affurgere posset atque cum reperiit nequaquam ultra 35. pedes posse alt ero statuit hujusmodi elevationis causam in aëris præmentis æquipondium unicè refundendam esse nullo autem pacto in commentitiam vacui fugam.

§. III.

Aëris gravitas ad illam aquæ juxtà Boilei experimenta eam proportionem habet quam 1. ad 1000. Ast hujusmodi observata si cum illis halesii atque Isaaci Nevvtonii conferamus forte magis verosimilem reperiemus quam assignant inter aquæ, & aëris densitatem, rationem, videlicet ea intercedit proportio inter densitatem aëris & aquæ quæ inter 1. & 800. existit & cum mercurii densitas ad densitatem aquæ ut 14. ad 1. densitas aëris ad illam mercurii erit ut 1. ad 11200 adeò ut aër

100 TRACTATUS

quem inspiramus , spatium occupat 1200^o. majus quam æqualis argenti vivi quantitas , verum Boileus (tract. abauct. the. admirabile raref. of. theair.) experimentis comperit aërem sine ullo adventitio calore , posse vii proprii elaterii replere locum 13000^o. majorem ubi ab incumbente atmosfera præmitur atque ex inde occupare spatium 145600000^o. majus quam idem mercurii pondus , & adjuncto calore compelli ità ut spatium longè majus repleat. Jam verò si consideremus aërem respiratum posse in spatium quadragies minus naturaliter occupato , redigi , eum possidere spatium 520000^o. majus in uno tempore quam in altero , sequitur cum numerus 13000. x

40=520000.



§. IV.

Adeò autem necessarius est aër ut sine eodem nec pauca momenta superstitè vitâ transigi queant quod evidenter comprobatur repentinum animalium finis, quæ in aëre exhaustis recipientibus posita fuere adde ideò animal occumbere quam cessat sanguinis per corpus circulus qui fieri nequit nisi idem pulmones pertransierit, qui eidem viam denegant, quandiu aëre inflante carent, sed solo aëre Pulmones turgent qui suo pondere atque elasticâ vi dilatandæ trachæ ampliandis exiguis vesiculis aëris adeptus est; exindè vasorum sanguiferorum latera diducuntur, patetq; sanguini per pulmonalia vascula incedenti via: Verum si ob aëris immoderatam gravitatem vel elasticitatem bronchia distenderentur, atque aëreæ cellulæ tume-

rent ultrà quam oportet ad augendam ad maximam longitudinem vasorum sanguiferorum diametrũ nunc propter spatium multò largius ab aëre repletum, tubulorum sanguivehorum parietes se se invicem premerent; itaque retardarent vel interciperent sanguinis pulmonalis progressum: & ut meum ratiocinium in hoc argumento corroborem quasdam Bellini (in præfation. ad opus suum de urinis & pulsib.) propositiones ex his quæ in 1^o. respirationis parte habentur, transcribere visum est, prop. 22^o sanguis fluere per pulmones debuit nec potuit iis non inflatis » potuit » tamen per reliqua viscera. prop. » 23 ducto in Pulmonem aëre ejus momenti; quod ramis tracheæ ad obtusum angulum convertendis, inflandisque folliculis sufficiat, non tamen tanti

» quod per nimiam folliculorum
 » extensionem, iis advolutos ca-
 » nales sanguinis occludat; totus
 » pulmo simul inflabitur, & san-
 » guis per ipsum fluet. Prop. 24.
 » sanguis nihil patitur ab aëre cu-
 » juscumque momenti sit, dum
 » in pulmonem ducitur, neque
 » cum redditur, si majoris aut
 » minoris momenti fuerit: at ve-
 » rò cum expiratur aër momenti
 » mediocris; tum sanguis ab ipso
 » solvitur in minimas partes, &
 » quidem sub ipsum expirationis
 » initium, nihil deinde patiens
 » per totam reliquam expiratio-
 » nem prop. 25^a. Aër æquò
 » rarior & æquò densior non est
 » idoneus respirationi, & utervis
 » respiretur inter varias & plures
 » affectiones, brevi animal mo-
 » ritur. »

Jam disquirendum nobis est quid inspirationis tempore contingat... inspirationis ope sanguis cui antea præclusus per pulmones aditus, ipsos peragrat ut si status hic inflationis perseveraret, nihil sanguinis per eosdem fluxui obstaret quâcumque celeritate contractio dextri cordis thalami illum adigeret; porro aëra nequit in pulmonibus moramnectere quin oppido incalascet & quod inde sequitur, ejus vis elastica remittat itaque aëre atmospherico externo specificè levior fiat. Hinc ex noto in mechanicis principio locum illi cedit, adque eam ascendet altitudinem ubi ejusdem gravitatis aërem inveniat cum eodem permansurus. Ut ut igitur turgentes aëre supponerentur pulmones, tamen constans aëris recentis subsidium adest.

et ad plures fines, ad quos utilis potest esse utilis, atque adeò hallucinantur, qui respirationem alternatam videlicet inflationem et Pulmonis depressionem simul cum contractione atque relaxatione musculorum huic operi famulantium) eo fine in animali institutam esse autumaret ut sanguis per pulmonalia vascula permeare posset ut aër exindè vitæ flammam accendere, nimis æstuantem sanguinem hic pertranseuntem ventilare atque refrigerare, fuliginosas ejusdem portiones foras elidere, vel etiam suos nitrosos faeces sanguini dissolvendo imperare, tandem ut partes ejus elasticæ vibratilem oscillatorium sanguinis partibus communicarent motum, decipiuntur, inquam, cum horum multa non secus ac fines, quibus destinata feruntur, gratis supponantur, quippè om-

nia hæc commoda vel fines haberi & quoque possunt tempore quo pulmonales cellulæ aëre replentur quamobrem naturam, quæ nihil in cassum operatur, nunquam pulmones hisce finibus destinasse credendum, quandòquidem obtineri sine respiratione possunt.

§. VI.

Atqui, cum respirationis actio sit extrà omnem dubitationis aleam, excutiamus sodes quid eveniat dum quomodolibet pulmonibus aëra eliditur.

§. VII.

Vasculorum sanguiferorum parietes, qui primum, pulmonibus aëre repletis à se invicem secesserant, jam nunc iisdem pulmonibus in acervum veluti coarctatis unà premuntur, & sic contentus sanguis disrumpitur, discerpitur, at-

teritur in innumerabiles easque exiguas moleculas exindèque magis idoneus quam plurimis corporis colis pervadendis exsurgit.

§. VIII.

Ex dictis sequitur aërem vel nimis densum vel nimis rarum (modo ad exitialem gradum nequaquam evectus sit) ut respirationi peragenda ineptum, ita necessario nocivum fore, proindèque altissimorum montium cacumina insalubria censenda non secus ac infimarum convallium loca.

§. IX.

Cumque sanguis hâc ratione minùs dividatur ac attegretur in partes minimas omnibus illis morbis qui à nimiâ visciditate procedunt exindè pandet iter. Verum hinc vix ulli morbi chronici gene-

rantur nisi qui vel immoderatum liquidorum lentorem pro causa agnoscunt vel eodem lentore foveantur augenturque, uti icterus, cachæxia, hydrops, asthma, febris intermittens & hypocondriorum pathema nec ulla unquam extitit morbosa affectio ubi majus emolumentum mutata coeli facies, attulerit quam *Atrophia* sive consumptio qui secessus in aërē puriorem quandoque plus valet quàm quælibet alia remediorum farrago sine hâc immutatione injuncta.

§. X.

Corpus nostrum æqualiter ab incumbente atmosphaera gravatur pondusque quod sustinet majus est quàm quod vulgò censetur cum æquale sit cylindro aëreæ cujus basis superficiem corporis humani æquaret. Verum cylinder aëris atmospherici æqualis est cylindro

aquæ

aquæ ejusdem baseos. Atque 35. pedes alto, ut Galilei exprimentis de anthlia patet; ita ut quilibet pes quadratus superficiei nostri corporis prematur à pondere aëris æquali 35. pedibus cubicis aquæ; ast per experimenta pes cubicus aquæ continet 76. libras medicas (ex 12. unciis emergentem) hinc area pedis quadrati superficiei nostri corporis sustinet aëris quantitatem æqualem 2660. lib. quia $76 \times 35 = 2660$. & quot sunt pedes quadrati ab area nostri corporis comprehensi, tot & erunt multiplicatæ 2660. libræ ponderis quod corpus sustentat, adeò ut si superficies cujusdam corporis humani contineretur 15. pedibus quadratis quod ad veritatem quam proximè accedit, sustineret pondus 39900. libras adæquans nam $2660 \times 15 = 39900$. quod exæquat triginta

110 TRACTATUS
circiter Ton : mensura est angli-
ca 2000. libras continens)

§. XI.

Prægrandis etiam observatur o-
neris aërei quod corpus humanum
in diversis temporibus sustinet,
diversitas, totum aëris prementis
humanum corpus, pondus, dum
mercurius altissimum locum in
Barometro occupat, est, ut jam
probavi æquale 39900. libris medi-
cis. Jam verò demonstrandum est
differentiam ponderis aëris in di-
versis temporibus summam esse mi-
nimamque ejus pressionem in
hominis corpus æquare 3982. li-
bras medicas.

Hæc differentia mensuratur ex
diversâ altitudine ad quam Mer-
curius in barometro sustentatur;
cumque maxima elevationis Mer-
curii in barometro diversitas sit
3. pollicum, aëris columna cu-

MECHANICUS. III

juscumque baseos, æqualis pon-
 dere Cylindro Mercurii ejusdem
 baseos atque subducatur altitudo
 3. pollicum ex pressione in Cor-
 pus æqualis baseos quo tempore
 Mercurius in barometro infra 3.
 pollices descenderit, ita ut quili-
 bet pollex quadratus superficiei
 nostri Corporis, prematur in uno
 tempore magis quam in altero,
 pondere aëreo æquali ponderi pol-
 licum cubicorum Mercurii; jam
 cum pes cubicus aquæ sit 76.lib.,
 pes cubicus mercurii erit 1064.
 lib. seu 102144. drachmarum,
 & cum 102144 drachmæ eam pro-
 portionem habeant ad pedem cu-
 bicum seu quod idem est ad 1728.
 pollices cubicos uti 159. $\frac{192}{1728}$. ad
 pollicem cubicum, ita ut pes
 cubicus Mercurii (omittendo frac-
 tionem ut pote parvi momenti)
 æquatur 39. drachmis. Verum
 cum in pede quadrato sint 144.

pollices quadrati sequitur Mercurii massam basim pedis quadrati habentem : 144. pollicibus quadratis, unàque altitudini 3. pollicum æqualem, continere 4320 pollices cubicos Mercurii, qui numerus si ducatur in 59. (qui numerus est drachmarum contentarum in pollice Mercurii cubico) dat 25488. drachmas & hoc pondus pes quadratus superficies Corporis humani sustinet magis in uno tempore quam in alio : ponantur rursus totius areæ humani Corporis 15. quadrati pedes tunc sustentaretur plus in uno tempore quam in altero pondus $15 \times 25488. \approx \frac{382320.}{8.}$ drach. ($\approx \frac{47940.}{12.}$ unciiis) $\approx 398 \frac{1}{2}$ libræ medicæ.

§. XII.

Tantum abest ut mirari debeamus ab aëris alteratione sanitatem quandoque infringi, quin potius

maximè stupendum videatur illud non semper evenire, si quidem dum animadvertimus Corpus Humanum interdum mole 2000. lib. cum dimidio diversis temporis intervallis gravari, & hoc ex templo fieri. Demirari profecto subit, qui fit ut qualibet coeli mutatione corpus nostrum in Partes nequaquam diffringatur, atque subitaenæ morti occumbat; facile quis sibi persuaderet cum tot corporis vascula, aëris adauctâ pressione, coarctantur sanguinem in iisdem ad usque vitæ fontem cor stagnaturum, quod cum contrahi nequeat, ejusdem circulum sufflaminandum animalque moriturum. Ast falleretur cum id est conditoris infinitè sapientis artificium, ut ubi remora sanguini prætetlabenti opposita maxima est, cor & quoque vim suam ingeminet, pondere aëris adaucto, pulmones

impensius expandentur, indèque sanguis intimius dividitur, ut aptior evadat ad partium fluidissimarum secretionem, quales sunt animales spiritus quibus cor longè fortius contrahitur ejusdem liquidi motu versus corporis peripheriam retardato, copiosius ad cerebrum appellet, ubi subducta est aëris ambientis à cranio pressio, & hoc nomine plus fluidi nervalis secernetur. Exindè cordis adeò vegeta exercebitur contractio ut sanguinem contentum per canales pervios impellat eo tempore quo alii obstructi remanent.

§. XIII.

Pro majori vel minori nostri corporis ab ambiente atmospherâ pressione, notabilis in Sanguine visitur alteratio nimirum plus vel minus compingitur coarctaturquo in majorem vel minorem lo-

cum, in vasis quæ pererrat ; aër si-
quidem in sanguine delitescens
ipsum in æquilibrio tenet cum
aëre externè corpus gravante , &
hoc fit constanti ac perpetuo quo-
dam aëris interni ad sese expan-
dendum nisu semper proportiona-
li ponderi comprimenti quo aër
sanguinis indigena reprimitur ac
veluti arcus sinuatur, ita ut si in-
cumbentis aëris moles vel parum
decreseat , sanguinis aër mox ex-
plicit sese , vel elaterium suum
exeret quo sanguis, majus occu-
pandum spatium compellatur,
quamobrem in excipulo exhausto
duplo magis rarefiet sanguis ,
atque hoc tantummodò cucurbitæ
operatio vesicatoriæ explanari va-
let.

§. XIV.

Vegetabilia ac fermentabilia li-
quida non secus ac animalia alte-

rationi obnoxia sunt, quàm autem consideratu dignæ sint quæ frigore calore vel ob sævientes ventos in liquoribus fermentantibus fiunt mutationes, probe callent qui in hisce dignoscendis versati sunt. Porro omnes istæ variationes proficiscuntur, vel ab aëris gravitate, vel elasticitate à naturali statu degenerantibus.

§. XV.

Patet hinc cur qui doloribus vexantur, iis quodammodo utantur ad quamlibet notabilem tempestatis alterationem predicendam; sanguine enim illorum plus æquo rarefacto aëris humiditate aut procelloso vento. Fortiùs sensiles membranæ prementur. Hinc dolores exorientur, à quibus antea vacui erant ægrotantes & hoc tanto potiori jure eveniet, quod sanguis (ut ut evi-

dens contrarium videatur) exinde ne vel minimum fluxilior fiat spuma quippe vel aqua bullulis æreis turgida magis in fluxu hæret ipsâmet aquâ & cum sanguinis globuli magis tumefiant à contento ibidem aëre , ubi externa atmospheri arcetur pressio , minus ille ad fluendum aptus fiet , difficilisque capillaria tranabit ; fluido partes sunt exiguæ , læves sphæricæ vel huc accedentes , & æqualis densitatis , si homogeneous fuerit , (ex 142 prop. Borrelli de motibus à grave factis) nec opus est ut ejus partes moveantur quemadmodum opinatus est Boileus , cum non constet omnes fluidorum moleculas ita esse constitutas ut indefinenter agitentur. Nec quorundam solidorum corporum motu carere evidens est. Sanguis itaque rarefcens , potius

viscidus ac lentus, quam fluxilis evadit, talisque erit quotiescumque vis aëris elastica decrescit, vel infringitur.

§. XXVI.

Nullus est liquor, si tantisper viscidum exceperis, qui in bullas inflari ac turgescere valeat & eò magis quò viscidiora ejus componentia fuerint, bullulæque, & ampliores, & magis erunt durabiles; mixturæ Saponis cum aquâ ope emergent bullæ sphæricæ sex pollicum diametri, neque absimilibus constat partibus sanguis; habet ille diversi generis partes aqueas, salinas, oleosas, uti sensu patet illudque indubitatum remanet sanguinem in tales exiguas sphærulas conformatum (ac fortè modo quem Cheyne in principio naturalis religionis assignat) optimi microscopii interventu in

piscis cauda observari posse; purpurei globuli cum sint majores quam ut possint exiguiissimas permeare arterias, suam figuram è sphæricâ in spheroideam convertunt atque ubi ad ampliores alveos delati fuere pristinam, ultimam exuta, formam induunt. Jam veró ea est elastici Corporis nota, figuram deperditam denuo recuperare; atqui non nisi aër, vel quidquam aëris elasticum censendum est, evidens etit itaque purpureas spherulas aëre repletas esse.

§. XVII.

Ex iis quæ diximus, colligitur ubicumque Sanguis glutinosior est, modo tamen glutinis hujus vis, vi aëris se expandere nitentis, non reluctetur, hominem magis aëris alteratione affici: & hinc erui profecto possunt optimæ indicationes nedum ad

præcavendos morbos aëris degerem a naturali, statum sequentem quam ex ullo alio indicationum fonte.

Quisquis hanc theoriam probè notam habuerit, næ illud capies qui fit scilicet vel in quibusdam circumstantiis lenes evacuationes: moderata exercitia, chalibeata mercurialia præstans adeò operentur effectum in hoc visciditatis liquidorum statu; neque aliud in usum advocabit remenium ubi aliud magis convenire deprehenderit.

Expeditiùs promptiusque foret quod suscepi munus. Si speciatim de his agere, omnia minutatim dicere vellem, verum in immensum contra id quod in animo constitui, cresceret hujus operis moles, siquidem illi quorum hæc brevia tentamina captum superant, nec fusam magisque distinctam expositionem assequuntur.

Inquirent

§. XVIII.

Inquirendi modo aëris nimiùm calidi, frigidi, humidi vel sicci &c. effectus, ab omnibus noscitur quàm notabiles in universâ Naturæ facie mutationes emergunt, defluviorum à Sole manantium accessu vel recessu quibus cuncta vigent. Aggeres enim, silvæ hortique dolentium lugubremque habitum induunt in Autumnali Solis recessu, plurium specierum Animantia, ad suas latebras caveasque secedunt ibique vitam otiosam in somno torpida transigunt donec suis reviviscentibus radiis primo verè redux Sol torpentes horum fucos resolve-rit, ipsaque Animalia ad dies laboriosè traducendos incitaverit.

§. XIX.

Verno, plantas videmus ex

22 TRACTATUS

Terrâ pipire, Flores, atque deim
femina, Arbores quoque cinctas
videre florente coronâ, atque læ-
tos ostentantes fructus; dulci fes-
tivoque Avium cantu arvareso-
nare ob appropinquantem Æst-
tatem. Undenam omnis hæc vi-
ta, omnis vigor nisi à motu &
calore à Sole adventante commu-
nicatis?

Glutinosi succi rarefiunt, af-
cendunt graciles Plantarum tu-
bulos ac earum fibras expandunt,
unde vegetatio producitur. Ca-
lor artificialis idem efficit in ædi-
bus recentibus, quod demonstrat
affinitatem inter hunc & alterum
Solis.

§. XX.

Adeò ut Calor aptus sit rare-
faciendis ac in motum ciendis
nostri Corporis liquidis & su-
moderatus est relaxandis solidis

partibus. Utrumque clarescit ex
 cutis nec non venarum tumore &
 mollitie postquam nos sat probè
 calefecimus : E converso ubi fri-
 gidi sumus , venæ quasi immer-
 sæ delitescent , cutis dura appa-
 ret aspera , contracta. Verum si
 Calor præter modum augeatur
 contrahet non secus ac frigus :
 Lenis Calor , qui tantum ad hu-
 midum extra fidium quæ plectro
 pulsantur , cordas , ferendum sa-
 tis est , relaxat , quamvis exce-
 dens in acervos corruget. Actua-
 lia vel potentialia cauteria idem
 præstant. Porrò ut Calor humo-
 rum nostrorum rarefcentiam ac
 fibrarum laxationem operatur :
 ita & aëris elaterem diminuit &
 quod indè sequitur , non modo
 majorem perspirationem in Æstate
 quam in Hieme (juxta Sanctior.
 Observat §. 2^o Aphor. 41.) Ve-
 rum etiam interdum ultra quam-

vires ferunt , potissimum si debile ac laxæ constitutionis Corpus affecerit. Hinc balnea frigida , vestiariæ scopulæ usus , atque moderata exercitia manè & serò usurpanda cum subacidis & leviter adstringentibus esculentis , maximè aptum hisce Ægrotis supeditant remedium.

§. XXI.

Minimè sufficit perspectum habere aërem quatenus calidum vel frigidum plures ægriitudines producere puta febres acutas , intermittentes , Colicam , Rheumatismum , Catarrhos , Atrophiam . sed & quo pacto omnes hi affectus progerminant à datâ aëris habitudine scire juvat, aliter omnia, quæ curam spectant æquè tenebris obvoluta nobis essent , ac antea , atque hoc eo fine dumtaxat sit applicando cognitas & obvias

MECHANICUS. 125
caloris & frigoris proprietates di-
versis Corporis humani alteratio-
nibus à quibus illi morbi sua mu-
tuantur nomina.

§. XXII.

Aërem , justo calidiorem , im-
primis humido junctum , ad Fe-
bres malignas iter pandere com-
munis omnium cum veterum
tum recentiorum medicorum est
opinio , hujus autem operandi ra-
tionem ut & aliorum plurium cu-
riosorum Phænomenon , clarè
evolvit ingeniosissimus Mæad. (
de venenis pag. 161.) Verum
etsi humiditas abfuerit , si calor
modum excedat , Febres diariæ
orientur , & quandoque quæ ab
antiquis putridæ audiunt , ube-
riori rivulo perspirabili materia
trans cutis poros effluente , humo-
res , qui remanent ficcantur , vis-
cidique sic circulationi obeundæ

inepti evadunt, solidis quoque Spirituum dispendio flaccescentibus, atque tempore vespertino frigido succedente, perspirans humidum intus coercetur; hinc caloris accessio cum cæteris Symptomatibus Febrilibus comitati.

§. XXIII.

Epidemica Febres grassantur in *Sens of scambrige Schire & Hundreds of sefpex* utrisque humilibus ac humidis locis quæ aërem vaporibus onerant. Unde ejus elasticitas debilitatur, Fibræ Corporis mollescent, & cuticulares canaliculi obstruuntur. Omnibus hisce de causis, cænosum quemdam lentorem in arteriarum Capillarium lateribus deponet Sanguis, atque in Glandularum ostiolis ut ex dictis clarum est. Verum tædet me explanare modum quo intermittens Febris gignitur, quam-

obrem adeat lector *Bellinum* copiosum sanè de hâc re scriptorem (de Febris pag. 320 ad 401) ut parum aut nihil dicendum superfit. Porro si frigiditas aëri humido accesserit certius febres intervallatæ oborientur ; frigus enim contrahit , constipat sanguinemque magis compactum efficit , ut non modò segnius per vasa incedat sed & viscidior fiat ; quamobrem frigida atque humida Cœli temperies præter tusses , destillationes , pleuritides , & rheumaticos dolores , febres quoque per intervalla recurrentes gignit aliasque quæ intermittentibus maximè affines sunt.

§. XXIV.

Observare licet , hecticâ laborantes , vel atruphos in maximo versari vitæ discrimine dum nimis calidus vel nimis frigidus obtinet

aër : Calore omnia nostri Corporis vasa laxantur , cutis tubuli reserantur , & quæ per hos fit humiditas evacuatio increfcit ; in quo confiftit effentialis ac peculiaris atrophix natura (ut Cheyne Theory of fevers pag. 129. demonftratum reliquit) atque debilitata aëris vi elasticâ , disponitur fanguis ad majorem tenacitatem atque ficcitatem , itaque (ex Theor. Bellin. de urin. & pulfib. pag. 320.) augebit hecticam calor.

Si tempeftas fit summè frigida , aëris pondus non fecùs ac elasticitas incrementum fument ; & cum in confumptione tonus pulmonum fit multum infirmatus , folliculi aërei irruente aëre extendentur fuprà quàm opus fit ad Sanguinis circuitum per pulmonalem fubftantiam obeundum. Subfiftet igitur in fuo tranfitu

Sanguis tantisper, & ita omnia symptomata quæ talem obstructionem sequi consueverunt creabit, puta indefinentem ad tussendum stimulum, lateris inflammationem, pulmonum, & prætereà frigus impervios cutis poros efficiens perspirationem impediet, & indè augebitur sanguinis in vasis copia, qui idcirco difficiliùs pertransibit pulmones, & eo nomine incrementa recitata symptomata, diarrhæa succedet, cum fero enim transitus per glandulas cutaneas denegetur, ingressum per illas fistulæ intestinalis molitur, quas si permeare nequeat, crura in tumorem assurgent & asthmatis symptomata invalescunt donec occumbat æger.

§. XXV.

Præter sensibiles qualitates caloris & frigoris, humiditatis, &

ficcitatis, illud inconsum ex indubirato experimento remanet, vegetabilium, mineralium & animalium particulis nunc ubertim nunc parcè] aërem circumstantem imprægnari. Aqua pluvia tot vegetabiles moleculas recondit, ac aqua è fonte saliens, quamvis non adeò multas ac fluviatilis (juxta D. Woodvardi observata de veget. Philosop. transact. n. 253.) Colcothar. aëri expositum in vitriolum abit, caput, ut aiunt, mortuum salis marini eidem per aliquod tempus aëri objectum, Spirituum ante, distillatione elicitorum quantitatem suggere Auctor est Seignette apud Lemery (cours de Chymie pag. 285.) quid verò fiat de materiâ, quam quotidie trans cutis spiracula flamus; certè in aërem quem trahimus respiratione elavatur, atque ubi Cadaverum corruptio inceperit, na-

res tanquam fidi (ita dixerim famuli animam commonent de particularum è Corpore mortuo proficifcentium præfentiâ.

§. XXVI.

Et fanè res aliter fieri nequit ex cognitis naturæ legibus, fiquidem quomodolibet dividatur Corpus donec ejufdem particulæ aëreïs exiguioreſ evadant (in ratione majoris denſitatis quâ fit ut denſitas unius partis excedat denſitatem alterius particulæ aëris) & leviores, ficque per medium aërem affurgent donec earum coalitione gravitas uſque eo augeſcat, ut eas denuò ad terram deprimat, & nulla affignari debet cauſa hujus admirandi effectus vel in ipſis duriffimis Corporibus niſi radii Solares: D. Romer ſuis obſervationibus ſuper eclipsi fatellitum jovis demonſtrat lumen non niſi decem

132 TRACTATUS

minuta in transitu à sole ad terram impendere jam verò cum terræ ad minimum à sole distantia æqualis sit 10000 diametris ejusdem terræ, sequitur solis radios percurrere 1000. terræ diametros intra minutum id est plus quàm centum millia millium intra secundum : atque si glans plumbea eadem celeritate mota, quâ movetur statim ac, rostrum petreboli seu tormentii bellici deferit, spatium 25. annorum requirat ut è terrâ in solem migret. Ut calculo Hugeniï constat tunc lucis velocitas ad illam plumbeæ glandis erit ut 25. ann. ad 10. minuta seu circiter ut 1000000. ad 1. ita ut luminis particulæ moveantur deciescentum millia velociùs quàm globus plumbeus adhuc fervens nonne exindè expectare possimus proportionales effectus, ut ut minutissimæ sint particulæ ? Momen-

tum

tum enim cujuscumque corporis in aliud moti est, ut rectangulum factum ex magnitudine & celeritate motûs corporis. Idem coningere possumus de effectu radiorum luminis figillatim spectatorum, quod animadvertimus in iisdem collectim sumptis in speculi ardentis foco, nullum enim corpus vel summæ duritiæ aptum est huic vi resistere, vel ipsum aurum in vitrum vertere, lumen concentratum solis potest; ut ut vel vehementissimo igni culinario reluctetur uti docet nos *D. Blondel* parte scilicet quâdam in auras avolante, dum alia vitri formam induit, & hoc intra pauca secunda.

§. XXVII.

Attamen evidens est ex dictis radios solares nedum abradere vel limare ex solidissimis cor-

134 TRACTATUS

poribus adeò exiguas partes , ut
separatæ , leviores qualibet aëreâ
moleculâ fiant , verum & quo-
que celeritate quâ reflectuntur..
Poffe in aëra ponderosiora ea-
dem attollere corpora , quæ
ubi vis impressa (quæ indefinen-
ter decrefcit) minor est , quam
ut altiùs eadem corpora vehat ,
tunc necessariò in terram denuò
delabuntur ficque diverfimodè
alterare sublunaria corpora five in
fuo ascensu five in descensu de-
bent , juxtà variam quam obti-
nent naturam & proprietatem.

§. XXVIII.

Aëris humiditas femper cala-
mitofa ac infalubris primis Ame-
ricæ incolis fuit donec prodi-
giofæ magnitudinis auctores mag-
nam partem excifæ atque terræ
excultæ fuerint , unde aër magis
ferenus ac ficcus emerfit , ita u

nemorosa loca, quibus laxa corporis compages contigit, noxia censenda sunt : Ratio autem hujus ingentis humidi in locis sylvosis copiae explicatur ex *Woodwardi* observationibus (de vegetal. Phyllos. transact. n. 253.) quæ tædiosiores sunt quam ut hic adduci queant illud tantum dicam quod affusæ aquæ in cyatho ubi nulla erat planta, eadem in fine experimenti, ac in initio remanserit copia, quamvis multum hujus consumptum fuerit ascensu per exiguissimos plantarum, quæ de industriâ in aliis scyphis positæ erant, tubulos, & quod maximè expansæ atque vegetæ plantæ maximam humidi abligurierint quantitatem ac in certis vegetantibus, incrementum est ad aquæ dispendium uti 1. ad 700. debet igitur portentosum udarum particularum agmen

136 TRACTATUS

ex numerosis magnarum arborum ramis exhalare nec non in terris quæ arboribus ditissimæ sunt aëri nebulosus ac caliginosus esse.

§. XXIX.

Aër is non erit dumtaxat humidus sed & ei quid de plantis adjungetur trans quas, spirat humiditas; itaque evadere hac ratione magis vel minus salutaris potest, exploratum enim est per experimenta vel fragrantis odores ita histericas officere ut eas in syncopem aliquando conjiciantur vixque ullam adesse hominis temperiem quam unus vel alter odor non perturbet, aërem odorem in instanti nares ferire debilem verò in tempore; verum quamvis diu contractata consuetudo sensum hunc odoratus reprimere queat ut planum est in sebi candelariis pellionibus, sive coriariis, & in byrsodepsis seu qui ad solem co-

ria exquocuunt, per gradus tamen & sensim procedit hujusmodi in constitutione mutatio sive in melius sive pejus juxtà diversam operis materiem, & ex hisce tetrīs effluviis inter cæteras causas morborum frequentiores, & cum majori periculo in urbibus quam ruri occurrens genesis petenda est, magnaue funera quæ in castris visuntur, quæquæ magnam hominum partem de medio tollunt, luculenter hoc patet ex monito Judeis olim factō (deuteronom. Cap. XXIII. vers. 12. & 15.) *habebis locum etiā extra castra sive foras ibis & habebis paxillum præter arma (puta amentatum quem rutabulum latini vocant) eritque ubi opus tibi erit requie, ut eo fodias & terga vertas, & cooperias quod egressum est ex te nunquam enim superstes tam numerosus exercitus per tam longum tempus fuisset*

sine omni illâ curâ, ac diligentia, quam adhibitam legimus in exitu Israëli de Ægypto in Terram Sanctam.

§. XXX.

Morbi qui in castris sæpius feviunt, sunt dysenteria, febres malignæ, & licet varia animi pathemata, pravaque victûs ratio his producendis conducant, ut observare potero ubi offeretur occasio, interim tamen in eorum genesi principem obtinet locum aëris inrtà pulmones sumpti contaminatio à sordibus ab exercitu inseparabilibus præprimis in obsidione ubi putridæ cadaverum sive hominum sive animalium partes aërem replent intolerabili fæto, prætereà adeò hisce corruptis è corporibus mox dictis effluentibus vaporibus oneratur aër ut ejus gravitas pressioque in corpore crescat nec illud silendum; turmarum ignes & calo-

rem aëris elasticitatem infirmare posse hisce de causis respirationis munere fungi nequibit. Sanguis in pulmonibus indivisus, crassus, lentus remanebit, sterneturque via morbis qui viscidam sanguinis crassim sequi consuerunt ut febribus intermittentibus, malignis, dysentericiis ut evidenter colligitur ex theoriâ illorum morborum.

§. XXXI.

Nautæ ob aërem marinum quem respirant nimis falsum, & humidum multis morbis obnoxii sunt quos terræ incolæ non nisi nomine tenus cognoscunt, symbolum & suam confert in prædictorum morborum genesi victus, qui præprimis caro solita est, frigori, cui expositi sunt, adjunctus. Ast potissimum aëri debentur indefinenter respirato esculentis & potulentis mixto quique circum illo-

rum corpora jugiter ambit. Habent in universum alvum constipatam navitæ, & Ramesino observatore (de morb. artific. pag. 224.) ex Bartholino. Duplo ferè majori purgantium dosi, quam cæteri, indigent.

Sale aëreo & esculento, Fistulæ intestinalis corrugantur villi, & ferè insensibiles fiunt, & cum fœcum expulsio à peristaltico intestinorum motu producat, sequitur alvum subsistere, ac cathartorum vim infringi omnibus illis, quæ vermicularem tubi intestinalis motionem diminuere valent, uti omnia salè condita. Verum *scorbutus* est morbus qui truculentas edere solet strages; quemque plurimum formidant nautæ, & licet quam plurima prava secum invehat symptomata, veluti tiliarum, rubras-cæruleas vel nigras maculas, maximam vi-

rium debilitatem, ruborem pruritus marcidam gingivam, gravem seu foetidum halitum, laxos ac vacillantes dentes, inæqualitatem pulsus, violentos dolores &c. omnia hæc tamen faciliè fluunt ex sanguinis malâ crassi, aëris falsedini ac humiditati debitâ, ut mox innui, Sanguis viscidior solito erit, sal quoque intra aërem latitans, amarorque in esculenlo se prodens calefaciunt, ac in rarefactionem concitant sanguinem, qui adeò rapido cursu per vasa abripitur, globulique, ut potè majores in capillaribus hærent, donec in orbem acti sanguinis impetus materiam obturantem vel diffingat vel tollat, hinc procedunt maculæ, & pruritus cutis. Extravasatus quippè sanguis in lividum vel nigrum vertitur, cujus particulæ nonnullæ putrefactionem concipiunt ut gingivæ

erodantur & anima foeteat ; dolores , pulsus irregularitas , cæteraque phænomena ex eodem fonte repetenda sunt , quod autem falsi sit primum agens in hâc trajædiâ , clarum fit ex observationibus supra laudati Ramesini (pag. 226.) in iis factis qui falsi conficiendo operam navant : sunt enim quasi omnes cachæctici , hydropici , cum sordidis ulceribus , ac scabie in tibiis voraciores , potatores magni ac non rarenter derepentè moriuntur.

§. XXXII.

Aliqua hîc advertere fas sit de planetarum influentiis , quæ agere dumtaxat videntur aëris pondus vel elasticitatem depravando , vel effluvia ex terrâ elevando vel calefaciendo quorum calor semper impertito lumini proportionalis est cum ambo scilicet lumen & ca-

lor sint simul uti quadratum distantiarum reciprocè , & uti sinus angulorum incidentiæ. Qui autem sidera nullomodo in hæc sublu-
naria corpora influere contendunt,
ut certiores fiant, adeant *Mead.*
(de imperio solis & lunæ &c.)
is quippe ex principiis Nevvtonii
defluviorum horum à stellis ma-
nantium in corpora humana transfu-
forum ob oculos posuit , ut
jam demonstrata sit veritas quæ
hactenus conjectura probabilis
erat.

§. XXXIII.

Quinam autem futuri sint ef-
fectus ex mineralium atomorum
in aërem elevatione , sive solis
sive ignis subterranei calore, con-
jicere possumus ex affectibus, qui-
bus obnoxii sunt, qui hæc per-
trectant : Sunt siquidem illi in
genere asthmatis, atrophici, apo-

plexiæ , paralyfi , cachæxiæ , crurum vel tibiæ tumefcentiæ , dentium lapsui , gingivarum ulceri , articulorum doloribus , tumoribus totius corporis : & in specie plumbum colicam & paralyfim gignit.

Cuprum fuâ stypticitate , cum conſtanter aſperæ arteriæ in reſpiratione illabatur , ita contrahit , convellitque vaſcula , ut aër expandendis bronchiorum veſiculis ad liberum ſanguinis per pulmones commeatum impar evadat , quâpropter qui cyprium æs frequenter attrectant aſthmate laborant.

§. XXXIV.

Verum ſi omnes foſſores , certè mercurii majoribus morbis obnoxii vivunt , Fallopius (Tract. de metall. & foſſilib.) tradit eodem ſpatio quatuor menſium in
tremorem

tremorem incidere , vixque ullum per tres annos superstitem evadere , his malis accedit interdum paralyfis , vertigo , & hectica uti ex plurimorum scriptorum apud Ramazinum (de morb. Artificum cap. 1. 2. 3. 4.) testimonio apparet ut diversos hosce mercurii effectus in corporibus humanis enucleem operæ pretium duxi præmittere : argentum vivum per poros cuticulares sanguini pervadendo aptum esse. Hoc ex eo patet , quod unctione mercuriali delibuti aliquando ptyalissimum patiantur , & ipsimet metallici , idem , per tempus aliquod in ore volutando , auri colorem flavum in obscurè album mutare queant : jam verò mercurius sanguinis flumen ingressus , in his qui frequenter ipsum manibus contrectant , eundem dissolvere ac rarefacere necessum habet : cum enim decies

circiter sanguine ponderosior sit
quolibet hujus scilicet mercurii glo-
bulus vim decies majorem exer-
cebit, in sanguine disjungendo,
quâvis ejusdem magnitudinis san-
guinis moleculâ. Momentum enim
particulæ vel mercurialis vel san-
guineæ quo ipsa obturamenta res-
sistentia suâ sede molitur est ut
rectangulum factum ex celeritate
ipsius moleculæ & materiæ quan-
titate in eadem contentæ, quæ
materiæ quantitas ex ejus pondere
mensuratur: porro velocitate ean-
dem in utraque molecula existente
momenta harum erunt ut gravi-
tates, & cum mercurii gravitas
ad illam sanguinis sit ut 10. ad
1^m. sequitur mercurii momentum
decies majus fore sanguinis mo-
mento. Ast si consideremus quan-
to rapidiori motu moveatur in
his sanguis, quos mercurius subit
(pulsu existente velociori simul &c)

fortiori) nec non duritiem & exilitatem quibus globuli mercuriales sanguinem dividunt , atteruntque tanquam totidem parvi cunei in tollendis vel amovendis repagulis vias sanguinis obstruentibus : si nunquam , hæc omnia pondere-
mus , næ iis dabimus fidem , quæ D. Chyne nos docuit (nev. theori. of. fevers p. 122.) purpureum scilicet fluidum notabili mercurii copia imbutum æquè habilem esse referendis obstructis spatio 24. horarum ac ipse sanguis purus spatio trium annorum.

Sanguis ita rarefactus arteriarum quas perlabitur , tunicas ultra consuetos limites distendit itaque Arteriæ carotides nervum opticum premant , & quâvis microne ipsum succutiant , amovent eam suâ sede deturpant ejusque per retinas disseminatos ramos , sed

arum ; adeò ut idem objectum

etsi quiescens quolibet momento imaginem suam in diversis retinæ locis depingat, quodque idcirco videbitur fursùm vel deorsùm ad dextram vel sinistram, vel in orbem moveri juxtà varios, quibuss retina donatur, situs: etenim idem effectus secuturus est sive objecta in motum agantur, oculo tamem immoto existente vel hic se motet, objecto interim quiescente, in utroque casu eadem sensatio orietur, nisi quod in 2^o. casu vertiginosi dicamur, ut nihil mirum si qui fodendo mercurio operam navant, vertigine laborent.

Sanguinis rarefcentiâ adeò articularum tunicæ extrà trudi valent ut præmant, coarctentque contiguous sibi nervos ut fluidi nervalis per ipsos commeatus ad musculos ex toto præpediatur, vel partem hinc excitabitur vel tremulus motus, nullus ve.

Prætereà paralyſis ortum ſuum interdum debet duritie ac ariditati fibrarum nervearum quâ earum cavitas tollitur & ſpirituum motus ſufflaminatur, & hâc ratione tam ſenſus quam motus abolentur; ex dictis patet mercurio mirabilem inefſe vim ad removenda obſtructa, ſanguinem fluxiliorem reddendum, colatoria ſordibus abſtergenda; exindè omnium evacuationum incrementum ſanguis fluidiſſimis ſuis partibus orbatus (3^a propoſitione de ſecretione in omnibus enim ſecretionibus imprimis maximè fluxiles ſecedent à ſanguinis maſſâ) itaque ſolida plus exſucta areſcent quam in ſtatu naturali quod erat demonſtrandum.

Eſt autem & alia ratio, cur mercurius ubi in corpus majori quantitate receptus nervorum reſolutionem creet. Quippè ſi in

aliquâ arteriâ tanta mercurii aggesti adfuerit copia, ut suo pondere pertranseunti sanguini, vasorum latera extrorsum trudenti obluetetur, musculus, in quem terminatur arteria, cum jam sanguinis subsidio careat, paralyssi afficietur. Rem hanc aptius evincit injecta trunco arteriæ aortæ descendenti in cane ligatura, dum frustra infra ligamen subjectas partes animal movere nititur: idem nervis contingit, unde fluido cerebroso subripitur in fibras carneas aditus ut tandem pluribus conficientibusque rerum momentis extra dubium maneat mercurium posse producere paralysem.

Verum quomodo hecticam generet non ita facile est explicatu pro illis qui communem theoriam mordicus sustinent. Potius enim curaret quam produceret febrem hanc si debeatur causis ge-

M E C H A N I C U S. 151

neralibus assignatis. Ettmulerus (oper. medic. cap. de febre hectica) auctor est » immediatam originem » tabis esse indispositionem & inæ- » qualem sanguinis texturam pro- » ductam à salinâ scabritie lymphæ » in conglobatis glandulis, ejus- » demque spissitudinem in conglo- » meratis, exinde provenit depra- » vata & diminuta fermentatio, de- » bilitas, defectus spirituum, om- » nisque symptomatum hujus febris » comitatus. Salinæ & viscidæ san- » guinis partes ineptæ fient nutrien- » dis partibus. Et à pastu, dum te- » nues chili partes sanguinem di- » luunt, saliaque extricant, pulsus » parum elevatur, calor angetur & » transacto aliquo tempore, ad » pristinum statum reducitur, reli- » quæ chili crassiores excernèn- » tur non rarò per sudores noctu in- » vadentes cum vitiosam tincturam » à salivali humore in stomacho

»receperint » quod auctor hic de inæquali sanguinis textu perhibet non potest facile concipi à quocumque exploratum habuerit vel in ipso perfectæ sanitatis sensu in æqualem esse in suis partibus sanguinem, seu eas nunquam esse similes & æqualiter densas verum ut hanc partium sanguinearum dissimilem texturam assequi liceret similiter modum quo salina (quod semper captu difficile) in conglobatis glandulis lymphæ scabrities vel asperitas, ejusdemque lymphatici laticis lentor in conglomeratis posset esse causa consumptionis, nihilominus tamen novimus nihil retundendis salium aculeis, atque fluidiori reddendæ fluidorum moli magis opportunum, nisi mercurium; perinde non modo non excitatur ab ipso tabes, sed etiam hæc abigitur; adeò ut nos oporteat vulgarem ratiocinandi

methodum deferere vel mercurium posse febrem hecticam inducere denegare. Ast cum hoc certum sit, moliamur fides hujus rationem reddere: ex dictis supra clarum est mirum in modum à mercurio omnium glandularum corporis ora dilatari, atque spirituum oborto ob immoderatam perspirationem dispendio utilem omnium fibrarum corporis relaxationem produci. Exinde major diametri vaporum capacitas sanguinis copia summopere diminuta, et vires multopere fractæ erunt; robur enim animalis est in ratione triplicata quantitatis sanguinis in ipso contenti. Si Lector animo, Cheyne ratiocinia de *hecticâ*, concipiat, intelliget & quoque modum quo mercurius illam inferat.



§. XXXV.

Hæc pauca exempla demonstrant plane quam ingens alteratio possit in animali oriri actione mineralium partium, cum hæ quomodo libet confertim, vel parçè penes diversam harum in aëre volitantium copiam, in massam sanguinis subreperint usque eout medicus nunquam melius tempus, & operam in ægri emolumentum impendit nisi cum aëris respirati genium sedulo perscrutatur, multorum enim malorum genitor est. Londini populus adstrictam alvum habet, asthmati, histericæ, & hypocondriacæ affectioni obnoxius est, quemadmodum & diversæ speciei febribus, simile quid observari *Scheffield* in prægrandi cultellorum officinâ, omnisque generis ferramentorum, ubi stupenda carbonis fossilis copia com-

buritur. Quæ aërem sulphureis particulis contaminando, horum morborum productioni viam sternit.

Atque hic quoque expandendæ essent variæ aeris constitutiones in pluribus anni tempestatibus ad Divi Senis exemplum, nec non illius cauti ac acris observatoris conterranei nostri Sydenhami. Nobis enim devinandi forent futuri morbi tali curâ ac studio, ut cæteri, his auditis, in admirationem raperentur, proindeque occasionem præbere possemus ut illa usurpentur, quæ propria magis morbis præcavendis, atque eatenus nobis metipsis in detegenda eorum natura opitularemur, quatenus exinde facilior succederet curatio.

Hippocrates docet (aphor. 1. §. 1.) varietatem tempestatum primam esse morborum originem quod non mirandum, cum videamus varios elasticitatis, ponderis,

156 TRACTATUS

caloris , frigoris , humiditatis gra-
 dus in aëre peraptos notatu dig-
 nis alterationibus in corpore giga-
 nendis , uti latè probavi. Jam
 plures Hippocratis aphorismos ex-
 planare decreveram , verum in-
 gentem cœli sub quo degebat ille
 à nostro discrepantiam meditatus,
 prospexi plures ex his observatio-
 nes futuras esse inutiles , quemad-
 modum re examinatâ comperi.
 Hinc fatiùs duxi cœli varietatum
 Londini observatarum à sagaciù
 nec non indefesso naturæ perscru-
 tatore Thoma Sydenhamo per
 spatium 14. annorum ab anno
 Domini 1661. ad annum 1675.



MECHANICUS. 157
COMPENDIOSA

Epidemicarum aëris Constitutionum Historia à D. Sydenhamo.

§. I.

T Radit laudatus Auctor ab anno 1661. ad annum 65. depuratorias & omnis generis intermittentes febres epidemicas fuisse.

§. II.

In depuratoriis præter communia symptomata aliis febribus, observavit quod viribus fracti ægrotantes multum animo liquerint, vomitu & nausæâ laborarint, linguam nigram siccamque habuerint, & subitam virium prostrationem: insuper externas partes arentes, urinam spissam vel limpidam egefferint quod

158 TRACTATUS

utrumque cruditatem prodit, in morbi declinatione alvi fluxus supervenerit (nisi in initio præcautum) qui morbum protraheret : verum quod sponte suâ ægritudo modico profluente sudore 14. vel 21. die terminaretur. Cætera autem symptomata præpositæ medicinæ legibus curationis fuisse effectus.

§. III.

Curationem incipit à phlebotomia in plethoricis, quam repetit vel omittit : cardiaca autem parcè vel liberaliùs concedit, ventrem ducit vel fluentem sistit, prout major vel minor sanguinis excandescencia indicaverit, venæ sectione celebratâ, si ægrotans vomitu vel inani vomendi conatu conflictetur, emeticum præscribit, & nocte opiatam, quibus diarrhææ obviam it; adeò ut

certum sit si alvi profluvium declinante morbo se manifestet, in initio vomitum vel ad hunc irritam propensionem, adfuisse, & neque ullum vomitionem ciens præsidium propinatum. Ipse autem laudatus Sydenhamus in quolibet morbi stadio materierum per superiora dejectionem vomitorio molitur, modo tamen præfens diarrhæa nec non nausea hoc præmonstraverint: in autumno sanguinis missiones, & refrigerantia non sunt adeò tuta: ast emeticum non omittendum; insuper laudabile in urina sedimentum, febrem ægrotantem reliquisse demonstrat. Quod vulgo evenit 14. die, si natura aliquâ methodo refrigerante non fuerit interturbata, si quidem tunc finis morbi erit 21. die: cathartica in usum vocanda, lectum non deferat æger, quandoque, præsertim

in præcipitatâ ætate , tussis affluenter ex imo pectore humidum ducente , febrem sequitur , quæ moderato generosi vini haustu profligatur : confectiones nunquam nisi in fine morbi adhibendæ , & post exhibita purgantia , quantum fieri potest.

§. IV.

Hic accuratissima traditur febris historia omnibus sibi peculiaribus comitata symptomatibus nec non curandi ratio longæ experimentorum seriei innixa ; & quantum accommodata sit rationi ac accurata , notum est ex his quæ dicta sunt supra de febribus & quod fusiùs illustrabitur infra : deliquium animi virium summa imbecillitas , linguæ ariditas & cutis jam explicata sunt. Jam verò illud demonstrandum est , quoties sanguis maximè agitatur (quod

auctor noster intelligit per cruditatem) urinam claram & tenuem vel crassam ac turbidam futuram : perspirans enim liquor exsiccatâ cute , intus retinetur cum sero unâque cum illis partibus quæ vacuari per hanc viam consuevere ; latex perindè serofus , adjuncto ei maximo æstu , renes stimulat , exinde urianifera vascula contrahuntur , ut nihil nisi tenuissimas sanguinis moleculas transmittant ac usque adeò citatus provolvi valet sanguis , ut nonnullas solidorum partes. In tam exiles tenuesve rumpat , dividat , ut cum sero abreptæ per lotii vasa transire valeant (tum maximè si horum fibræ quomodo libet minimâ ex parte debiles laxæque fuerint) quæ jam à sanguinis oceano sequestratæ ita obstruere , vel intercipere radios luminis recta permeantes urinam

ut hæc, *crassa ac turbida* videatur : ac præterea urina minus fluxilis erit ratione hujus mixtionis ; simul & visciditatis liquidorum quæ debetur quantitati & figuræ solidorum corporum ei innatantium , ac diversis attractionis , quâ se mutuo hæc corpora trahunt , gradibus.

§. V.

Què fit autem ut nunquam non , deflectente morbo , alvi profluvium subsequatur , ubi emeticum in initio mali neglectum fuerit , & qui vomitus diarrhææ occurrat ? ratio hæc est , ut acris materia in ventriculo per certum tempus stabulans nauseam & ipsum vomitum excitat toto eo tempore quo remanet , sic ubi in intestina protrusa uti non rarò deturbatur , vim suam in illa exeret , ac al-

vum movet. Verum si è con-
 verso hunc peccantem humorem
 per superiora ejici contigerit, to-
 no stomachi denuò redintegrato,
 illius materiæ præcavebitur gene-
 sis, ut pote quod ventriculus mu-
 nus suum probè obeat: sunt &
 plura alia quæ, vomitu excitato,
 ægrotanti redundant bona uti vi-
 dere est apud D. Cheyne (nevv.
 Theori. of. fevers pag. 71.) hoc
 non obstante non semel contigit
 mihi observare ægrotum exhibi-
 to emetico in pejus ruere. Vo-
 mitus enim non semper vomitu
 curatur, verum aliquando humec-
 tantibus. Sæpe illis quæ nimis tensus
 atque laceffitas ventriculi fibras e-
 mollire ac relaxare valeant. Porro
 ex aëris constitutionibus quasdam
 videre est periculiplenas ut præ-
 dictam præternaturalem liquido-
 rum excandescientiam sine magno
 vitæ discrimine inferre nequeant.

quod perinde adegit me ad experiundam aliam medendi viam, quæ his incommodis minus obnoxia esset, quæ tandem animo occurrit. Etenim idoneo ac prudenti mitium frigidorumque catharticum usu, quorum aliqua febrientum stomacho apprimè congruunt, illud omne fit, quod à ratione sperare possemus (si effectus violentæ contractionis musculorum abdominalium, & diaphragmatis excipias) & facilius & tutius ; vomitorii necessitas autumnali tempore major habetur quàm primo vere juxta Sydenham, animadversionem, autumnus enim tempore humores nostri viscidiores sunt, & tubuli per quos feruntur laxi, remittentes. Duplici hoc titulo vomitus magis proprius censetur, & ob hanc rationem venæ sectio, & victus fri-

gida ratio tam periculosa est in hac anni tempestate.

Ut ut brevi & concisa oratione hoc argumentum evolverim tamen propositum mihi limitem excedisse videor, quare cætera quæ dicenda habeo per paucis verbis amplecti consultum visum est.

§. VI.

Febres intermittentes in prædicta aëris affectione grassantes dividit ille in vernaes, & autumnales quarum primæ mense Februario, posteriores verò Augusto adoriri solent. Vernaes quotidianæ vel tertianæ sunt, brevi sua percurrunt tempora, nec periculosa, si illas verò excipias, quæ præposterâ sanguinis missione vel catharsis protractæ fuerint.

Autumnales vel tertio quoque die vel quarto invadunt. Primæ non multum periculi intentant at-

166 TRACTATUS

que solstitio hyberno adventante solvuntur. Cæteræ magis metuedæ non rarò scorbutum , tonsillarū phlogosim , ventris constrictionem , atque hydropem inferentes. Qui juvenili sunt ætate interdum illis mense Decembri liberantur. Ast sæpius ad Martium usque conflictantur nec non approximè autumnum si hos venæ sectio , & alvum ducentia debilitaverint , in majori versantur discrimine ætate provecti.

Si secunda vice quartanam jam perpeffi eâdem tententur , non nisi post duos vel tres citcuitus liberantur.

Vernales naturæ viribus committendæ , nunquam enim intermittunt. Laudat Auctor noster emetica ante morbi insultum vel paroxysmum & sudorifica eodem terminato. Autumnales magis difficulter curantur. Si constitutio aëris

publicè grassata fuerit , adultos
 mense Junii præhendet. Secùs in
 Augusto & circà Septembris ini-
 tium primisque diebus potiùs re-
 mittere quam intermittere dicun-
 tur.

§. VII.

Maximam affinitatem has inter
 & febres depuratorias intercedere
 autumat Auctor , animadvertit
 enim hujusmodi sanguinis depura-
 tionem plerumque tercentum-tri-
 ginta sex horarum spatio absolvi.
 Atqui si tempus quod impendit fe-
 brilis quilibet paroxysmus pona-
 mus esse 5. horarum & $\frac{1}{2}$ tunc totidẽ
 paroxysmi quorum singuli 5. ho-
 ras & $\frac{1}{2}$ percurrunt , quot efficiunt
 336. horas , febrem terminabunt,
 si viribus naturæ relinquatur quod
 & observatis quadrat. Hinc est
 quod tertianæ febres ad multo plu-
 res dies perducantur quam quoti-

dianæ, quartanæ quàm tertianæ, cum maxime in percurrento 336. horarum circuitu durent.

§. VIII.

Non est quod hîc amplius de ratione his febribus intermittentibus medendi edisseram, cum neminem lateat Corticem Peruvianum ritè administratum specificum esse ad quassibet intermittantium species debellandas. Dixi *ritè administratum* dum eundem pluries ab imperito præscriptum, infructuosum & inertem observaverim ac præprimis artifex quidam degens in *scheffield* qui cum Quartanâ per annum integrum laborasset, tam grandi macie exaruerat ut scheleton ad vivum exhiberet. Hic igitur se in *essex* contulit, ubi in consilium advocatus inter sciscitandum, illum ingentem remediorum suppellectilem

lem ac kinæ-kinæ libram semissem
 sine ullo prospero successu inges-
 sisse intellexi, cumque ventriculum
 viribus omninò fractum & homi-
 nem constanter imbecillem ac ge-
 lidum animadverterem, ipse pro-
 pinaretur vomitorium suasi, atque
 duabus dumtaxat unciiis corticis
 præscriptis. Cum notabili radicum
 serpentar. Et virginianæ quantitate
 quâ nedum ejus cardiaca vis cale-
 faciens sed & cæteræ virtutes aug-
 tum sumpserant, sanitati eundem
 restitui.

§. IX.

Proxima constitutio ann. 65.
 incepit: etenim postquam venti
 maximè frigidi multum sævierint,
 siccoque gelu cooperta tellus, ver-
 no usque ad præcipitantem mar-
 tium quo tempore revera subita
 reformatio accidit, eodem anno
 65. magnam partem lateris inflam-

170 TRACTATUS

matione, anginâ, peripneumoniâ, aliisque similibus affectibus è medio sublati sunt : ex quo tempore continuè grassans inchoavit febris : *depuratoria* deterior, ubi cephalalgia ac vomitus multo magis urgerent, alvi profluvium intenderetur, nec tantillum vomitu remitteretur qui semper exasperabatur. Externæ partes aridæ deprehendebatur ; sed misso sanguine, sudor per cutis spiracula quocumque morbi stadio cum boniss ægri rebus, urgebatur ; nulla autem ægrotis redundabant exinde commoda, *in depuratoriâ* & si possent, non tamen sine periculo ad diem 14. extendebatur sanguis in hâc febre quidquam pleuritici seu glutinosi habebat.

§. X.

Ubicumque sanguis fluxilior,

& ad motum aptior, ac spiritu turgens evaserit ob præcedentes gelidos, siccosque ventos, ac fibræ corporis relaxatæ, porique festinâ glaciei liquatione obstructi fuerint, profecto regia morbis suprâ memoratis patet via. Hujus asserti veritas ex passim in hoc opere enuntiatis colligi poterit, ne eadem repetendo Lectori benevolo tædium moveam. Vomitus non ciendus in hac febris specie eadem ob rationem quâ ipsum repudiandum, censui in *depuratoria* cum enim inflammatio major sit præpetique sanguis prætereat fluxu: ea est villorum tensio ut ne vel minimam planè proritationem ferre valeant, his omnibus phlebotomia sæpiùs repetita, imbecillia sudorifera usui habentur. Verùm eâdem ratione clarescit multo præstantius esse sudorem ope liquidorum actu calidorum,

172 TRACTATUS

accedente stragulorum pondere
elicere quam alexipharmacis vul-
go in usum advocatis.

§. XI.

Transactâ præfatâ epidemicâ
constitutione, ingressa est pestis,,
quæ vires sumebat usque ad au-
tumnale equinoctium anni 66..
quæ interea temporis per hebdo-
madam 8000. sustulit. Hinc de-
crescebat eò usque donec hiemale
frigus illam ferè abigerit; verno
tempore ex toto desiit: pristina
tamen febris remansit (licet nomi-
ta populariter debaccata) usque
ad anni 67. initium.

§. XII.

Per id temporis 3^a. constitu-
tio cum variolis inchoavit, inva-
lescens usque ad autumnum quo

tempore erant epidemicæ & ab eo tempore remittebant usque ad proximum Ver, videlicet 68. anni, quo tempore cæperunt sævire ac perrexerunt tandiu donec gelida subsequēntis brumæ tempestas easdem infirmaverit. Tunc verno anni 69. denuò in scenam prodire, quamvis non ita publicè popularentur sicut antea, nec remittebant quo usque mensis augustus appropinquavit: quo tempore dysentericæ epidemicæ locum cessere.

§. XIII.

Febris quam Auctor noster *variolosam* appellat, exersa est cum variolæ quoque oriebantur videlicet anno 67. & affligere desiit. unà cum prædictis variolis anno 69. omnia variolarum symptomata exceptis iis quæ pustularum eruptionem ac maturitatem con-

comitantur , sibi habuit adjuncta . His autem notis se manifestabat dolore in scrobiculo cordis , universi corporis aestu , unà cum pureis maculis , siti non multâ , linguâ & urinâ naturaliter se in initio habentibus nisi quod lingua interdum alba , rarenter sicca , nunquam nigra esset , à victûs ratione calidâ phrenitis emergebatur ac maculæ augebantur . In hujus affectûs incunabulis symptomatici dolores ægrum vexabant . Præpostera medentium praxi procrastinabatûr febris ad 5. vel 6. hebdomadas : modo fatum tali methodo non præveniret . Criticæ facilitationes circa morbi declinationem solvebant morbum , si non remedia frigida usurpata , violenter excussi sudores alvumque moventia illas præverterent .

§. XIV.

Ubi vires permittunt curatio-
nem à venæ sectione orditur quam
alternis diebus iterandam suadet ,
atque in diebus à sanguinis mis-
sione vacuis aquam in alvum dat
& julapia refrigerantia cum sero
lactis vel hordei aquæ *ad libitum*
nec manans è corpore sudor offi-
cit quòminus detentus è lecto
quotidiè surgat , diarrhæa , quæ
est effectus morbi , tutius curatur
si vena secetur , ac ardorem tempe-
rantia præscribantur ; postea verò
quam ptyalismus incepit , omnis
egestio mala.

§. XV.

Ventris citata solutio seu diar-
rhæa quæ nihil nisi variolosa fe-
bris , ad fistulam intestinalem con-

176 T R A C T A T U S

verſa , maximamque cum eâ affinitatem habere crederetur , ſæviit per totam anni 69. æſtatem catharticiſ & adſtringentibus exaſperabatur ac deterior fiebat, nulla alia quam quâ febres videlicet venæ ſectiõne , ac refrigerantibus ratione domatâ : illud hîc tantummodò animadvertam , cum quopiam cujuſcumque univerſaliſ aëriſ temperiei affectu maximam morborum partem affinitate quâdam fuiſſe devinctam , quod id indicii ſuggerere videtur , quo nos dirigamus in afferendis medicis ſubſidiis majori longè certitudine ac feliciori eventu quam quod aliorum expectari poſſet.

§. XVI.

Ventriſ hæc dejectio quæ ſe primo , ineunte hæc quartâ coeli diſcrasiâ , conſpiciendam præbuit ,

pedisse quam habuit suprà memoratum dysentericum fluxum ac in Augusti exordio ann. 69. Cholera-morbus ita populariter debaccatus ut unus ex Auctoris memoriâ omnium epidemicorum morborum facilè Princeps haberetur qui tamen eodem planè modo ac in cæteris annis perstitit usquè ad principium Septembris, quo tempore publicè grassaretur, quamvis ab evidenti causâ in quocumque anni tempore producat.

§. XVII.

Extremo autumno tormina ventris nullâ subsequente dejectione ceperunt at brumali tempore desistere : nihilominus dysentericus fluor qui unâ cum prædictis torsionibus fuerat ortus pergebat epidemicè & quidem multum grassari. Ast cælo maximè frigido evasit.

§. XVIII.

Anomalarum variolarum incubula visa sunt mense Januario ann. 16 $\frac{69}{70}$ eodem modo quo dysentericæ febres ante augustum,, quæ per totam dysentericam aëris constitutionem mortales vexabant,, quæ anno deinde 12. cessavit.

§. XIX.

Anomalæ variolæ quæ mense Januario primum erupere perrexerunt usque ad præcipitatam indolem aëris dysentericam anni 72. pro his variolis nunquam non in Autumno succedebant dysentericæ, quæ illis quoque Januario locum cederent usque ad Autumni finem, in quo ambo hi affectus simul sæviebant. Præter communia cæteris variolis symptomata sequenti mo-

do discriminantur. *In discretis*, ut aiunt ubi optimè distinctæ sunt apparent 8⁹. die *in regularibus* ad 4.^{am} usque extenduntur minori copiâ ac magis rubræ procedente morbo in *regularibus* quam in *dispersis*. Ad maturitatem perductæ nigræ sunt magis quam in discretis; interdum quamvis non ita sæpè, si pustularum numerus exiguus est, salivalis humoris profusionem proritant.

In confluentibus in hoc differunt pustulæ scilicet interdum altero. Quandoque tertio die se manifestant. Tumori uniformi rubro totum aspectum tegente duriori igne sacro sine ullâ sensibili distantia exantematum non absimiles, reliquum corporis ingenti horum tuberculorum quantitate inter se junctorum, purpureique coloris cooperiebatur. Ac interdum (quamvis rarò) sequens lethiferum phæ-

nomenon aderat, nimirum parvæ inter femoris pusulas oriebantur vesiculæ limpidæ turgidæ latice, quem foras, ruptæ eructarent ac musculosa caro his substrata adeo nigra ac si sphacelo tacta existeret deprehendebatur. Circa 11.^m diem alba pellicula diversis in faciei locis superstrata se conspiciendam obtulit, tumori antea descripto. Hæc autem exigua pellis transacto brevi temporis intervallo crustaceam hancque splendentem profundebat materiem profundè rubentem, concreto sanguini similem, quæ maturescens nigredine magis inficiebatur, donec facies nigrore carbonem exhiberet 14.^{us} & aliquando 17.^{us} dies criticè morbum expediebat in illis quos victus calidior non citius è medio sustulerit.

In prædictis variolis omnia symptomata graviora sunt, phlogosis

gosis major, pustulæ paucæ, magisque sævientes, vix ab erysipelate distinguendæ, vel rubeolis, nisi tempore, quo illæ erumpunt, ubi pustulæ decidunt furfuris ad instar quid per majus temporis spatium durans post se relinquunt necnon cicatricem pessimè indolis.

§. XX.

Horum medela in eo consistit ut præter hypnotica administranda quando vel ficcitas vel pervigilium vel delirium indicant (quæ remedia adultis tantum in discretis variolis concedenda) magis refrigerans methodus in usum advocetur quæ sit accommodata inflammationi, quæ ubi major est, demonstrat copiosum decocti albi valdè tenuis vel lactis cum aquâ potum esse præscribendum quæambo salivam cient. Et quamvis

Q

catamenia fluant non idcirco desistendum erit ab hac medendiratione.

§. XXI.

Dysenterica febris orta est in Autumno 69. continuavitque unâ cum aëris eâdem constitutione nempe dysentericâ : febrilis hæc affectio eos, qui dysentericâ liberii erant, aggressa est, nisi quod interdum minus acerbis doloribus conflictarentur, sive deiceret, sive consisteret alvus. Omnia dysentericæ symptomata, si egestionem excipias, quæque hanc consequuntur, aderant; in initio hujus aëris intemperiei nonnulli lenes dolores qui postea vix, persentiebantur perpaucus sudor effluebat vel nullus omninò, verum in hac, cephalalgia acrius urgebat quàm in febre variolosâ, ut ut lingua, quem ad

modum in variolosis, alba fuerit, humidaque, non aberat tamen lactei coloris cuticula linguam operiens. Hæc febris rarò salivæ effluxu terminabatur, ut cæteræ, ipsâ declinante, detenti magis quam in cæteris febribus, aphtis vexabantur præsertim ubi victûs fervens præcesserit ratio: si sudor pharmacis in febris exordio violenter proritatus ac ita dixerim, extortus, coma advocabat.

§. XXII.

His autem morbis occurritur alvum moventium nec non sanguinis missionis ope alternis diebus celebrandorum ad longum tempus, rejectis opiatis; hisce peractis, tenuis diæta præscribitur purgato iterùm ægroto concedi poterit pulli gallinacei elus, atque transactis tribus ab ultimâ

purgatione diebus, modò virium lapsus nimius fuerit, uti vulgo omnibus histericis evenit, lenis tunc confectio sive opiata vires supplebit, sed ante illud tempus nocet.

§. XXIII.

Regulare s rubeolæ occæperunt ireunte Januario 167 $\frac{1}{2}$ increscentes usque ad 10.^{um} Martii ex quo tempore decrescientes Julio disparuerunt. Variolæ debellatæ sunt Augusto 71. & dysenteria revertit sævior quam hætenùs : verùm hiemali tempore in locum ejus suffecta est dysenterica febris & variolæ, quæ per totam brumam debaccatæ sunt (Februarius enim considerandus tanquam æra pro febribus vernalibus, quemadmodum Julius pro Autumnalibus) secundi mensis initio tertiana aggressa est mortales etsi non ità epi-

demicè ut cæteræ febres debellatæ , evanuitque circà æstivum solstitium , aliarum febrium tertianarum vernalium more , quæ communiter circà illud tempus abeunt. Julio 72. denuò suscitata dysenterica febris ut ut mitior præcipitante autumnno apparuerit , quo tempore fluxus dysentericus repetiit , locum denuo dans in hieme dysentericæ febris atque variolis : quoties autem dixi quampiam affectionem locum alteri cedere , ità hoc accipi velim , ut prædicti affectus nequaquam omnem epidemicam sævitiam retineant : quilibet enim affectus aliquos per totum constitutionis tempus invadit.

§. XXIV.

In hâc aëris indole dysentericæ febris initium dedit , Julius mensis. Dysenteria in Autumno incipit , variolæ Januario , atque prædicta febris curatâ persistebant ad-

huc variolæ usque ad Julium quo tempore ipsamet febris recidivavit.

§. XXV.

5a. Constitutio initium coepit ineunte Julio 73. quæ primùm febris magis æstuantis ac inflammatorix (veluti magna epidemico- rum pars facit) quampostea dedit signa quippè incipiente hâc epidemica constitutione perindè ac vere subsequenti variolarum ad- rant , & pleuritidis indicia , tenax ac viscidus deprehendebatur san- guis vel 2°. vice eductus.

Præter symptomata omnibus febribus communia , hæc potissimum in hâc deprehendebantur videlicet violentus capitis ac dorsi dolor , stupor ac obtusus dolor articulorum , tensivus lumborum ac per totum corpus latè se diffundens , ast rheumatico lenior. Primis diebus calor & frigus alternatim se excipiebant interdum ini-

tio morbi parvus sudor, quando febris sibi ipsi relicta, lingua humida & albicans, vixque ulla sitis, lotium ferè naturale: ast nimis calefacientium usum sequebantur, linguæ siccitas quæ coloris erat inter flavum & fuscum ambigentis, inexplibilis sitis, urina rubra, ritè tractatus morbus terminabatur 14. die aliter ad 21.^m extendebatur, interdum ægrotantem *coma* detinuit per duas vel tres hebdomadas ac tunc non convaleuit usque ad 30. dies; primum hujus indicium erat desiderium cuiuspiam absurdi & inusitati pabuli quod concedi potuisset, licet parcè: aliquando caput hùc & illùc nutabat ob virium debilitatem; lypothimiæ, sudoris profluvia, feбри succedentia, haustu generosi vini curabantur. Dysenteria, ac diarrhæa in Autumno 75. anni successit, quæ nihil aliud erat

quàm febris per metastasim ac
tubi intestinalis cola converfa.

§. XXVI.

Præcipuum in hujus curatione
est. Venam tundere dein vesicanti-
tia admoveere ac aquam singulis
diebus in alvum injicere, victus
rationem antiphlogisticam præscri-
bere. Post 14.^m diem committat-
ur naturæ, bibat parvam cerevi-
siam ad libitum, cui, si phrenitia
de laboraverit, guttæ aliquot spi-
ritus vitrioli adjiciendæ.

§. XXVII.

Febris mox descripta nec maxi-
moperè grassata usque ad Julium,
neque aderat febris superiùs relata
nec variolæ in 70. ann. aggressæ,
penitus expulsæ erant 73. tametsi
symptomata variolarum longe mi-

tiora fuerint. Non aberant tamen videlicet anno 73. paucae dysenteriae variolae comitem habebant febrem ultimo loco exaratam, quæque per hibernum tempus permanserunt, etsi non tam populariter furentes: post siccum gelum cum in festo nativitatis Domini insanè æstualet tempestas, nonnullæ adnotabantur dysenteriae, quæ per id temporis omninò cessarunt.

§. XXVIII.

In Januario 167 $\frac{1}{4}$. anomalæ rubolæ inceperunt incrementum sumentes ad Martium usque, ac Junio disparuerunt; populares nimis erant. Morbillofa febris idem initium, eandemque habuit periodum. Interea temporis ortæ variolæ nigræ populabant plus vel minus usque ad Junium circiter.

Anomali morbilli, ut oppido

epidemicè depredabantur ita & thales erant si perperam tractata eruptio aliquando citiùs interdum tardiùs, quartâ die. peragebatur pustulæ hîc humeros & corporis truncum occupabant in *regularibus* faciem ad hæc squamæ furaceæ, declinante morbo cutee in illis, rarò autem in his deturpant, febrilis æstus ac dyspnea sine morbi affligebat ac peripneumoniam in his magis quam in aliis æmulabantur.

§. XXIX.

Quod curationem attinet, crucibili acquiescebat triduum æger antè pustularum manifestationem usitatis suis stragulis coopertus. Præscribebantur avena vel hordeum ad crepaturam usque in potionibus medicis, poma assata, parva cerevisia, lac, & aqua, & pti-

§. XXX.

Febris morbillosa in eo à morbillis discriminatur , quod morbillosæ pufulæ paucæ sint ac crepaturam subeant in nasi dorso humeris nec non nonnullæ in corporis trunco : febris ejusdem naturæ est ac morbilli , at magis sæviens & interdum ad 14.^m diem vel ultrà perducitur. Sanguinis detractio ac clysteres nocumentum afferunt. Iisdem quibus morbilli eamdem aëris intemperiem præ se ferentes , præfidiis fugatur.

§. XXXI.

Variolæ atræ enatæ Januario 167. confluentes fuscum colorem tam diù retinebant quamdiù im-

maturæ ut itâ dixerim & crudæ erant. Ast ubi maturatio ac coctio se prodierint nigræ fiebant : non nisi in paucis ab anomalis differunt in 69. Sunt enim magis putridæ anomalis atque pessimam exhalant mephitim : apertis sequacior materia effluit magisque difficulter digeritur. Hoc tamen animadvertendum est, quò mitiores essent variolæ eò citiùs pusulæ ad suppurationem venirent. In regularibus enim confluentibus ægrotans 12^o die in portu navigabat. In anomalis verò confluentibus in 70. ann. periculum extendebatur ad 15. vel 16. diem. Verùm in his haud rarenter post 20.^{um} diem moriebantur, & interdum si morbo convalescerent (quod rarò contingebat) non tibiæ modo (uti universim in omnibus confluentibus usu venit) in tumorem attollebantur verum & brachia & hu-

meri

meri & femora & aliæ partes cum intolerabili dolore rheumatico dolore, abeunte interdum, in musculofarum partium phlegmonem, quò languentis vita, vel discussis jam variolis in discrimine versaretur, iidem autem varuli æqualem nempè lethalem non secùs ac ipsamet pestis intentabant perniciem.

§. XXXII.

Quantum ad therapeiam attinet: fervido victûs genere recrudescerebat febris ac oriebatur punctorius lateris dolor nec non purpureæ maculæ. Frigido autem ultra modum impediabantur faciei ac manuum tuberculorum generis atque efflorationum pustulofarum turgescencia quæ duo necessaria sunt. Plerique eorum qui præcedenti ratione tractati fuerant oc-

194 TRACTATUS

cubuerunt ; secùs autem qui sequenti videlicet post 5. vel 6. diebus affatim cerevisiam potabant , ad juncto , declinante morbo , spiritu vitrioli , & præsertim per hoc temporis quo rubentes pustulae puris formationem molirentur , febrisque ad summum eveheretur . Adultis eruptione ex anthematum peracta qualibet nocte laudanum exhibebatur , vini haustus exeuntes morbo , si ægri deliquium id est flagitaret , propinabatur exhibebatur .

§. XXXIII.

Elapsâ anni tempestate valde calidâ quæ ad finem usquè Octobris 75. anno perrexerat euestigio frigidum humidumque subsequutum est cœlum quod viam summè grassantibus tussibus stravit quos tamen semper in febres ter-

minatas observavit Auctor clarissimus non dissimiles illis febribus quæ anno 73. regnarent, quæque lateralem dolorem non secùs ac pulmonis inflammationem falsò repræsentabant, adjungebatur autem encephali, dorso, ac lumborum dolor, nec venæ sectioni, ut fieri assolet in pleuritide, cedebat.

§. XXXIV.

Curatio cum non nisi tussis vexaret instituta refrigerans dieta sine piscibus ac carne, atquè copiosus potus sufficiebant: cum verò febris exorta sanguinem detrahebat, atque emplastrum vesicatorium nuchæ applicabatur: quotidie cylsterem injici Auctor erat atque aërem purum frigidiusculum concedebat, sive ne multum in Conclavi conclusus moraretur æ-

ger suadebat : venam autem de
 nuo 3°. die exolvi jubebat acusum
 clysterum continuari si pertinax ad
 huc partibus inhæreret dolor
 cavens tamen ne hæc histericis ac
 hypocondriacis fierent , iterumque
 venam incidebat , si exæstuans id
 requireret calor.

§. XXXV.

Nequaquam profecto eo collig
 mavi ut morborum epidemicorum
 historiam à tanto viro conscriptam
 contraherem & in compendium
 redigerem , nisi illa omnium quæ
 existunt exactissima & omnibus
 numeris absoluta , abque viro in
 temeratae integritatis contexta esset,
 nique majorem ejus utilitatem ex
 subsequenter corollariis osten
 dere vellem , nequaquam enim
 morborum narrationem legisse
 sufficit ut ut summè veracem atque

criticam, cum vel decimam enarrati hujus argumenti partem quamvis in pauca contracti, faciliè memoriæ mandare quis non possit: ast & perpendendæ nobis sunt singulæ historiæ morborum partes sicque unam cum aliâ conferre ut conclusiones ex his eliciamus quæ cum numero paucæ earumdem semper memores erimus. Itaque perutiles medicinam exercentibus fient. Ac si quisquis idoneus ac intelligens quid ex suo penu depromere vellet, quod in rem publicam recte conduceret, brevi præcepta suppeditarentur quæ nos ad saniolem praxim dirigerent, feliciorem magisque fortunatum exitum quam quæ ex cognitis sperari queat.



TRACTATUS
COROLLARIA*ex præcedenti historiâ.*

I.

Infertur diversas aëris constitutiones diversorum morborum ortum dare eosque esse vel stationales, vel regulares, uti evincitur ex historia generali.

II.

Cujuslibet epidemiæ morbosos affectus cum aliqualem inter se mutuò affinitatem habeant, ut ut alias in multis à se invicem discrepent, aliquid communis in suâ curatione exigere ut potè à causâ communi procedentes. Quisquis ergo faviente quapiam aëris temperie morbosa abigendo morbo publicè grassanti opportunus est, ille totam quoque aëris constitutionem curare poterit quem admodum clarum est ex §. 7. 13.

15. item 18. 21. & 30.

III.

Per intervalla recurrentes febres, usque continuas affines diutiùs protrahi frigida victûs ratione. Hoc manifestum est ex §. 3. & 6. confer. cum §. 7.

IV.

Rationem operandi specifico-
rum in sanandis morbis perspec-
tam habere non utile modo ad rec-
tam eorundem administrationem
esse, sed ut exindè intelligamus
quo pacto auxiliis vis intendi va-
leat.

V.

Frigido gelidoque aëre non
rarò terminari morbos epidemicos
ut pestem, variolas, dysenterias.
Hoc colligitur ex §. 11. 12. 17.

VI.

Calefacientium cibariorum

uſum pernicioſum eſſe cenſendum
in variolis , febris dyſentericis
& in quamplurimis quæ indefinen-
ter affligunt , & huic regimini ut
itâ dicam calido debentur pejora
quæ ingruunt ſymptomata. Vide §.
13. 19. 21. 25. & 32.

VII.

Conſenſum adeſſe inter cutem &
inteftina , juxtâ Baglivii obſerva-
tionem ex §. 19. 23. & 24.

VIII.

Affatim epota frigida opportu-
na eſſe rubentibus puſulis & inflam-
matoriis febris §. 20. 26. & 32.

IX.

Variolas & morbillos in univer-
ſum menſe Januario inguere §. 18.
19. 23. 28. & 31.

X.

Frigidum nec non humidum

coelum ad epidemicas tusses iter
pandere vide §. 33.

XI.

Hypocondriacos & histericas
aliter quam alios in febribus trac-
tandos esse non enim tam largas
ferunt evacuationes , ut constet
ex §. 34.

CAPUT VII.

De Balneis.

§. I.

Is quæ ad aërem pertinent
notatis, aliquas circa naturam, &
usum balneorum per quæ magis
apti interdum aliquando minus
aëris injuriis ferendis reddimur
juxta calorem , temperamentum ,
ac frigus ipsius balnei , apponere
visum est , quibus omnibus aliqua
observata atque ex his corollaria

202 TRACTATUS
circa pannorum laneorum leviden-
fium gestationem subnectam.

§. I I.

Etſi balnea oppidò neglecta
ſuperiore atque qui ſe proximè
convoluit , ſæculo , fuerint , ta-
men antiqui ſunt uſûs , his etenim
& Romani & Judei utebantur ,
non unicè ad quamplures ſanan-
dos affectus , ſed ad munditiem
& oblectamentum , paucis tamen
ab hinc annis eò uſquè balneo-
rum præſertim frigidorum con-
ſuetudo viget , tanquam inſperato
in ſanandis multis langoribus ,
eventu ut dubitandi non rema-
neat locus , quin brevi balneatio
æquè latè ac apud veteres in uſum
noſtrum ſe diffuderit.

§. III.

Sanctorius tradit lotionem cum

frigida perspirationem impedire (aphor. 67. §. 7.) quâque promotâ per balnea scilicet calida , alvum antea fluentem coercitam fuisse (aphor. 92. §. 1.) hypochondriaco affectu detentos recreari , si frequenti balneorum usu corpora perspirabilia fiant (aphor. 102. §. 1.) nec non aqua frigida ablutos , si robusti , calefieri , si debiles refrigerari (idem aphor. 1. §. 2.) et aquæ balnearis calidæ usum , modo cruditates non obstant , materiæ perspirantis exitum juvare ac interaneorum fervorem lenire.

Balneorum usus tentatus cum successu fuit in scabie , leprâ , elephantiasi & quamplurimis aliis de fædationibus cutis , in diversis doloribus , rheumatismo chronico , arthritide , ischiade , claudicatione , sive major contractio sive relaxatio tendinum illam produxerit.

Probè memini nobilis matronæ

Domini Mongath quæ balneorum usu tumore ædematoso quem inter tale gerebat, quique nulli methodo hætenùs adhibitæ cesserat, uti emplastris, fomentis, discutientibus cum Sale Amoniacò in iisdem dissoluto, tincturis Myrrhae, & Camphoræ, Oleo Tartari per deliquium tibialibus strictiss &c. optimè curata: unicâ vice in die se totam undis balnearibus immergebat eo fine ut & generalis omnibus vasis contractio attentio accederet, utque dissolveretur humorum massa tum eorundem in orbem motus urgeretur. Ast non semel in die affectam tibiam proluebat, neque diu intra aquam immersam qualibet vice detinebat. Reformidabat enim gelidam aquam adeò ut fibrarum vibrationes vegetiores ac velotiores factæ haud rarenter unius diei spatium, materiem vasis impactam.

Hæretemque

Hærenemque discutiant, abigantque, vasaque ferendæ resistantiæ à præterlabentis fluidorum molis, vi resistente, oblata inidonea fiant. Mihi hoc persuasum habeo balnea frigida prudenter administrata multum posse ad reficiendos cachæcticos atque hydropicos modò morbus non multum inveteratus sit, nonnullaque discrimen minantia in atrophîâ symptomata si pulmones benè valent, hâc ratione medendi quàm quacumque alia remorari posse. Ast nequaquam id sine sagacis Medici consilio molendum, præsentanea sunt in rachilicis, hæmorrhagis sive nasium sive alvi, sive uteri quas non modo obturando frigore, ac obstipando sanant: verum & recidivam præcavent: nihil æquè tutò ac efficaciter calculos in nephritide educit quam aquæ calidæ balneum, & baglivius ait (de praxi medica p.

70,) *dolorem colicum ferè semper mitescere in semicupio.*

Balnea semper gerunt diureticorum vicem. Atque cæteris omnibus auxiliis præstat sola capitis immersio intrâ frigidam præsertim marinam in curatione melancholiæ, atque rabie tum præprijis quæ à morfu canis rabidi oritur. Omnibusque Medicis subsidiis quæ in propulsandâ frigiditate ab effrænata venere oriundâ adhibentur palmam præripit lavacrum frigidum. Utiliter quoque datur in simplici gonorrhœâ, & fluore albo, sæpiùs in resolutione nervorum, quique eo assueti sunt parùm vel minimùm ab alteratione aëris noxæ patiuntur, nihilò seciùs balneorum abusus detrimentum corporibus affert, etenim balneatoribus in universum pallida cadaverosaque facies est, maculis corpus refertum, tibiæ ulceratæ atque tu-

midæ , quæ omnia sæpè in hydro-
pem degenerant.

§. IV.

Etſi corporis balneârit ablu-
tio in omnibus prædictis caſibus
valdè compendioſa ſit , verùm ta-
men nullus eſt in quo aliquandò
noxia eſſe non poſſit in variis cir-
cumſtantiis : adeò ut multum re-
dundaret ex lectitatione historia-
rum , queis conditores curationes
per balnea abſolutas memoriæ
prodiderunt , fructûs ; ſatiûs duxi
in alterationes quæ in corpore à
balneis producuntur , inquirere ,
ut cluceſcat in quibuſnam caſibus
hæc præſcribere oporteat & in
quibuſnam proſcribere.

§. V.

Obſervari jam cum mercurius

S ij

altiùs in barometro elevatur, corpus nostrum premi aëris super incumbentis pondere æquali libris 39900. jam verò pondere prædicto notabiliter adaucto, vel immunito, quemadmodum in diversis cælimutationibus, variisque planetarum defluviis evenit: profectò non modica varietas futura est in fluidis nostrum corpus alluentibus ut suprà confeci. Verum hæc pressio nullibi quam ubi corpus balnea subit, tantopere incrementum accipit. Aqua enim cum sit 800.^{tes} ponderosior aëre, oportet majori vi corpus premat, illudque infra 35.^{os} pedes aquæ detentum sustineat duplo majus pondus aëris, & licet, ubi ad superficiem aquæ super premam deventum est, de hac compressione multum detractum sit, nihilo seciùs major adhuc eadem est, quam quæ in aprico exercetur, ità ut omnia in balneis

ventura sint, quæ à majori in corpora pressione proveniunt.

Cum tenellæ fibræ quibus contextitur cutis inæqualem roboris ac tensionis gradum fortitæ sint ex his quædam aquæ gravanti, cæteris refragantur, hinc ejusdem tegumenti rugositas, dum quis se aquâ profundit.

§. VI.

Certum est corporis periferiam, quæque huic proximiores sunt partes primùm & maximè omnium comprimi, cæteras verò quæ centrum machinæ respiciunt minùs ac tardius: adigetur itaque sanguis in viscera ubi minor est resistentia: periculi hinc plenum est balneum, si ii, qui hoc usuri sunt, debilia & ulcerata intestina habuerint, quibus imbecillus arteriæ pulsus contigit: secùs autem evenit si balneum frigidum adeant. Hoc enim ingredi

poterunt sine ullo vitæ discrimine
 nulloque deliquio, quâ ratione
 aphor. 4. §. 3. explicatur. Ubi di-
 citur *balnea calefacere robusta cor-
 pora & refrigerare debilia*. Con-
 enim in vegetis vegetiùs pulsata.
 Conflictum igitur majorem cum
 mole à sanguine premovendo ob-
 jecta, exercet in iis qui frigido la-
 vacro utuntur, sanguisque magis
 in partes dividitur, ejus calor im-
 libertatem asseritur: econtrâ ubi
 corporum compages imbellis vel
 imbecilla est cordis contractio,,
 tota continuando circulationis san-
 guinis filo impenditur, qui ob-
 resistantiam oblatam lentiùs quàm
 antea progredietur. Hinc oritur
 frigoris sensus, seu quod eodem
 recidit ægroti refrigeratio.

§. VII.

Balneis frigentibus immerfi si

MECHANICUS. 211

caput nequaquam demersum extrà
 aquarum molem efferant , capitis
 dolore conflictabuntur. Hoc ex illo
 adstrui potest quod suprà animad-
 versum est. Nam cum naturâ encephali
 vascula , tenera , laxa , nullo-
 modò sanguinis per ipsa transitui
 resistantia fabre fecerit & cerebri
 moles dumtaxat ab aëre superin-
 cumbente gravetur ; sequitur illum
 pleno gurgite in cerebrum derivan-
 dum fore , ut ipsamet vascula ultrà
 consuetudinem ac tonum diducat ,
 indèque occasionem dolori præ-
 beat. Atque causa hilaritatis , agi-
 litatis ac roboris post exitum mox
 à balneo ex eo peti non debet.
 Sed ab ingenti exhalantis per-
 cutem materiæ copiâ ut sanctorius
 observat aphor. 17. §. 7. &
 aphor. 23. §. 7. dicens *me-
 lancholia duplici via superatur vel
 liberâ perspiratione vel aliquâ
 continuâ animi consolatione &*

alibi *siquis sine causâ sentiat se hilarem*, id magis apertâ perspiratione fit, & corpus ejus minoris ponderis die subsequenti invenitur. Verum etiam ex sensatione minoris ponderis corporis: Siquis subter aquam duorum pedum altitudine maneat (uti in balneo fieri consuevit) sustinebit tunc pondus aquæ illi aëris adjunctum (ponatur area cutis esse semper 15. pedibus quadratis æqualis) æquali libris 2280. nam 2. qui est numerus pedum cubicorum aquæ prementis pedem cutis corporis quadratum multiplicatus per 76. numerum librarum in pede cubico contentarum = 152. qui x 15. pedes quadratos ex quibus area corporis consurgit = 2280. libris medicis.

§. VIII.

Adeò ut præcipuus ac omnibus obvius balnei effectus est per ma-

jorem pressionem corporis vasa constringere : indèque humorum molem atterere, quo illi pervadendis colis ad evacuationem pares fiant. Non secùs ac quamlibet sequacem tunicis eorundem inhærentem elidere obturantem materiem motumque fluidis & expeditiorem & celeriores impertiri : accedit qui balnearibus aquis se perfundunt , iis sanguinis modum maximè adauctum esse in cerebro & visceribus , cum fluida eò ruant quò minorem inveniunt resisten-
tiam , quantitas autem secreti humoris est ut humoris copia in hujus celeritatem ducta , quam in diversis relativè colatoriis obtinet (exprop. 17. secret. animalis) spiritus igitur animales, lotium, bilis, succus pancreaticus uberiori rivuli seu copiosius secernentur , nec ullum forte impedimentum huic mechanismo objicietur filtrationi nem-

pè liquidorum , quæ adeò citato gressu ad organa secretoria appellant , hinc.

1^o. Si sanguinem dissolvere contendimus. 2^o. Si quodpiam vasorum obturamentum exprimere. 3^o. Glandulas detergere. 4^o. Majorem fluidi nervalis copiam producere, ejusdemque ingeminare per nervos cursum. 5^o. Si exsuperanti quantitate urinam per renes urgere. 6^o Si obstructions hepatis , lienis , pancreatis , mezentarii referare , modo diuturnitate non occaluerint (secùs periculosum est balneum) corporis balnearum profusionem in usum advocare debemus.

1^a. 2^a. & 3^a. ratione curamus , scabiem , lepram , elephantiasim. 4^a. Et antecedenti sanamus resolutos nervos , melancholiam , furorem , rabiemque caninam. 5^a. Adjuvamus fabulorum per renalem

compagem transitum , ob sextam rationem præcipimus & ob 5.^{am} cachæxiæ, ictero vel morbo regio , hydropâ detentis opitulamur si morbi prædicti non diutiùs inhæferint.

§. IX.

Descripta quæ majorem in corpus sequitur pressionem emolumenta , efficaciora multò futura sunt , si quod libet , pondus aquæ adaugens , adjungatur , vel fibras carneas contrahens ; sal aquæ marinæ pondus majus reddens efficit ut magis salutaris curando morsui canis rabidi fiat , & quo profundius submergitur languens , eò major curationis affulget spes ex mox dictis.

Demonstrant experimenta frigore villos corporis constringi , eoque potentiùs quò magis derepentè ingruit ; ast quantum obti-

nendo tali scopo contribuat, sciri nequit, cum nulla regula sit, quâ quantitas contractionis à frigore productæ mesurari possit. Ast quod notatu dignum sit, nemo est qui dubitet cum plura ad id probandum nobis pericula suppetant; fibrillarum contractionem per totum quâ latè patet corpus diffundit. Hinc fluida, majori impetu per tubos ferri debent, prætereâ tensio fibrarum cum sit major, hæc oscillabant & celerius & fortius (& hoc in proportionem ad tensionis augmentum) ut sanguis & spiritus non solum celerrimè per canales fluxuri sint, sed & summopere comminuendi atque atterendi vel attenuandi. Indè patet omnes illos effectus, qui ex majori sanguinis fluidique animalis ab ipso secedentis fluore derivantur, perniciosioresque eorumdem motu secuturos esse ex usu balnei frigidi, hæc quæ

dixi, si cum temperamento laborantis balnea ingressuri conferas intelliges & tempus quod impendi hîc debet ac numero finies, quoties balneis uti debeat (non neglectis intervallis interponendis) & necessarias ad balneationem præparaciones cognosces, & quæ postea facienda sunt. Ratione hujus virtutis vascula constringentis; inhibentur sanguinis fluxus, gonorrhæa, fluxio uteri alba, ac impotentiaë veneris succurritur.

Ubi peccans humor jam per auxilia, vel victûs rationem, vel aquæ calidæ, vel temperati balnei usum fluxilior evasit in diuturnis morbis, uti in rheumatismo, arthritide, ischiade, claudicatione, raud rarò perficitur curatio, solâ hâc vi frigoris contractivâ: *atrophia nervosa* quam Baglivius (de fibrâ motrice & morbosa p. 67.) oriundam autumat à nervorum qui in

cutem desinunt, atonia æque similiter balneo frigido cedit ac cuilibet alteri methodo, modo pori non è vestigio frigida qualitate convellantur : rueret enim tunc morbosa materies in aliquas glandulas evacuationem longè fortè periculosiorem excitatura.

§. X.

Hanc balnei proprietatem proximè alia sequitur à frigore ac pondere aquæ distincta & unicè in humiditate consistens : hac enim prædita balneareis aquæ sæpè relaxantur atque flexibilia reddit omnia corporis solida, ut luculenter evincitur cujuslibet animalis portionis in aquam immersione, vel ipsa enim cornua, unguesque remollescunt ac quoquoeversum se flecti patiuntur diutinâ in aquâ detentione potissimum si calida fuerit.

Atque aquam quatenùs humidam relaxandi vim habere, uti experimentis comprobatum est, nec à me dictis de illius pressione in genere de quâ vi contractivâ balnei frigidi seorsim, ullo modo refragatur: aquæ enim gravitas semper exercetur, etsi eodem tempore corpora ei immersa remollescant pondere enim aquæ vires supeditantur, quibus sese insinuet in corporum demersorum spiramenta, exindèque partes compaginantes emolliat, relaxetque. Ast antequam hoc præstet, urget extrosus latera vasis minùs reluctantis, ex quo genere sunt illa quæ humanæ machinæ textum ingrediuntur atque indè ibi contentâ velocitate ponderi incumbenti proportionatâ expellit; adeò ut postquam vitalia fluida ab undis balnearibus compressa in violentum motum fuerint concitata, si corpus longiorem ad-

huc moram in folio neſtat, habebit ſolida emollita, relaxata, & tunc non deſtituta hujus modi cognitionis magni facienda ut determinari queat tempus, quod in lavandis ægrotis teri debeat, in quibusdam languoribus magis quàm in aliis.

Nunc autem indagandum illud venit quo pacto nimirum frigus conſtringens virtus cum relaxante humide in eodem ſubjecto conſiſtere poſſint; ut pote quæ intenſe agere ſimul non valent, quin alterutrius deſtruatur effectus; clarum eſt eò conſideranti contrarias qualitates in eadem re eodem tempore intervallo inter ſe pugnare, aliter inuimus in ultimâ ſeção. Lemtum eſſe admodum humidi effectum nec niſi longum tempus ad munus ſuum obeundum requiri, conuerſo frigoris actionem celerem ac ſubitaneam uti multa experientia nos docent: exindè primum frigus

gidi effectum sit constrictio nihilo-
 feciùs nimis immorando retendit,
 verum nemo est qui frigus eo
 usque ferre potuit ut ultimum ex-
 inde promanantem effectum expe-
 riretur : cur autem corporis nostri
 membranæ frigoris accessu coarc-
 tentur ? Ab eo profluere videtur
 quod ingratum excitet sensum :
 taliter enim constructum ac fabre
 factum est hominis ædificium , ut
 ad nutum animæ , membranæ , va-
 saque corporis nunc de tono re-
 mittant , modo multum constrin-
 gantur , & hoc ut melius corpo-
 ris focia anima vitæ conservandæ
 invigilare queat & quamvis tene-
 bris ignorantia sepulta ratio ma-
 neat operationis animæ in corpus ,
 ridiculum profectò foret id recu-
 sare , quod quotidiana experientia
 ut verum demonstrat : in dies enim
 observare licet , voluntatis impe-
 rio membra subjecta multifaria m.

222 TRACTATUS

multisque modis agitari æquè facile est conceptu animam in nervos immediatè agere, & cætera solida, ac in fluidum nervale: cum illi æquè prompta sit actio in solidas ac fluentes corporis partes, modus hic operandi nos profectò latet, in statu relaxationis corpus debile est, imbecillum ac iners, talique se prodit in omnibus pathematibus quæ delectationem commitem habent, dum verò animi passionibus, dolor, mæstitia, vel aliquod aliud incommodum nervi livor, vindicta, timor, formido, vel terror quæ omnia corporis solida contracta tensa efficiunt utriusque manifestant venarum corrugatio, oculorum coruscationes, pupillæ contractio, facies pallida & præsertim labia: nec hoc minimum mediorum est quibus infinita adorandi conditoris sapientia utitur ad præservandòs mortales:

hac ratione editior est viribus homo ubi adversario quem vincere opinatur, resistit; vel aliter in fugiendo; tantusque in fugâ est terror, ut agilitas corporis in hisce circumstantiis exerta fidem planè superaret nisi vulgari observatione notum esset quam vegeti ac fortes sint in hoc rerum statu homines, hujus autem roboris modum excellentis, cum vasa corporis contracta sunt, evidenter deducitur ex propositione *Cheyne* de animali robore; nimirum quod animalis vires sint in triplicata proportionem quantitatis sanguinis pererrantis vasa. Atqui respectu ad vasa sanguifera servato, copiosior ac abundantior evadit, quoties vasa coarctata sunt, quàm ubi relaxata: perindè enim est sive manente eâdem vasculorum diametro, sanguis copiâ congeratur, sive nullomodo sanguinis quantitate alteratâ, tubi, per quos

fertur , folito patientiores evaferint
adeò ut idem virium gradus in ani-
mali exerendus fit , cujus vafa ad
dimidium fuæ capacitatis coarctan-
tur ac in alio cujus vafa in priftino
forent ftatu & quantitas fanguinis
duplo augeretur : ita ut præter uti-
litates cuilibet balneorum generii
communes , peculiaris altera frigi-
do in eft , vis nempe univerfaliter
ac violente omnes membranas om-
niaque corporis vafa contrahens
ac constringens , nihilque in subi-
taneis curationibus prodigiofum
operatur balneum , quod non poffit
ex prædictâ caufâ explicari.

§. XI.

Aft aqua certè eam poffidet
notam , quâ humefacere ac tonum
partium , noftro corpori admota
remittere poffit & exinde ingentem
in corpore mutationem præ-

ducat, & ut aquæ pressio efficacior
 frigore evadit : ita relaxandi po-
 testas moderato calore intenditur
 lenis enim calor semper corporis
 solida laxat, dum commodè &
 gratè sensum tactûs feriat ; itaque
 ubi relaxare oportet, balneis tem-
 peratis utendum, uti illo quod
 in *Brunston* invenitur ut potè quod
 omnium quæ in Anglia prestant,
 temperatissimum : commendatur
 autem ob id præprimis ejus usus
 quod languidos vel lassos ob diur-
 nam fatigationem recreet atque
 reficiat. Communis mos est illis
 qui longâ equitatione fessi, ubi
 primum ab equo descenderunt,
 balneum ad breve temporis spa-
 tium adire, quo ita agiles, ve-
 geti & ad motum magis parati
 evadunt, ac si somno manè sur-
 gerent ; quippe cum lassitudo ni-
 hil aliud sit quam fibrarum car-
 nearum ultrâ consuetudinem dis-

tenfio vel magna fibrarum extenfio , à nimium perfeverante vel violentâ exercitatione producta , optimè in fanum vertitur ftatum , feu difpellitur relaxatione , & hinc eft quod fomnus laffitudinem tollat.

§. XII.

Balneorum effectû relaxante , ità hiant fpiramenta cutis ut per ea ingens perfpirabilium effluviarum balnei tempore , magis quam in alio foras educatur , huc fpectare videtur cur torofo ac lacertofo corpore præditi , ufu balnei per hebdomadam 10. libras de pondere detraxerunt quæcumque ex libera perfpiratione manant commodâ hoc pacto haberi poffunt , & fi illud non negaverimus magis exindè frigori obnoxium fieri , nihilotamen minus Autumno , cautione adhibitâ prædictum

balnei frigidi usum, post calorem posse non solum idgenus inconueniens prævertere. Verum in pluribus casibus magis beneficum evadere, illud autem tanquam indubitatum habeo lavacrum de quo agitur, dolores capitis abigere & dorsi, & articulorum; nobilem Virum novi qui cum conquestus esset de dolore pectori per duos annos tenaciter inhærente, perfusione corporis in balneis quater vel quinquies celebrata tandem sanus evasit; item rheumatico dolori diu affligenti, arthritidi, colicæ, claudicationi, tendinum siccitati, vel nimix contractioni &c. ægregiè opem fert ac quomodo hæc peragantur facili negotio ex prægressa theoriâ cognoscere licet; attamen.

§. XIII.

Melius effecta balnei succedent

per aquam seipsam in corpus per cutis spiracula vel poros insinuantem, hæc siquidem cum sanguinis massâ commixta acria salia in latice seroso diluit ac dissolvit quò faciliùs per secretoria eorundem evacuationi destinata organa foras extrudi queant ut usui habendum sit calens balneum in omnibus affectibus ubi multum satis exsuperat uti scorbuto pluribusque aliis cutanies morbis.

Etiam si haud difficilè aquæ balnearis ingressus in corporis compagem credatur, hæc tamen fides debili nititur fundamento, vel quod nunquam sedulò ac ut par est attentè examini subjecta fuerit res, vel nunquam perpenſa, quæ in contrarium adduci possent argumenta: evincunt autem pericula mirandâ sanè aquam donari virtute, quâ in quodlibet juxtâ adjacens corpus penetrare possit: patet
autem

MECHANICUS. 229

autem qualiter pluviam tabula tumet, ob nimirum exiguas in aëre natantes moleculas quæ ab incumbente aëris oceano, gravatae, pressae in tenellos ligni, tubulos adiguntur ubi nullam reperiunt remoram, cum aërem componentia majori crassitie praedita sint, quam ut corpus praedictum permeare queant, nequaquam dubitari potest: ut ut contrarium verum videatur, aquae partes aëreis minores esse ut pote quæ poros aëri impervios pervadant: cudit siquidam sibi viam aqua per meatus cuticulares animalis etiam postquam portio cutis in corium siccata atque conversa Bellinus (de urinæ & pulsibus pag. 146.) hoc expertus est in cute è capite humano deducta leniter siccata lapidi, quo facilius intra aquam immergeretur alligata: post enim 5. horas aqua omnes tegumenti villos per-

meaverat: verum nihil æquè demonstrat potestatem aquæ commutativa corpora pervadentis quam experientia sequens.

Strictissima vel summè contorta funis portio accipiatur, cujuslibet longitudinis (ast quo longior eò sensibilius periculum pendeat autem ex hamo vel umbo, cujus extremitas annexum habeat quodvis pondus, modò non eo usque penderet ut restem frangeret, deprehendes pondus de quo loquimur attolli aëre existente humido, descendere vero in sicco ac sereno cælo. Poteris & quodque hoc experiri si madefacta spongiâ admotâ, latera tomicium humectes, elevabitur tunc enim pondus annexum: hac ratione exiguus particularum aquæ numerus par foret superandæ infinitæ resistantiæ si funis infinitè resisteret jam verò cum non nisi parva

adfit aquæ copia , & hæc per poros funis intrudatur vi , pondere cylindri aërei defuper incumbentis æquali , fequitur aquæ inefle nonnullam proprietatem , vim qua feffe in corpora infinuat multum adaugens , quæ non eft alia nifi cunei , vis autem cuneorum reciprochè eft ut angulus quem acumen efformat , verum in fphæris major vel minor curvitatís gradus confiderandus eft ut earum angulus , quando videlicet fphærae fpectantur ut cunei , atque gradus curvitatís fphærarum reciprochè funt ut radii earum. Cum igitur aquæ moleculæ fint infinitæ parvitatis , atque aëreis minores ; debent ubi cuneorum munus obeunt , vi infinitè adauctâ , agere in adjacentia corpora ut quam libet infinitam refiftentiam vincere poffint. Ponatur nunc quodvis repagulum ingreffui aquæ in cor-

pora objectum ; difficile sane est creditu illud prædicto quod tamen parva aquæ quantitas deincit , majus esse. Quæ autem in medium retuli experimenta ea in mortuorum hominum vel animalium cute probavi , quæ non dubito quin rem extra omnem dubitationis aleam ponerent , si periclitari in vivis liceret : hoc autem discriminis inter est , quod in vita vapores , perspirabiles in aëra circum fluens jugiter eleventur, quod post mortem non evenit.

Effluvia autem hujusmodi ut ut magnâ vi tollantur , nequeunt cum illâ quæ in aquæ insinuatione in corpora deprehenditur , consistere : cum hæc vis ingens admodum sit ut commentati sumus , & quamvis per cutem spirantium effluviiorum copia 24. horarum tempore oppido exsuperet ; cum sit (Sanctori. stati. aphor. 6. §. 1.) § esculento

rum & potulentorum, attamen si ad
 calculum exigatur perspirans intra
 datum tempus materia longè mi-
 nor invenietur quàm ut possit bal-
 nei aquam ab ingressu intrà cor-
 pus arcere. Nam Pitcarnius (dis-
 fert. medic. pag. 130. demonstra-
 vit materiam insensibilis perspira-
 tionis intrà minutum esse 1200¹.
 pars loci è quo manat, videlicet
 spatium scrupuli cuticulare intrà
 minutum exhalare $\frac{1}{1200}$ -) & conse-
 quenter 31 cutis transmittere $\frac{1}{12000}$
 drachmæ intra minutum. Ponatur
 nunc pollicem cutis quadratum
 pendere 31 tunc per spiramina il-
 lius pollicis quadrati spirat minu-
 ti spatio $\frac{1}{1200}$ drachmæ, pollex verò
 quadratus in balneo gravatur pon-
 dere majori quam in aprico æquali
 nonaginta sex drachmis. Conclu-
 dere ergo licet corpora nostra res-
 pectu habito ad partes demersa ef-
 se duos pedes, ubi balneis utimur

234 TRACTATUS.

hinc quilibet pollex cutis quadratus sustinere necessum habet onus

24 pollicum cubicorum aquæ æquale 96 drachmis. Sed quia cubicus pollex aquæ continet drachmas quatuor & $\frac{384}{1728}$ drachmæ fractione numero relicto, elicitur exinde

24. pollices cubicos debere æquari 69. drachmis. Jam verò cum in minuto per pollicem cutis quadratum effluat tantum $\frac{1}{1250}$ drachmæ

seu ponderis materiæ quæ ex toto illo spatio erumpit: nemo dubitabit elevationem vel ascensum transpirantis liquidi impediri pondere

11500. majori ipsius pondere nam

$1200 \times 96. = 11520$) quam celerr

quamque rapidus igitur statuendus

fit exhalantis materiæ motus: si

concipiamus hanc elevare ac sus-

tentare corpus 115200". ponde-

rosius? Ità sanè foret sitotus exiens

liquor spatio unius minuti deberet

simul & eodem tempore suas vires

in superaccumbentem aquæ molem exerere. Verum tantùm abest ne hoc fieri possit , ut potiùs sudoris non egrediantur continenter & sine ullâ intermissione guttulæ , quemadmodùm aquæ vis compressiva assiduo exercetur , verum spatia inter perspirationis tempora interjecta sunt multùm brevia , ponantur ea esse 60. intrà minutum , qui numerus est pulsationum quas sani hominis arteria intrà datum tempus edere solet ; erit diffusus ex cute vapor , simul & eodem tempore vim suam exercens in incumbentem aquam quantitate sextuplo minore assignatâ quæ ducta in 1200. dat 72000. numerum partium in quas dividi potest drachma exhalantium halituum , quarum una seorsim energiam exercet secundi minuti spatio contrà 96. aquæ drachmas hinc elicitur transpirantem vaporem quolibet secun-

236 TRACTATUS

do debere elevare pondus 6912000
 ipsius materiæ pondus excedente
 si aquæ ingressui resistat, quippe
 90. qui est numerus drachmarum
 aquæ super incumbentis pollic, cutis
 quadrato $\times 7200$. numerum par-
 tium perspirationis drachmarum
 componentium æquat 6912000.
 quod productum differentiam ex-
 hibet inter copiam effluviorum in-
 trà secundum diffusorum & quan-
 titatem aquæ, quâ egressus perspi-
 rantis debilitatur retardaturque ;
 jamque hinc satis superque (ut pu-
 to) demonstratur aquæ cum liqui-
 dis vitalibus miscela ; ità ut nihili-
 tam monstrosus sit quod ex pecu-
 liaribus passionibus aquæ quas
 memoravimus deduci nequeat ,
 absque eò quod ad salia quibus
 aqua fæta ac prægnans esse dicitur,
 confugiamus , utut illa morbis cu-
 randis quid conducant , quæ de
 balneis commemoravi tanquam no-

vissimè inventa accipienda sunt. In hunc modum ratiocinia mea experimentis notis innixa sunt, & utrum quæ argumentando elicui sint optimè deducta, Lectoris iudicio (modo necessariis qualitatibus ac moderatâ attentione instructus accesserit) decernendum relinquo.

§. XIV.

Generale huiusmodi assertum, aquam scilicet balnearem in humanum corpus agere (contractivâ vi vel laxante ac humectante solida nec non diluendo fluida) accommodare omnibus morbis ubi salutaris vel noxiæ balneæ esse debent, si vellem, excederet profecto animus quem proposuit in hoc tentamine limitem; magisque longum quam præscripsi tempus absumerem, etsi forte imposterum opportuna huic rei occasio se offerat.

De indumentis laneis

S Ponsione obligatam nunc liberabo fidem, nonnulla pannorum ex lanâ confectorum gestationem attinentia dicam. Nescio autem quo fato ea in plurium Neotericorū animos subrepserit opinio, ut id genus vestes proficuas esse existiment, secus ipse experimentis edoctus. Puto videlicet hujusmodi vestimenta plus nocere quàm prodesse, ac maximopere iis quibus vulgo præscribuntur, nempè debilibus, languentibus, hecticis infensa. Non negandum tamen adesse quosdam qui exindè non nihil compendii recipiant: ast rari admodum sunt ut non dubitem quin aliqui, quod unicè debetur cæteris causis latentibus huic gestationi adscribant, quæque curationem perfectiùs ac citiùs absolvissent si his usi fuissent.

Qui robustæ constitutionis & edunt bibuntque affatim , interea tamen minimè se exercentes ut nutrientis ac pleni victûs residuum eliminetur ; qui destillationibus catharris , articulorum doloribus obnoxii vivunt , & aliis morbis suscipiendis proni , qui originem suam plethoræ debent ; ii optatum effectum exinde , nimirum ex indumentorum laneorum usu , recipiunt , qui quando nimius est fibrarum cutis tonum adeò relaxat ut perspirationem , quæ antea ritò fiebat , impediat. Siquidem etsi transpirantis liquidi quantitas proportionata sit foraminulorum cutaneorum aperturæ , hæc tamen minimè apertiora sunt ubi cutis laxior est , quomodocumque necessarium sit cutem notabiliter relaxari ejusque spiracula quam maximè dehiscere.

Certissimus ac permañes hujus

generis vestimentorum ex vellere confectorum effectus est expeditior ac copiosior perspiratio quæ etsi multum utilitatis afferat juxta Sacerdotiũ (medic. stat. aphor. 10. 42. & 44 § 1.) ubi moderata, ubi verò consuetudinem & modum prætergressa est nihil perniciosius : cæteri autem exinde producti effectus, ut dubii eventus, ita solummodo tanquam auctus perspirationis confectarii habendi sunt. Jam verò cum increscens una evacuatio alteram imminuat, ubicumque à sanguine nimium foras secedet sive per alvum, sive per renes, sive per sputum, pannorum laneorum gestatio præmonstratur.

Walthmeidt (de diarrhæâ intermonita medica) & Baglivius (de praxi medica pag. 76) observant diarrhæas ex immoderatâ tristitiâ incurabiles esse, illudque potissimum ex cohibita perspiratione ;

mærore

maore ut omnibus aliis animi pathematis turbulentis constringitur cutis. Igitur halituoſi vapores qui ex peripheria corporis foras emitti conſueverant, nunc præcluſo eis aditu, in cætera corporis colatoria præcipites ſe dabunt, alvique profluvium fovebunt, ſi illa inteſtinalia fuerint; docuit experientia veneris exercitium ventrem ſiſtere ex eo quod relaxatis ſolidis omnibus ac effeminatis perſpirationem inſenſilem promoveat quæ ſemper ſequitur deſiderii aviditatem, quapropter effemi imbecilla corpora hiberno tempore ſolutum habere ventrem conſueverunt (ob aërem frigidum meatus cuticulares denſantem) quæ ad priſtinum ingenium adventante æſtate, redit: in dyſenteria ab his quos ultimo loco laudavi ſcriptoribus, præ omnibus jube corpus conſervari calidum & præſertim pedes, ut exinde produ-

catur , & foveatur perspiratio ,
atque ut notat *Baglivius* consen-
sus quidam inter cutem , & in-
testina ad est , ut Hippocrates an-
te eum.

Sanctorius (§. 1. Aphor. 46.)
tradit perspirabiles halitus intus
retentos qui nec ope naturæ nec
febris supervenientis discutiantur
resolvanturque , corpora ad ma-
lignas febres disponere , nec non
Doctor *Cokburne* , in tractatu suo
de morbis eorum , qui in marii
vitam degunt multa exempla fe-
brium à præpedita perspiratione
productarum refert. Hic autem
cum quæ solent antecedere symp-
tomata (uti appetitus prostratus ,
spontanea lassitudo , subitaneus vi-
rium lapsus , stupor cum propen-
sione ad somnum , alvus solito
strictior) febrem minitantur , ma-
ximè omnium hanc antevertet ad
priorem indolem redacta perspi-

ratio , vel in libertatem asserta , & panna prædicta optimè hic suas partes agunt. Attamen in jam memoratis casibus rarò vel nunquam in usum advocanda , etsi in illis solummodo proficientia esse possint.

Ut elucescat quantum noxæ id generis indumenta , iis præscripta quibus multa est perspiratio , atque debile & molle contigit corpus , afferant , animadvertam ex Sanctorio insensibilem perspirationem duplam esse omnium aliarum sensibilium evacuationum per urinam , & alvum factarum , quodque hæc egestio ad illam alvi eandem obtineat proportionem quam habet 40. ad 4. (medic. static. aphor. 59. §. 1.) itaut decies major evacuatione alvina sit : hinc corpus , alvo decies fusâ non tam debilitaretur quàm si cutis duplo majorem ha-

litum proflaret copiam solito, accedit. Si consideremus maximam faciem partem tandemmodo ex alimentorum reliquiis, quæ lactea subire non potuerunt, conflata; reperiemus longè majus discrimen; concipere enim possumus decimam illorum, quæ venter demittere est solitus, partem jam ex sanguinis oceano segregatam inter ventubilis, organi hepatis nempe pancreatis intestinorum glandularum, ut hoc pacto tantumdem ex sanguinis penu ope perspirationis unico die derivaretur, quantum alveo in 100. extrudi. Proinde si quomodo libet spatium 24. horarum duplicata fuerit perspiratio, hominis vires magis elideret quam si venter intra datum tempus centies duceretur, & nemo est qui non ab insolita purgatione, virium languorem expectet, & indies experientia instantaneum vitæ discrimen in diabete

feu in urinæ profluvio aperit, de-
tegitque; ast parum attendunt ad
exsuperantem perspirationis mo-
dum, eo quod sensus fugiat hinc
affectus exinde promanantes alteri
causæ adscribi solent.

Nobilis tabida in regione *Shef-
field* medico consulente cum ves-
tes ejusmodi levidenses gestâisset,
etsi optimè, domi deambula-
re potuerat intra dierum dierum
spatium in lectum coniecta fuit
(ex quo nunquam exiit), nulla
alia causa evidenti quam laneorum
habituum usu.

Si ea quæ adduxi ejus sint robo-
tis, ut satis horum indumentorum
gestationem dissuadent, auctor ero
ut derelinquantur tempestate cali-
da, & eodem tempore balneum
frigidum vel corporis deterfio ac-
cedat, quæ mala secus indè secu-
tura prævertat.

Decem ab hinc annis persuasus

prædictis vestibus me indui, ut
ferinæ quâ tunc afflictabar tussi
occurrerem; exinde aliquem, opi-
nor, percepi fructum, ast postea
quam unius vel duorum annorum
curriculo, trita fuerunt, ea sanitati
nociva fuisse compertum habui;
adeò delicatum ac languidum red-
diderant ut nec minimo frigori
ferendo par essem, atque experien-
tia docuit, quantum horum dere-
lictio me ad lypothimias dispo-
suerat, hinc pluries id generis in-
dumenta rejicere molitus sum, at
in cassum cum graviora quam to-
lerare poteram sequerentur incom-
moda donec duobus ab hinc annis
cum æstate, balneum frigidum
adirem illa sinè ullâ noxâ dereliquit.



CAPUT VIII.

De Esculentis.

§. I.

SI animalis corpus diversas actiones absolvere minimè potuisset profectò non melioris notæ quam gleba terræ fuisset ; exsequitur autem tam varias , tam discrepantes functiones ope infinitorum pene exiguorum contractilium villorum qui quâlibet sistole ac diastote quæ millenæ sunt unica die , mutuoque inter se attritu , abradi ingens exiguissimorum ramentorum effluvium dimittunt , quo fibræ indies languescant necessum sit , atque impares obeundis functionibus fierent si in eadem quâ amittunt proportionem ,

non restaurarentur, & quoties fibrarum adest relaxatio, pori adaperiuntur & in opportuno sunt statu ut materiem à circulantibus humoribus suggestam recipiant scrobiculis affigendam, & hoc in somno peragitur. Itaque quemadmodum tempore dispendii oritur debilitas, sic somni tempus suppetias præbet, atque hinc obiter somni necessitas inspicienda.

§. II.

Jam verò ea quæ prædicta subsidia nobis suppeditant sunt alimenta sive fluida, sive solida, & omne illud quod eo fine sumimus, tale, non modo ventriculi sed & fistulæ intestinalis actione, evadit, nempe in partes disjungitur tam exiles, ut fossulis in abrasis fibrarum lateribus relictis adaptari queant.

Exindè elicere possumus & necessitatem assumptionis alimentorum, & fluidorum circulationis, utrum enim si deficeret, nullo modo repararentur solidorum jacturæ diariis contractionibus factu.

Ita ut qui suæ conservationi invigilat, exercitium cum alimentorum copiâ & somno conferre debeat & D. Fuller in medicinâ gymnostatica (quamvis sub alio respectu optimum sit opus illud) à viâ magnoperè aberrat in præscribendis exercitiorum generibus, hisque nimium violentis, omnibus qui ea ferre possent indiscriminatim, vel saltem iis qui etsi hujusmodi athletica exercitia observare possint, non tamen finè maximâ virium prostratione. Missa hæc facere debuissim ad ea quæ circà exercitium dicturus sum, nisi facillimè ex mox commemoratis sequerentur.

§. III.

Ast ne despiciatui haberetur tam necessarium nostræ conservationi auxilium, optimus nostræ salutis Auctor duos appetitus nobis concessit solidorum alterum quem *famem* vocant, & alterum fluidorum *sitim* dictum, qui melius quàm ut possint describi experientiâ quotidiana cognoscuntur & sicuti stimuli vicem gerunt ut remuneretur naturæ petitio, ità constituendi nobis essent tanquàm Duces circà quantitatem, & qualitatem esculentorum & potulentorum, si homines, suâ intemperantiâ ac irregularitate hæc non vitiarent: animalis structuræ peritia non eam affundit lucem quâ ritè qualitas & quantitas assumptorum sanciri queat ut ad edendi bibendique scopos melius illæ dirigantur.

Etiamſi Sanctorius (medic. ſtatic. §. 1. aphor. 64.) eduliis ad ſanitatē tuendam modum ſtatuerit dicens: *obſerva manè poſt aliquam pleniorē canam quantum perſpiravit materie ſpatio 12. horarum ponatur ad 50. uncias ; alio manè ſed poſt jejunium (hâc tamen lege ne in prandio præterita diei exceperis) idem obſerva ponamus eſſe 20. hoc præcognito eligas illam cibi, & aliarum cauſarum non naturalium moderationem , quæ te ad medium inter 50. & 20. ducere poterit , medium erit 35, unciarum , hoc modo ſanctiſſimam & diutiſſimam ſeu 100. annorum vitam duces.* Tantūm verò abeſt ut hic aphorismus ſit quædam infallibilis regula , ut potiùs in pluribus caſibus fallat, ſervatâ enim eâdem cibi & potùs unius generis quantitate duplo uberior perſpirabit in eodem tempore materia quam ſi alimenta

& potulenta elterius generis assumeretur.

Ad hæc , nonnullos esse , qui ut sanitas facta , lectaque fervetur , copiosius perspirare , alios verò parcius debent, juxta plures laudati Auctoris aphorismos , certum est. Hinc alius in hoc gravi negotio quærendus nobis esset magister , addux , cujus partes non nisi ambo illi appetitus famis & sitis supplere jure queant qui eduliorum & potulentorum copiam merientes inexhaustæ hominum edendi & bibendi aviditate limites ponerent , justum præscriberent modum , atque in universum eò usquè edendum ac bibendum nobis est , donec nos fames & sitis non amplius vexent : quoties enim cumque extrà à naturâ præfixos limites progredimur , toties diversorum affectuum seminia ferimus , at Hypocrate monente (aphor 5. §. 1.)

tenuis

tenuis diætæ delicta , illis plenioris pejora cum sint; exinde periculosum est victu nimis parco uti.

§. IV.

Non modò , ubi sanus est homo , fami & siti anscultare necessum habet , sed & dum pluribus morbis conflictatur , ipsas consulere ; quarum rectioni etsi optimum sit se subicere non nimis tamen fidendum : *in febribus inflammatoriis* quid aliud magis expetunt ægrotantes quam frigidos liquores ? et sane nihil præstantius , vel quid detestabilius quam cardiaca , amara , alexipharmaca , ac testacea , uti sunt corallia , perlæ , & pulvis gascoïnæ ? Et profecto hæc detestantur ægri. Hypochondriacis haud rarò vorax est appetitus , sitis autem pauca , vel nulla atque alimenta succulenta rationabiliter

sumpta præstantissimum in hoc morbo conferunt auxilium & cum parùm epotent potiones generosas atque spirituofas exoptant, quod utrumque illis utile existit, si uti possem ad confirmandam hanc veritatem, in medium omnia exempla afferre animus esset majoris quodam modo morborum partis descriptionem aggredi deberem. Verum cum hunc laborem mihi demere voluerim testem hîc appello experientiam cujuslibet sagacis medici.

§. V.

In assumptis hæc tria observare licet copiam, qualitatem & fumendi tempus. 1°. expedit paulò plus quàm minus fumere ad sanitatem ut patet ex aphor. Hippocrat. & multorum Sanctorii (aphor. 15. 16. 32. 33. 40. 44.) & profecto

delictum pleniorē victum sequens sanatur vel tollitur labore & leni evacuaticne, ast quæ tenuissimum exsolutio virium sequitur non tam facilis est restauratu.

Non est hîc quod ingluviem commendare velim, quæ nunquam non pessima advocat mala Ast eos admonere qui ex variis historiis vel auditis, vel lectis, hominum qui parcissimâ diætâ ad longum protraxere vitam, admonere, inquam, ne horum sequantur vestigia, quorum tamen miseram conditionem non semel deprehendi, & in genere hujusmodi exempla quæ sanè per pauca illorum sunt, qui otio, ac vitæ inertî indulgent quippe cum non nimiam spirituum jacturam patiantur nec nimia chili advenientis copia egent, sed quæ tali dispendio respondeat, quamvis qui perparcè vivunt, laboribus ferendis inepti sint. Si verò leni

& moderatâ exercitatione utantur , longiorem protrahent vitam, quàm corpore validi ; atque notare licet homines quibus squalida ac lurida est facies , & pulsus debilis , diutius vivere illis qui optimâ ac inoffensâ valetudine fruuntur , nec non vegetum pulsum habent. Hoc autem manifestum est ex eo quod in tutis ac vegetis corporibus humorum moles maximè volatilis sit, utique magis idonea ad quamcumque impressionem à quolibet agente factam suscipiendam ; solidæ partes magis tensæ & rigidæ cum sint , eas in omni casu vegetiores , nec non frequentiores pulsus edere clarum est , sicque inflammationibus viam sternere ; ad hæc cum in hac temperie major aptitudo ad fluidorum partes atterendas , minuendas ac disjungendas solidis insit , majus & quoque partium suarum dispendium oboritur.

§. VI.

Exercitationibus nimium deditis consulenda plenior victûs ratio ex §. 1°. quod moniti loco sit iis qui otio diffuentes cibo & potui multum intereâ indulgent, etsi ubi cerebri membranæ unâ cum aliis membranaceis partibus intensa acri & severâ quâdam meditatione protensæ atque defessæ fuerint, haustus spirituosî liquoris ad hilaritatem, dulcis amicorum societas ita parum sanitati obsunt ut è contrâ multum compendii afferant: etenim præterquam quod perspirabile prægresso studio coërcitum, urgeant extrorsum, fibras maximè tensas ac spas modicè contractas emolliant, relaxentque, quæ paratiores refarciendis impendiis quæ diutinâ animi contentione contraxerant, fiant.

§. VII.

Ex aliâ parte mobiles viri , si cibi & potûs mensuram excesserint nihil aliud iis agendum suppetit ad morbos exindè eventuros præcavendos , quam ut violentis motibus seu exercitationibus se concredant , modo hæc ferre potuerint ; exindè liquet cur vulpium venatores Nobiles diutiùs iis , qui ab exercitiis feriantur , vivant : hoc pacto cum fibræ magnoperè debilitatæ , ac languidæ sint ob copiosè spirituosâ liquida ingesta (potationem siquidem nimiam consequuntur omnia signa generalis relaxationis , ut hæsitantia linguæ incessus titubans , corneæ collapsus , pupillæ dilatatio) corpus ad hydropem , ad morbum regium , tabem , apoplexiam , paralyfim &c. disponitur (uti apparebit conse-

rendo horum affectuum theoriam cum generali laxamento) si hujus modi mala non præcaventur , naturalem videlicet ac debitum roboris gradum solidis tribuendo, quod nihil melius præstat quam athletica exercitatio , nihil amplius de hac re addere visum est , ne illa prævertam quæ in sequenti capite dicturus sum.

§. VIII.

Senes parciori alimento egere ; secus autem juvenes , vel qui in flore ætatis constituti sunt , Auctor est Hippocrates (aphor. 13. §. 1.) atque huic observationi ad praxim reductæ suam longævitatem , ac secundam valetudinem tribuit famosus ille italus *Cornaro* (qui quo magis in ætate progrediretur eò minorem nutrimentum sumebat) cum adhuc illibatâ sanitate vel anno 120. frueretur.

Qui robustæ ac vegetæ sunt constitutionis majorem imbecillibus, ac debilibus alimoniam quantitatem exigunt, sani ægrotantibus, quippe impura corpora quo magis nutriveris, eò magis lædes Hippocrates (aphor. 10. §. 2.) ast sunt morbi quibus non modo nutriens victus, sed etiam modo ventriculus non abnuat justo major eduliorum copia quales sunt hypocondriacum pathema, hydrops incipiens & ubicumque languida lentaque observatur arteriarum micatio modo non negligatur interim exercitium. Tenuis victus in acutis præstat, secus verò in diuturnis morbis, & ubi ad summum evecti sunt, tenuissimus eligendus (Hippocr. aphor. 8. §. 1.) idem quoque præscribendus, in febrium per intervalla recurrentium accessionibus (idem aphor. 11. §. 5.) quod quantitatem attinet sequentes regulæ observentur.

§. IX.

Toties assumptorum copia nimia censenda est, quoties eâ adeò distenditur ventriculus ut 1°. Molestiam quamdam procreet & tunc septum medium comprimendo, nec non magnum descendens aortæ truncum & cavæ ascendentem non modo spiritûs difficultatem advocat sed & liberum sanguinis per vasa cursum intercipit, exinde profluenter pleniorque gurgite ad capitis arterias appellet sanguis, easdem eo usque dilatabit ut maximam partem spirituofo lactici per nerveos canales subripiatur aditus, ex quo homo minus agilis & torpidus, ac dormitans erit. 2°. Si homo sanus sanitatem tueri velit semper à mensâ famelicus recedat. 3°. Si à pastu corpus vel animus minus idonei sint obeundis mu-

262 TRACTATUS

niis quam antea videlicet si impatiens quis nec ita ut antea ad laborandum vel meditandum paratus sit sciat ille se in assumptotum copiam deliquisse.

§. X.

Quod autem qualitatem cibariorum attinet, sciendum ea ex duplici regno, ut aiunt, desumi vegetabili & animali: horum aliqua magis nutrire, alia minus: nonnulla solida alia fluida tamen simplicia vel composita adesse.

§. XI.

Quæ ex animalibus depromuntur videntur aptiora ferendis suppetiis ad virium recreationem destinatis ac jacturam reparationem, diariam fibrarum molitione contractarum cum moleculis jam ad eundem

scopum applicatis facta sint : cum e contra quæ ex vegetabilibus deducuntur ea ut in alimentum ac nutritum convertantur pulmonum ac ventriculi viribus subjici debent quæ organa illis animantium debiliora existunt, quæ in quotidianos usus nutrimentum nobis suggerunt, cum eorum solidæ partes sint ipsamet enutriens materia non fluxilis sed in solidam substantiam commutata & nihil aliud in nutrimentum animalis transformetur nisi exigua vegetabilium assumptorum pars, ut ingens fœcum excretarum ostendit copia, exinde fit, ut eadem animalium vel ex his desumptorum cibariorum quantitas magisquam vegetabilium alat, hoc ita esse argumento loco sint carnivora, quæ uti perparcè edunt ita & quoque robustiora ac sagaciora deprehenduntur.

Si Anglo cuidam carnis libra unica quolibet pastu suffecet. Batavus qui quoad maximam partem vegetabilibus vescitur brassicæ libris duabus indigebit, nec ideò alacrior erit & vegetior Anglo. Prætereà quodlibet naturam corporis induere debet alkalinæ naturæ volatilis sit oportet, uti variis in sanguine tentatis experimentis liquido constat, iis enim ratum habetur, sanguinem refertum esse alkalicis salibus sive in statu sano, sive morbo: solutio enim sublimati in albam tenacem gelatinam serum convertit, cupri limatura intra 24. horas in cæruleum violarum sirupus & heliotropii dissolutio in viridem, quæ omnia certò alkalinorum præsentiam demonstrant, ipsæmet fibræ distillatæ oleum spiritum volatilem spiritui cornu cervi haud absimilem, nec non falem volatilem suppeditant, adeò

ut

ut quæ vis esca , quæ propriùs ad succorum alibilium indolem accedit majorique copiâ principia prædicta sufficit , congruentissima huic fini censetur , jam verò hanc alendi proprietatem , maximè omnium obtinent animalium carnes , gelatinæ , juscula , sorbitiones , quæ omnia oleosa quâdam alkalica substantiâ ditescunt , vegetantia verò , ut potè quæ magis viscida , ità & magis excoqui in ventriculi culinâ exigunt ut moleculæ orificiis lacteorum permeandis idoneæ sufficiantur , & ità particulis acidis facta sunt , quæ antequam in animalis naturam transeant ventriculi , fistulæ intestinalis & cordis energiâ alkalicas fieri necessum habent.

§. XII.

Inter diversa quæ vegetabile regnum depromit alimentorum ge-

nera, panis ut universalissimum constituit cibum ità & maximè altibilis est, magisque vel minùs alit pro granorum discrepantiâ, diversâ quam subit præparatione & tempore vel morâ quam necit antequam humanis usibus consecratur; qui ex tritico fit plus alimenti præstat, præsertim si furfure probè mundatus: verum tunc difficiliùs, digeritur & alvum supprimit, si tamen oryzâ vel furfure confusus fuit, eandem ducit. Pauci sunt qui azymum in stomacho perficiunt ut ut duris laboribus exerciti constanter illum manducent. Fermentatus panis præstantior est, & eò ad concoquendum facilior quò abundantior fermentationem subierit, quæ alias triturationis ventriculi ope perfici posset. Quemadmodum enim eduliorum digestio non nisi horum est reductio in particulas adeò exiguas ut per chili-

ferorum ora trudi valeant ità fermentatione fermentantis massa tantum modo disjungitur intime dividitur, exindè componentium contactus destruitur itaque minùs crassa & viscida redduntur, & facili negotio in pultamen chilaceum committuntur, hinc colligitur tenerum panem ægriùs diali concoqui, quod recens nempè tenacitate alterum superet: quamobrem panatellæ fartum atque ex pane confectâ imbecilli stomacho aptiùs congruunt quam qui ex farinâ conficiuntur. Satis hìc ut opinor erit animadvertere perniciosam eorum praxim qui in ora suorum infantum pulticulas lactè paratas ingerunt eò usquè decoctas, ut consistentiam pictorio glutini planè similem acquisierint; nec mirum est si renelli infantes distensione flatulentâ ab Dominis exindè tententur, aliquandò fufam interdum cohibitam

habeant alvum, quandòque verminationibus, quandòque convulsionibus afflictentur. Hæc autem, feliciùs alio quovis medicamine mutata victûs elidit ratio.

Grana maximè usitata defumuntur ex tritico, oryzâ, hordeo, avenâ, phaseolis, & fabis (oryza rarò apud nos & semper in medicos usus adhibetur ad alvum sistendam, verùm sæpiùs conficienti ventriculo admodum obluçtatur), quæ omnia inter se differunt penes majorem vel minorem ad concoquendum facilitatem, & majorem vel minorem alibilis quod sufficiunt proventum.

In utroque respectu cæteris anteponendum est triticum, ast oryza, avena, & hordeum, ubi ritè præparata fuerunt præstantem suggerunt escam, phaseoli & fabæ tenaces ac viscidæ nimium sunt hinc flatus excitant cerebroque & ventriculo nocent.

Hoc alimentorum genus nisi cum nimis flatulentum est athleticis corporibus quorum fibræ prætermodum tensæ, totusque sanguis alkalicis salibus exsuperat utile est: id generis quippe cibaria in distillatione multum olei ac acidi solen-
a affundere; quamobrẽ relaxandis ac emolliendis fibris admodum contractis idonea habentur, nec non obtundendæ ac corrigendæ acrimoniæ alkalinæ sanguinis, proindeque in usum vocantur in scorbuto, leprâ, & quam plurimis aliis cutaneis morbis, ad hæc quoque iis conveniunt qui obnoxii sunt inflammatoriis morbis, veluti pleuritidi, rheumatismo, sanguinis effervescentiæ, capitis fluxionibus, vel humoribus in facie aliisque locis decumbentibus, astmati periodico &c.

Acetaria atque radices, frigidaque omnia, nec non su

dulces fructus, quæ omnia cum omnibus innotescant fingillatim notare opus non est eamdem pene redolent indolem nisi illa excipias quæ inflationem habent quæque proinde nequeunt à debilibus innoxie fumi.

Aceto condita, calida, & radices optimi sunt usus, ubi animalium carnes emolumentum afferunt quemadmodum in omnibus illis affectibus in quibus serum abundare, fluidorum motum lentiolem, ac solida tono destituta videre est.

§. XIII.

Exploratum habeo nonnulla ex carnibus confecta vel in lentis febribus utiliora esse quam quælibet generosa officinarum cardiaca. In vice hoc in memetipso experiri licuit cum postquam febre per decem dies detentus, frequenter ani-

mi deliquio conflictabar ut quolibet die in magno vitæ discrimine versaret, & quamvis varia corroborantium genera affatim ingererem, virium reficiendarum gratiâ, nihilominus eorum vis citò evanescebat, & lypothimiæ recurrebant tam sæpè ut ferè totus essem in bibendis cardiacis, donec transacto uno aut altero die, aliqua pulli galinacei juscula tentavi, quæ parcè sumpta ventriculo languenti admodum accommoda reperii, hisque vires revocabantur magis quàm prægressis cardiacis. Hoc animum addebat ut juscula fortiora aggrederer, etiamsi cordis defectio pergeret, licet non ità periculosa, quoad tandem ad juscula ex carnibus vervecis vituli, ac pulli simul coctis deveni, atque quâlibet secundâ horâ jusculo me reficiebam, sicque perrexi ad 20. dies, quæ tantum absuit ut præter natu-

ralem calorem , vel aliquam molestiam , vel morbum excitarint , ut potius toto illo tempore , de nullo alio nisi de summâ debilitate conquestus fuerim ; hoc tamen non impediebat quominus quolibet matutine , etsi ægrè admodum de lecto surgerem , sine his liquidis forbitionibus existimo (& jure) futurum fuisse ut diem extremum cum morte conficerem , & licet , omnes alias medendi vias , quæ menti per id temporis occurrebant , consecraretur. Cur autem in summâ virium exsolutione diutius multusque in lecto decubitus periculosus sit , ubi res exiget , demonstratum ibo. Verum antequam huic historiæ finem imponam , adnotare licet inter omnia vires refocillantia , quæ sumpseram subsidia , nullum languenti robori magis congruens peruviano cortice , nullius quæquam hujus febrifugi effectum

tam diu perseverasse cognovi. Læ-
tus hic nec non auspicatus exitus
sub convalescentiam vires adjecit
ac alacriter impulit ut eandem
medendi rationem experirer in no-
bili juvene qui consilio medici
rudis adhuc in hoc de quo agitur
casu , uno & altero die non modo
sanguinem bis detrahi sibi permi-
serat sed & vomitorium & cathar-
ticum & sudorificum , & vesicato-
rium adhiberi , quibus eo usque
fractæ erant vires , ut vix loqui at-
que in lecto se vertere posset. Ad
hæc pulsus lentus , & maximè de-
bilis atque non nunquam quies-
cens , urina pallida , lingua crus-
taceâ materiâ obducta , nulla ta-
men sitis aderat , hæc autem symp-
tomatum caterva non nisi duorum
dierum spatio invasit , quippe ubi
primum febris illumprehendit hæc
valde acuta , omnibusque aliis
symptomatis siti , calore , capitis

dolore stipata erat : affatim autem ut generosa ac mæra juscula liquoriret jussi interponendo nonnullas benigna tamen cardiaca quibus brevi discrimen evasit, & post hæc accommodatè suo morbo tractatus fuit, ex quo feliciter assurrexit. Assit in ipsa convalescentiâ subinde imviolentum lateris dolorem pleuriticum incidit, & cum ab urbe tunc temporis abessem, advocato in consilium medico, venæ cefuram bis passus & ad ptisanam tantum redactus fuerat hoc pacto licet indefinenter cruciatibus & sevitie doloris torqueretur, perstabat tamen maxime vitalis roboris immutatio, pulsus erat debilis, lentus & mollis qui in vera pleuritide durus semper & celer est, proinde dolorem unicè in sanguinis lentorem & spirituum deficientiam refundens (unde cordis ineptitudo ad eam vim exercendam qui san-

guinem in circulum agere possit, ita ut difficilis hujus per capillaria commeatus occasionem pleuritidi præbuerit) potius quam in nimis præcipitem sanguinis cursum, vel spasmo coangustata solida (quæ potius relaxata declinante ea febre esse debent) ad nutrientem victum illico me converti & vires exsuscitantia, prætermittendo interim usitatam curandi rationem quibus modis, brevi dolor remisit & 24. horarum spatio laborantem prorsus reliquit, qui subinde sine ulla recidiva convaluit, ambo hæc exempla plusquam satis arbitror demonstrare non omnes medentium fines unico pharmacorum usu obtinendos: verum si citam ægrotis dum adversac angustia maximè eos urgent, qui nostræ curæ se committunt, ferre velimus opem, interdum aliud ac à trito & consueto toto cœlo diversum iter no-

bis calcandum est ; ast nunquam
 sine ductore prævio videlicet de-
 monstratis ratiociniis indubitata
 experientiæ innixis : illud autem
 apud me certum ac stabile manebit,
 quidquid excordes nonnulli
 medici adversus hanc doctrinam
 quam planè non intelligunt , bla-
 terent , utilem non modo verum
 & necessariam esse optimo medico
 matheſim , etenim cui corporis
 humani fabrica apprimè cognita ,
 solidorum ac fluidorum naturam
 probe intellecta , functionum ani-
 malium & secretionum omnium
 mechanica ſcitè perſpecta , quæ
 incrementem vel diminutam ali-
 quam evacuationem ſequi de-
 beant , benè notata , motuum le-
 ges tandem ut mechanicæ & hy-
 droſtaticæ , mutationibus , quæ in
 corpore humano contingunt , ap-
 plicatæ , convenienter exploratæ
 fuerint . profecto ille potior ha-
 bendus

bendus ac in medicinâ factitandâ anteponeendus lubenter iis quos hæc præcepta latent, quemadmodum de pluribus magnæ notæ dici potest, qui defectu solidi ratiocinii fastuoso supercilio ac quâdam affectatâ gravitate distinctionem hanc retinent quorum tamen dictis non major adhibenda est fides in remediis ægro prescribendis (nullam enim de præscriptis rationem reddunt) quam circumforaneorum, vel mimorum qui populo obtrudere non desinunt, quot hominum millia ab omni morborum genere liberarint. Hæc autem quæ in præcedenti historiâ attuli exempla non sic accipi velim ut in omnibus febribus pleniorē victum commendare videar, quin credo tale alendi institutum, si uni beneficium est, decem aliis perniciosum fore, & ubi indicatur, ne in omni

278 TRACTATUS

morbi stadio promiscuè præscribatur cavendum est. Quò citiùs percurrit sua tempora eò tenuiori diætâ nutriendus & Hippocrates (§. 1. aphor. 16.) victum humidum fæbricitantibus omnibus conferre potissimùm vero pueris.

§. XIV.

Turpiter hallucinantur qui ventriculum semper liquida præ solidis alimentis conficere putant cum contrarium doceat quotidiana experientia, licet in genere hoc verum sit, in pluribus tamen morbis aliter se res habet, imò in eodem affectu liquida uni compentunt alteri solida, sed quando nam alterutra præscribenda sint, definire præterquam quod ipsius laborantis observatio circa cibatus qui ab ipso facilè digeruntur magni facienda est. Præceptum tamen

inspice sequens : ubicumque stomachi fibræ nimio opere laxæ , effetæ ac torpidæ , ejusque cavum exundanti viscosâ limosâque materie obrutum est tunc solida cibaria fluidis præstant : ast ubi eadem plus æquo tensæ , elasticæ ac vegetæ sunt & earum interni parietes mucosâ cænofo obliti , fluidus cibus firmo anteponendus , ad hæc pulsus , urina & præprimis salivalis humor non parum probabilem exhibent conjecturam cum salivæ hîc indolem ventriculus sequatur.

§. XV.

Etsi composita cibaria nimis in deliciis sint magisque explendæ ingluviei idonea , atque delicatulum depravatum vel exsurdatum illiciant appetitum (quamobrem aliquando permittenda) rarò ta-

men vel nunquam æquè tutò sumi possunt ac edulia quæ magis simplicia dum modo ea ventriculo gravia, & operosa non sint, multumque alibilis suggerant; quippe ob diversos quos obtinent cohæſionis gradus, quæ in ferulorum compositionem ingrediuntur, debent faciliùs vel difficiliùs digeri, vel quod eodem redit, alimentum expeditiùs vel ægriùs in partes tam exiguas dissolvi, quæ permeandis lacteis apta sint.

§. XVI.

Quod assumptionis alimentorum tempus attinet duo consideranda veniunt primum circà commestationum numerum intrà 24. horas, alterum circa condimenta varia.

§. XVII.

Aliquorum mos est semel ; quorumdam bis , nonnullorum ter spatio diurno cibum capere : verum quotenæ debeant esse mandendi dato eodem tempore vices præfiniunt ætas , famis vigor ; assumptorum copia singulis vicibus , qualitas , an facilis nempè vel difficilis sint digestionis ; juvenes siquidem & imbecilli qui minorem alimentorum modum singulis vicibus capere quique cibos faciles sumere consuerunt , iis sæpius manducandum est quam firmis , plenæ ætatis , voracioris appetitus , & qui quâlibet refectione nutrimenta abundanter ingerant quæ difficulter postea perficientur ; justus ergò cuilibet alimentorum modus esse debet , isque ad dispendia restauranda , quæ motu

282 TRACTATUS

diario musculorum peracta sunt ,
necessarius : hinc quibus languida
est famis , lenis exercitatio sufficit ,
vel frequens adhibenda refectio ;
cum si unica cibi sumptione non
reparentur quotidianæ jacturæ ,
mandendum bis & si hoc non suf-
fecerit ter. Signa autem quibus se
prodit nimia abstinencia sunt , fa-
me præteritâ , deliquium cum quâ-
dam circa cordis foveam molestiâ ,
languidus ac quasi spasmus deten-
tus pulsus , artuum debilitas , men-
tis inconstantia & si diutiùs perse-
veraverit inedia , emergent periculi
plena symptomata , lypothimiæ ,
vertigines , epileptici insultus &c.
quorum postremum accidisse cui-
dam nobili memini post diu mul-
tumque protractam inediam , men-
tis perturbatione stipatam post mi-
feros casus atque infortunia cum
enim ambo equitaremus quinta
post meridiem atque diem inani

ventre durâſſet , parcèque præcedenti die reſectus , in epilepticum inſultum ex equo incidit , quem nunquam antea ſenſerat nec unquam impoſterum niſi in ſimili caſu : illum in vicinam domum cum introduxerim cereviſiam calidè biberet coegi ſicque à ſontici morbi paroxyſmo eripui & auctor fui quædam cibaria caperet atque ſemel & iterato de huiusmodi cereviſia liguriret , quibus optimè recreatus , nullis aliis remediis adhibitis à morbo evaſit & proſectò nihil magis accomodatum longiori abſtinentiæ , ubi una cum animi intensâ ſollicitudine , omnia compagis ſolida inſigniter contracta , eorumque elater ſummoperè increvit , nihil inquam niſi univerſalis relaxatio , uti hoc generoſa cujuſlibet generis liquida primum in ſtomacho , mox in reliquo corpore præſtant , ita ut ipſe cereviſiæ

haustus aliorum cardiacorum defectu, insignis medicaminis vires supplere queat.

§. XVIII.

Quibusdam unica tantum in die commestatione non solum diariæ reparantur impensæ verum & incrementum moles corporis ad magnam extensionem quod in obesis observare licet, nec dubito quin iis rara refectio magis frugifera sit non solum ad præcavendum ulteriorem nutritum; sed etiam ob alias rationes:

§. XVIII.

Verum in universum utilius est unius diei spatio iterato vesci, eò convenienti intervallo, ut jam assumptorum digestio sit peracta, antequam alia assumantur. Quod hujus nodi solutionem attinet inf-

pice quod evenit post copiosum ingestum cibum, uti etiam post longam perpeſſam famem, ubi appetitus non modo non languet, ſed & intenſior evadit.

§. XX.

Famis ſenſatio, aliarum more machinam in ſtatu quodam tenſionis & contractionis collocat ut è converſo alimenti aſſumptio relaxationis: hæc autem uſque quaque oblectamento inter manducandum reſpondet, atque iſtud appetitui, ita ut jejunantibus donec multum fameſcant quemadmodum exindè nimiùm contracta tenſa ſunt ita à paſtu remollescunt flexibiliaque ſunt; ſecretiones omnes cohibentur ferè in priori caſu, augentur autem maximè in altero (propoſ. 17. de ſecretione) cum vaſa ubi præter conſuetudinem

esuriit homo nimis extensa & elastica sint, erunt eorundem vibrationes justo fortiores & quidquam de his continenter avolat sicque senectam maturat, relaxatione partium à cibo majori existente, magis & quoque restaurantur attritæ vires; cum libertas partibus nutrientibus insit, ut inter solidorum abrasorum interstitia se insinuare possint. Ast cum tempus in idoneum huic operi sit succo videlicet altili. Antecedentis refectionis absumpto & adhuc in ventriculo, præsentis pastus retento succo, recreatio ista vel laxatio, etsi magna, parvi erit usûs.

Illud autem verum est; impari conficiendis alimentis esse ventriculum, quando iis post hujus modi relaxationem gravatus, atque oppletus est; vis enim hujus visceris exiguæ cibariorum quantitati applicata insignior est, quam si in

ingentem eorundem molem exerceretur ; exinde major eduliorum copia minori difficiliùs digeritur , cum autem fibræ ob relaxationem debiles sint , ineptum fit adhuc mediocri digerendæ copiæ , quamobrem sanum ac tutum hominem à mensâ cum quodam appetitu surgere decet , itaque languidior coctio chilum viscidiorum producit ; hic lentius per duodenum trudetur , nec non per oscula lacteorum , jam suppositâ relaxatione patentiora. Hoc multiplici de nomine viscidius liquamen chilaceum sanguinis oceano affundetur , qui in genere majori elaboratione indiget ut fluidior ac magis idoneus alendo animali reddatur , quam quæ fieri possit in iis qui semel tantum cibum capiunt , major alimentorum vis , ubi in stomacho calefacta , tumet ac rarefcit , & eò potiori jure , quod debilia ac flaccida ventriculi fla-

menta , nequeant hanc reprimere ac superare; hinc exorietur flatulenta ventriculi distentio , accedente aliquali molestiâ. Hinc exhalans cuticularibus foraminibus cohibebitur liquor non secùs ac si ventriculus cibariis oppleretur (Sanctor. aphor. §. 3.) hinc majora vel minora orientur incommoda ad quæ ob consuetudinem , ne minimum advertamus; aliquos novi qui ab assumpto alimento nullam noxam apparentem percipiunt quod tamen eorum vitam contrahere poterit , etiamsi in præsentì nihil mali afferre videatur.

Accedit quod cum abundanter chili suppetiæ semel sanguinis massæ suggerantur & nonnisi rarò magnam in eo ciere debent mutationem atque viscera hematoprictica impendio distrahere quam cum illæ parcæ sint nec ità rarò sanguinì communicantur.

§. XXI.

Jam illud innuimus manducandi tempora ità disponi debere ut nequaquam ingeratur de novo antequam quod primo fuerat sumptum alimentum, digestum fuerit, eaque distantia à tempore pastûs ut coctio quam proximè antè somnum peragatur; mutatio enim alimentorum quæ in stomacho fit, horumque in naturam corporis assimilatio, functiones sunt adeò diversæ, ut simul existere nequeant; digestio contractione, nutritio relaxatione absolvitur; exindè alimenta conficiantur ante oportet quam fibræ relaxatæ ad alibiles partes recipiendas sint. Prætereà somnus esum immediatè consequens, ut viscidiores exindè elicit chylum, ità & hunc copiosorem in sanguinis lacum derivat per hiantia chiliveho-

rum foramina , quamobrem omnes illos producet effectus qui tenacitati sanguinis originem debent.

§. XXII.

Quod maximè opportunum manducandi tempus spectat illud debet esse circiter tertiam à somno excitationem & quartam vel quintam antè somnum horam ut clarum fiet conferenti plures Sanctorianos aphorismos videlicet § 7. §. 1. 20. 28. & 15. §. 4.

Ubi primùm quis à somno experrectus est cum corpus undique contractum habeat vel solida tensa si aliquid ex prægressis cibariis in stomacho remanserit , sive crudum adhuc sive insufficienter attenuatum in cubiculis sanguiferis sive impactum excretoriorum vasculorum orificiis augebit , nisi aliquo cibo vel potu intertubetur machina , celeri-

tatem sanguinis per vasa motusque fibrarum omnia vasa compaginantium, vibratiles acuet, ita ut & residuum digeratur, & in auras vaneſcat adhærens lentum & evacuetur quod glandularum oris affixum erat : atqui poſtquam hi ſcopi adimpleti ſunt, tunc maximè idoneum ad capiendâ iterum alimenta, tempus exiſtit quod in genere tribus aut quatuor horis circiter à ſomno matutino contingit : perſpiratio (copioſiſſima ſiquidem ſecundâ à ſomno horâ eſt ultimo aphoriſmo) nullo modo cibis diſturbanda : hinc alimentis utendum eſt, poſt tempus matutinum juxta noſtrum aſſertum etſi verum ſit, temperamentorum diverſitatem cum diverſâ vivendi ratione conjunctam, hoc reſpectu pati exceptionem.

Si cubitum, antè alimentorum digeſtionem eamus, perturbabitur opus amborum ventriculi oriſi-

ciorum ope relaxationis quæ per
omne corpus diffunditur in quiete,
regiaque patebit via omnibus illis
malis quæ §. ultimo indigitavimus.

Variari porro debent obsonio-
rum captandorum tempora pro iis
qui quâlibet nocte potare consuê-
runt in iis enim digeri alimenta
oportet, antequam bibant vel alias
parca sit cæna, faciliaque sumantur
edulia & inter hæc solida potiùs
quàm humida ob rationem pluriess
in hoc capite notatam.

CAPUT IX.

De Potulentis.

§. I.

A Qua, quæ maximam om-
nium potulentorum partem
constituit, quo purior, & particulis
vegetabilium, mineralium & terref-

trium magis libera, eò melior. Puritas autem manifestatur pelluciditate fluxilitate, insipiditate, & levitate, nullum enim est corpus quin aquæ immixtum hujus aliquam ex notis proprietatibus non alteret, & ut illa salutaris censenda, quæ exiguissima particularum extranearum copia donatur, ità nulla est quæ ab eorumdem consortio omninò immunis sit ut ex experimentis Woodvardi super vegetatione constat & ex hâc mixturâ provenit dispositio ad foetorem & corruptelam, cum stagnat, siquidem particulæ ipsi innatantes cum diversæ sint gravitatis quædam illarum subsident, dum cæteræ emergunt, ac motu suo se mutuò suffriant ac dividunt, ut hoc pacto nonnullæ specificè leviores aëre circumstante fiant, ac dum in sublime feruntur ingratè nares percellunt, quæ postquam in oceano aëreo erogatæ ac impen-

294 TRACTATUS.

facta fuerunt, quod materiae solidae remansit, proprium sibi locum occupavit, aqua fiet dulcis denuò, uti experimenta fidem faciunt. Aqua pluvialis omnium maximè particulis mineralibus expedita est; aut vegetabilibus non parùm referta, atque hinc est cur subito putredinem concipiat, aliter tutissima omnium censeretur posset, verum fontana, quamvis pluvia ponderosior habeatur, cum in putrefactionem minùs proclivis sit, certè aptior est communi usui modo saporem ferre possit, atque fons forti impetu saliat.

Coroll. 1^m. ex dictis sequitur quam perniciofa sit aquarum stagnatio, & quam sagax fuerit conditoris adorandi providentia in eo quod mediante lunæ & solis attractione adeò violentam maris agitationem bis in 24 horarum spatio, cieri voluerit ut observa-

re licet in æstûs reciprocatione ,
 atque procellæ etsi nautis incom-
 modæ sint , necessaria huic operi
 videntur quippè absque tempesta-
 tibus & maris refluxu oceanum
 brevi corrumpetur , pisces inte-
 rimeret , & hoc pacto ambien-
 tem aërem tantâ putridorum efflu-
 viorum copiâ inquinaret ut eis pau-
 cos dies animalia quoque terrestria
 interficerentur.

Coroll. 2.^m. infertur aquam nos-
 tram maximè aptam usui esse cum
 aliquantùm in loco frigido stetit ,
 mineralium partes fundum petunt
 vasis , & aqua limpidior ac magis
 splendens emergit.

Corol. 3.^m infertur aquam non de-
 bere ebullire antè usum ut quidam
 faciunt pro potu caffè aut the , etenim
 etsi ebullitione separari possint ab
 invicem extraneæ particulae , postea
 quam hæc per breve tempus stetit ,
 nihilominus evaporatione levissi-

marum ; & quod indè sequitur præstantissimarum aquæ partium, quod remanet pessimum est, atque eò usquè infervere potest donec saporem salis acquirat.

§. I I.

Adeò necessaria est nostræ conservationi ut sine ipsâ ne minimum quidem temporis vitam ducere valeamus, ex eâ omnes partes corporis fluidæ manant quæ ad humorum circuitum necessariae sunt eâ, omnia salia dissolvuntur, exindè nonnullæ in determinatis corporis partibus à sanguinis massâ secedent, alia in propriis emunctoriis, ut hinc exigantur extrudanturque ; eâ, præparantur alimenta, & hoc modo vehendis cibariis nec non remediis in stomachum, atque exindè in omnia corporis loca, omnesque meandros

dividendis, & ad sanitatem, & ad nutricatum infervit.

§. III.

Lac, cerevisia & vinum nihil aliud gerunt præter certam, ut ut variet proportio, falis sulphuris & terræ in pura putaque aquâ fluitantium: discrimen quod inter fluida fermentata & illa quæ nunquam fermentationem subiere: ponit diversa particularum terrestrium proportio. Subtilitas salinarum, & sulphurearum aquæ innatantium quatenus ex musto vel adhuc non fermentato racemorum uvæ succo, vel ex decocto malti ante fermentationem destillatione elici potest copiosum oleum, atque caput, ut aiunt mortuum in majori copiâ quàm post pe-ractam fermentationem: attamen ubi fermentationis interventu (quæ

298 TRACTATUS

tantum modo est motus liquoris
 intestinus, quo cohesio partium
 alteratur, atque ex quæ ponde-
 rosæ fundum vasis occupent, le-
 viores verò superficiem) sulphu-
 reæ & salinæ partes volatiles
 fiunt, & quæ ante fermentationem
 olei tantum & salis essentialis for-
 mam haberent, nunc illâ peractâ,
 sub specie spiritûs & salis volatilis
 se manifestant, exindè spiritus ni-
 hil est aliud nisi oleum & sal maxi-
 mè attenuatum vel hæc duo ma-
 ximè volatilia facta; punctura
 spirituum quæ lingua percipitur
 debetur salibus asperis in liberta-
 tem assertis ipsi applicatis quæ an-
 teà intricata, ac recondita in len-
 tis ac viscidis liquoris non fer-
 mentari partibus.

§. IV.

Ubicumque salia in fluidis cor-

poris humani exsuperant uti scabie, leprâ, scorbuto &c. liquores non fermentati (modò cautè sumantur) utiles sunt quemadmodum iis qui inflammatoriis morbis obnoxii sunt, ut pleuritidi, rheumatismo, vel similibus affectibus quandò aquæ interventu, relaxationem produci diximus hoc intellectum volumus de calidâ: vel si non est calida; de infusione alicujus remedii, vel cujuscumque rei, ut ejus vis laxans adaugeatur; ut sunt radix sarsæ parillæ, chinæ, liquiritiæ, athææ &c. possunt & quoque ipsi misceri, quæ prædictam vim diminuant ut the, caffè vel aliqua amara herba, amara enim quæcumque, stomachi fibris tonum fænerant, hinc merito stomachica audiunt.

§. V.

Caffè & the hodiè præprimis

conviviis matronarum inferviunt
 quarum palato oppido arrident,
 & maxima hujus sæculi magnatum
 pars sorbitione, fabagina & decoc-
 to the delectatur quam maximè.

Ast cum malis profectò epotan-
 tium rebus; aqua quibusdam no-
 cumento est nonnullis amaritudo
 fabulæ & theiæ: nemo enim laxi
 ac inertis habitûs tam copiosam
 aquæ quantitatem epotandam tole-
 rare valet nec tæsi ac firmi pluri-
 mùm acerbi ac amari, ità ut hujus-
 modi potatores peculiari tempera-
 mento vim & quantitatem prædic-
 tarum sorbitionum accommodare
 deberent.

Obesis humidis & phlegmaticis
 sorbitio prædicta multum onerata
 usui esse potest, utique jejuno sto-
 macho sine saccharo, lacte vel bu-
 tyro quia quò magis fibræ stimu-
 lantur, eò fortiùs in contractionem
 veniunt quamobrem eluitur viscuss
 alimentorum

alimentorum confectioni destina-
tum ab omnium noxiorum ac su-
perfluorum humorum phlegmati-
corum colluvie & tunc massam san-
guinis ingressus ejus velocem red-
dit motum, humiditatem expel-
lit, efficit quoque generalem per
omnia corporis loca stimulum &
ita fibris torpentibus ac motu feri-
antibus elaterii exercitium & rigo-
rem tribuit, è contra vero siccis ma-
cilentis, cholericis ab hac sorbitio-
ne omnino abstinendum esset, vel
eadem usurpare cum butyro saccha-
ro, & pleno ventriculo etenim hi
sunt qui eamdem sine noxâ uti ne-
queunt cum decoctum nimio opere
saturatum vel affatim sumunt par-
tes exsiccat, serum sanguinis dis-
sipat, cordis palpitationem pro-
ducit, manuum tremores, debilem
pulsum, ac ita dixerim nebulosum,
pectoris angustiam, syncopem,
asthma, & vapores, somnum præ-

pedit, acnigritiam dentibus affert.
 quæ omnia refundenda sunt in acci-
 tivum pungens ac calidum quæ
 scatet oleum: hoc media per re-
 tortam distillatione duplo pen-
 majori copia fugeritur à caffè quam
 à tritico vel faba equina exindit.
 neutrum horum fabulæ comparari
 potest, hæc enim suppeditat un-
 cias duas & $\frac{1}{2}$ & scrupulos duos ole-
 è contra eadem tritici quantitas fæ-
 lummodo unicam unam & drach-
 mas sex: faba autem equina unc-
 am unam drachmas tres & gran-
 decem.

§. VI.

Quæ de potu caffè commenta-
 ti sumus ea omnia ferè ad the di-
 torqueri possunt, nisi quod hæc
 herba minus stomachi fibras ve-
 licet quam potus ex fabulis tostis
 ac tritis; ast hæc duo in usum ac-

vocanda ubicumque lignorum decocta & aqua calcis indicantur, the utilis est calculosis (Waldefchimidi de calculo renum inter monita medica: Sydenham. oper. univers. pag. 526. Baglivius oper. medica pag. 90.

Sanctorius (aphor. 67. §. 3.) tradit aquæ potum insensibilem transpirationem interpellare, adjuvare autem sensibilem; hinc non modo elicere datur ubinam frugifera sit aquæ potatio, verum & percipere quosdam immoderati potus aquæ in humoribus corpus abluentibus, effectus, cum increscens perspiratio inscrescentem sanguinis velocitatem arguat, vel dilationem porrorum cutis (ex 20. & 21. prop. de secret. animal.) necessum est eandem diminutam ab imminuto & languente sanguinis motu produci, vel à contractis foraminibus cutis; ita ut

aquæ potus febrientibus congruat : veteres majores aquæ haustus prout cuique ægrotanti libitum esset , concedebant , quemadmodum & in chronicis affectibus in quibus effervescent humores , optimi usûs est uti arthritide fluxionibus , dolore capitis , uteri strangulatu , deliquio , acre oculorum oblusâ , atrabile , biliosis , hæmorrhagia & oris putredine quemadmodum Floyer (Traité de l'asthme p. 176.) tradit : idem auctor testatur sæpiùs asthmaticos insultus hujus potûs ope cohibuisse , & sane nihil est quod flatus minus moveat quàm aqua cum exiguiorem aërei fluidi copiam intra poros recondat quàm quilibet alii liquores vulgò usitati , qui cujuscvis generis fuerint flatus gignunt & exindè est cur tam infensi sint imbecilibus stomacho , quia ubi primum in hoc viscere incaluit , contentus aër se

expandit , atque per orificium ventriculi superius eructando truditur si fibræ ad motum ineptæ extiterint , prætereà hujusmodi flatum cientes liquores uberrimum aërem ad sanguinis lacum devehunt ; hic rarefiet igitur atque tamdiu se extendit donec omnes illas ægritudines , quas una aqua antevertere potest , producat.

§. VII.

Communis aqua fontana sola sufficeret absolvendis curationibus quas mineralis præstare consuevit, si aquæ medicatæ eadem quantitate impunè sumi possent , cum mutationes quæ exindè in sanguine visuntur unicè petendæ sint ab aquæ do-ribus , quales sunt sanguinem diluere , salia stimulantia dissolvere , motum sanguinis infringere , refrigerare , patentia cutis pororum

foramina constringere , ventriculū mundare , & urinæ vias detergere &c. Verum dum majora aquæ pocula hauriuntur , relaxantur , torpent ventriculi fibræ ac deperditur appetitus & digestio pravè exercetur , nisi adstringens aquarum metallicarum vis præsto sit , quâ eadem , inter vulgatas principatum tenent : porro falia quibus scatent , iisdem ulterius in corpus ducendis inserviunt , ac ut obstructa referare queant magis quam communis aqua faciunt , & cum falia ista vitriolica sint in omnibus quæ chalybeatæ vocantur præstant in roboranda ac firmanda sanguinis textura quæ nimium laxa in hypocondriacis ac scorbuticis est.

Majorem præ aliis fructum præstat in restaurando appetitu balnei aqua calida , cum ob ferotinas commessiones ille deperditus fue-

rit, quod emolumentum ex actuali calore derivandum qui eam commendabilem illorum stomacho facit qui calidis liquoribus utuntur; caloris hujus ope colicam sanat, & si hæc per id quod est commune omnibus aquis curetur. Abstemii seu qui solum fontem epotant nunquam dolore colico tentantur: non nullos novi curatos aquæ usu post tentata, ast in cassum omnia remedia, & cum liquorum fermentatorum potatione dolores redirent, aquæ salutari usu abigebantur.

§. VIII.

Liquida fermentata quæ generaliter in hoc regno usurpantur sunt zythum, cerevisia, vinum atque communis est omnibus liquidis post motum fermentativum perpeßum caloris excitatio intoxicatio, urinæ protrusio, famis sedatio, sitis productio & stupor.

ris, perspirationis promotio, utique si abundanti copia epotata fuerint, leviora, acerbo uvarum succo necdum fermentato, verbo musto sunt, minus autem eo glutinosa & plus olei salis fixi destillata effundunt: cum hæc ambo in cæteris redundantia in spiritus convertantur: perinde fermentata liquida magnam salis volatilis copiam intra se gerunt, qua grata stomacho evadunt, producendo lenem & jucundam in villis sensu exquisito præditis titillationem, nec non relaxationem per universum animalis corpus, & hoc pacto prægrandes sanguini præterlabenti removentur obices, cum omnium arteriarum capacitas augeatur, major cylinder sanguineus interlabitur tubulos absque laterum interiorum contactu, ex quo proficitur resistentia & cum arteriæ conicæ sint, celer ac velox ejus-

dem liquidi cursus erit , ac proinde increfcet perfpirantis liquidi , & urinæ quantitas (20. propof. de fecretione) quemadmodum etiam calor & fitis ut fupra ubi de acutis morbis fermo agebatur , demonftratum eft. Fames cum nifi ingrata ac molefta , non fit fenfatio , hujus generis haufu , qui aliam gratam ac jucundam fufcitât , reprimetur : atque omnia potum confectaria ex univerfali relaxatione elucefcunt.

Ad hæc fal volatilis oleofus quem fermentata liquida continent , fanguinis maffam ingreffus illam divellit , diffolvit , rarefacit , & expandit ; exinde præcitata effecta longè faciliùs producuntur , & ubi rarefactio modum prætergreffa fuerit , diducta arteriofa vafa fluidi nervalis greflum ad cor intercipiunt , ut impar fanguini ex fuis thalamis fufficienti momen-

310 TRACTATUS

to ad corporis usque extrema trundendo fiat ; quamobrem qui nimium aquæ potui indulgent iis lurida , ac pallida facies est. Ex his inferre licet nedum frugiferam , sed & necessariam esse sanguinis missionem ubi arteriæ pulsus vix percipitur , & extrema frigent. In hoc enim ebrietatis statu , sanguis ubertim in cerebrum partesque cordi magis vicinas irruit ac fibrarum elasticitatem enervat potissimum si temulentia sæpius iteretur atque eò debilitatis deventum sit ut arteriæ vi sua sanguinem in orbem agere nequaquam valeant & hinc est quod vinosi stupidi sint. Atque apoplexiæ , nervorum resolutioni vertigini , hebetudini memoriæ , manuum tremori , inappetentiæ , dyspepsiæ , hepatis , lienis atque mezenterii tumoribus pateant ex quibus icterus & hydropa confur-

gunt communia acribus potatoribus fata. Jam verò cum prædictæ ægritudines nimix potationis sint effectus eâque quam retulimus ratione producantur ; cognoscere facile quis poterit quodnam genus spirituosus liquidus ebibi affluentèr valeat ; debet hoc esse æque clarum ac limpidum ac molitationem linguæ acceptam & gratam excitare quo melius per urinæ ac perspirationis vias foras amandetur ; tale ut non multum laxet , & proinde lenis illa styptica quâ ditatur vinum rubrum , vis ; idem ingenere ut largiùs auriatur quam quilibet alius generosus liquor , in causa est magna quantitas tartari quod continet , impedit quominus ventriculi textum relaxet , atque liquida tantam in rarefactionem concitat quantam cæteri animalis spirituum pleni liquores.

Etiamfi fervidorum liquorum

abusus adeò valetudini officiat, ubi tamen moderatè hauriuntur: magni sunt emolumenti, & profecto veluti totidem auxilia benefica esse videntur, ad quæ in pluribus casibus homo confugere possit, puta ubi duris violentisque corporis exercitationibus ex hausti vel dolore oppressi spiritus fuerunt, nec non morbo, animique quâdam perturbatione: quantum confortat cyathus generosi liquidi! Pungentem doloris sensum obtundit, sopitos exhilarat spiritus, melancholiam arcet, famem explet in victualium inopia; ex illo efflorescit utilitas in omnibus illis morbis in quibus debilis observatur pulsus, ubi in sanguine superfluum redundat serum, ubi transpiratio suppressa est, & ubi violenti animi affectus notantur. Exindè hypocondriacis, hydropicis, catarrho per retentum perspirabile detentis immoderatus

ac copiosissimus liquorum hujusmodi haustus necessarius est, quin in febribus ubi à languente pulsu, virium exsolutione, frigore cutisque siccitate indicantur, non sine fructu adhibentur, & si illud fateri oporteat per paucos esse casus, ubi frigidum regimen, ut aiunt, non sit præstantius.

Vinum omnium liquorum fermentatorum in genere, convenientissimum est stomacho tam ratione limpiditatis quam tartari quod continet cum illud vel ejus præparata pharmacum constituunt stomacho magis accommodatum quocumque alio in omnibus morbis. Hinc est ut vina gallica præsertim quæ ex *burgundiâ* ac *campaniâ* ad nos afferuntur præponenda iis quæ ex *luzitaniâ* & hypnoticis & quibuscumque aliis dulcibus nisi sub titulo cardiacorum parcè promi debeant. Hæc quæ memoravimus postremo

314 TRACTATUS

loco, etsi linguæ nervos fortiter succutiant, stomachum gravent, & cerebrum præ cæteris interturbent, nihilominus igne destillatorio tractata parum spirituum fundunt & cum imperfectè fermentata fuerint, oleosæ eorum partes in spiritus non convertuntur, quod destillatio demonstrat; quippè plus olei hæc vina, quàm cætara dant, & hoc oleum dimidiatim fermentatum efficit ut illa difficiliùs digerantur, magis altilia atque ficcis & aridis magis apta evadant, quibus talis constitutio nempè sicca à naturâ contingit, iis satiùs est cerevisiâ quàm vino uti, cum sit hoc illa levior, placidior & magis narcotica, & proindè magis nutriens, magisque emolliendis constrictis nimium febris idonea. Ast in universum quò potus noster malti ad vini genium & naturam propius accedit eò præstantior ha-

bendus; hinc confici debet ex aquâ
 limpidâ & saponem ferente, &
 optimè lupulatus esse quo fervari
 posset donec sequaciores ac magis
 viscidæ partes in vasis vadum deci-
 derint, saporis acris sine aciditate,
 & pellucidus, atque in poculo
 velut scintillas emittere. Verum
 quò exiguiores sunt bullulæ, eò
 meliores quod autem lupulus sive
 humulus ad hujusmodi potationis
 compositionem sit necessarius ex
 eo evincitur quod sine illo epote-
 tur cerevisia non lupulata, recens,
 pendula & ad dimidium fermenta-
 tata vel aliter antiquam, & vetus-
 tam quæ duo simul inimica sunt
 sanis. Imò lupulatus potus utiliter
 ac tuto adhibetur calculosis ut plu-
 ries expertus sum, quamvis vulgo
 aliter sentiatur; humulus jucundè
 ac gratè amarescit, exindè antido-
 tum & contrà calculum & contrà
 arthritidem est juxtà Sydenham.

316 TRACTATUS

(oper. univers. pag. 418. 419. & 426.) & Waldefschimidii (de calcul. renum , & arthritide intermonita medica) observata & in calculo laborantibus non optatum offerat solatium , paucissimi sunt casus ubi potus ille condemnari potest : licet fatendum sit id generis potationes , non secus ac omnes alias amarorem præ se ferentes minimè competere quibus cholerica ac calida corporis constitutio inest.

TRACTATUS DE HEPATE

JEcur vocari potest conglomerata glandula ut potè quod ex quamplurimis minoribus glandulis invicem unitis cogmentatum sit quæ se in communem excretorium ductum exonerant ; situm est in supremâ imi ventris parte immediatè

sub diaphragmate in dextro hypocondrio quod penè totum occupat undè ad usque cartilaginem ensiformem protenditur juxtà latus ventriculi dextrum versus sinistrum hypocondrium, & cum in suis extremitatibus angustum ac tenuè redditur, ansa arrepta ampliùs ventriculi distensionì spatium patet.

Gibbosa atque convexa hepatis facies costis contigua jacet vel meliùs spuriiis sive brevibus à latere dextro quemadmodùm etiam magnæ septi transversæ portioni.

Concava autem atque sinuosa ad sinistram, pylorum contegit & superiorem ventriculi partem & omenti. Verum ob fel interpositum, quod quoad magnam partem jecur inter & ventriculum conditur propè janitorem, uti post hæc describetur; à dextris ad ejusdem lateris renem usque porrigitur, atque color intestini partem.

celat sicque integrum duodeni tractum non nullaque jejunii & omenti loca.

Hepar, in fanis, in recto situ deorsum a costis spuris pendet ferre usque ad umbilicum: in morbo-
sis, ejus confinia ultra extenduntur & infra umbilicum, & ad sinistram partem ad costas breves.

Cum tumores præfati à causis progignantur quæ æqualiter per totam jecoris substantiam diffunduntur nec non ejus moles increvit secundum omnes dimensiones, examine facilè distingui, ab aliis, adjacentes partes infestantibus, possunt, cum tumores isti hepatis figuram semper præseferant.

Jecur peculiaribus pariter subjectum est tumoribus in concavâ simul & in convexâ parte, ubi à causa non adeò universali hi orti fuere quæ totum visceris textum occupavit qui in summa hepatis parte sedem figunt.

tumores, non æquè feliciter deteguntur, ac cum in superiori parte. Ast hoc conjectari licebit ex infueta plenitudine & duritie dextri hypochondrii (ut pote hic collocatur hepar) simul cum externo cutis colore qui infirmum hepar gerentibus familiaris est.

Tumores convexæ super ficiei hepatis magis vicini & superficiales sunt, faciliusque deprehenduntur manuum contrectatione leni tamen ac suspensa oportet, uti in explorando tumore juxta spuriarum costarum longitudinem, interneas, cartilaginem xyphoideam, & tumorem.

Mox descripti tumores non nunquam ad usque spurias alterius lateris costas porriguntur quod incautis imponit, dum eos pro lienis tumoribus accipiunt: ast à modo descriptis satis discriminantur: cum hepatis magis superficia-

rii, & super ventriculum, quam splenis, modo non portentosi sint, in quo casu hos insolita manifestabit moles, mediante prægrandi distensione & pondere sinistri lateris & demum quia splenis tumores multo profundius reconduntur quam qui jecur tenent.

Ligamenta quibus viscus hoc debito in loco ac situ detinetur præcipua tria recensentur.

Primum alligat hepar septo atque *ligamentum suspensorium* vocant, quod mediande hoc potissimum jecur sustentetur, quod aliter ratione suæ magnæ molis & ponderis in recto animalis situ ad inferiora decideret, & præter consuetudinem deprimeretur.

Prædictum ligamentum nedum extimæ leviter seu exiliter hepatis membranæ connectitur; verum etiã illius substantiam ingreditur, & ibi pariter cum vena *umbilicali* conti-

gua ligatur , quæ alterum ligamen constituit , quod etsi interdum pervium sit tamen à nativitate usum tantùm ligamenti obtinet , sicut antea *vena* obtinebat officium duos habet terminos primum ad hepatis fissuram ut antea observavimus , alterum ad umbilicum , nexus autem hic impedit ne nimium diaphragma premat.

Tertium ab auctoribus descriptum viscus hoc *cartilagini mucronatae* annectit & ex forti , latâ , tenui membrana laxè suspendente conflatum : oritur (juxta Spigellium) ex membrana hepar circum ambiente & juxta *glyssonium* ex ejusdem duplicatura profecto videtur esse non nisi peritonei propago , vel ad minimum ex ipso oriri , non secus ac ex plevra mediastinum in medio pectoris cavo , ex prædictâ cartilagine cursum dirigit ad hepar , & illud *ossi pectorali* annec-

tit ac ulteriùs secundum *succincturam* excurrens hanc jecori quâ gibbosam ac eminentem partem respicit, adstringit & alligat, juxta totam hujus longitudinem à sinistris ad dexterarum partes.

Hujus modi connexionem, in qua quoque peritoneum continetur, tutatur hepar in suo situ ne sinistrorsum vel dextrorsum, vel retrorsum fluctuet.

Porrò præter enumeratos hepatis nexus multæ aliæ connexiones, quibus impropriè *ligamentorum* nomen inditum est dantur, quæque hepati collocando vel collocato firmando deserviunt tales sunt vena cava, ut & vena *portarum*, quarum interventu jecur connecti dicitur mesenterio, intestinis, ventriculo, omento, lieni, & pancreati: *porus biliaris* pariter viscus hocce duodeno conjungit, & interdum jejunio, hepatica arteria

celiacæ ligat & nervi ad ipsum pertinentes intercostali adjungunt nervo.

Ista varia vincula, quemadmodum major eorum pars conservando hepatis in loco debito deservit sic & quoque illud à periculo, quod aliter depositionem hujus visceris sequeretur, præcavent atque securum reddunt.

At quomodolibet ligetur ac vinciatur fieri nequit quin aliquando situm mutet, evidens siquidem est qua proportionem corporis situs mutatur, alterari & illum hepatis; quod demonstrabitur, si notentur atramento tumores: hos etenim pristinam amittere sedem, quoties non idem perseverat corporis situs, videbis.

Necessariam esse arctam hepatis connexionem cum septo transverso, ut illud hujus sequatur motum, clara est illatio, itaque in inspiratione

ubi diaphragma contrahitur, ut thoracis claustra eleuet, simul cum hepate ulterius in abdomine deprimitur, quemadmodum in expiratione, ubi diaphragma vicissim relaxatur, altiusque in mediam cavitatem truditur, hepar huic obsecundat motui.

Hæc moniti ad instar sint medicis hepatis statum explorantibus ut nempe hepar in actu respirationis examine perlustrent, tunc enim cum hepar penitus se in abdomen demittit, facilius occurrere digitis tangentibus potest & distinctius contrectari.

Ut in statu naturali hepar semper diaphragmatis motibus famulatur, ita in præter naturali nonnunquam hunc motum impedit, & propriis, quibus conflictatur, ægritudinibus non secus ac aliarum partium contiguarum languoribus.

Sicubi in majorem, ob morbos, molem excreverit, spiritûs difficilem tractionem, affert noxam sanè frequenter observandam in rachiticis in quibus hepar mole ampliatum est.

Hepar interdum costis spuriiis accrescit, quem morbum, reor, nostrates appellant *heparis augmentum* quod necessariâ consecutione gravem respirationi creat obicem.

Ubi à nimio esculentorum & potulentorum & vini præsertim onere turget ventriculus, septum transversum ab Hepate sursum premitur, sicque inhibetur ejus motus, colon intestinum distensum similiter & intestina tenuia, summatim cujusvis partis hepatis incumbentis extensio nimia, premere septum potest, atque illud in thoracem adigere, itaque illud spatio absolvendæ respirationi necessario orbare.

Quod molem hepatis spectat, hæc multum in variis corporibus differt, foetus jecur, adulti majus ratione ad corpus servatâ, ast observante *glissonio* hepar minus tenet spatium in eunuchis quam in gallis, in aquatilibus quam terrestribus animantibus; sed cum hæc veritate facti omninò adhuc confirmarii exoptulent, & quod præmemoratus auctor in suis observationibus falli potuerit hanc observationem prætergredi duxi, illud solum modò in genere dicturus, quò segnior fit ordinata liquidorum circulatio, quando etiam nulla labes vel morbus iisdem in orbem actis inhæserit eò partis volumen augefcit, id est si liquidum non eò velocitatis gradu à partibus reducuntur quo ad illam appulere, quia tunc oritur vasorum ingurgitatio, & hinc viscus hoc, cujus substantiæ vasa maximam partem

constituunt , auctum sumet , & in majorem solito molem assurget , sine ullâ exindè subsequente molestiâ , veluti manibus à frigore tumentibus evenit , quod exemplum eò magis ad rem facere arbitror , quod humorum transitus hîc in manibus nimium retardetur , tumorque sine ullâ subsequente noxâ emergat.

Ulterius id adnotandum venit hepar magnoperè liquidis vitalibus irrigari , sanguis quippè omnis ad ventriculum, fistulam intestinalem, splenem , pancreatem , & meenterium per truncum arteriæ celiacæ delatus & per superiorem & inferiorem mezentericam , ut exindè ad cor amandari queat , recipi à venæ *portæ* radicibus oportet ut ad hepatis substantiam ferarur, quique idcirco vel tantisper in suo fluxu hærens , aptus est ad hepatis corpus ultra consuetos à naturâ limi-

328 TRACTATUS

tes intendendum, illudque ità dixerim *supernutriendum*.

Hùc pertinent cujuscumque speciei tumores qui nec minimum molestiæ huic visceri afferunt, neque illud muneribus à naturâ sancitis obeundis ineptum reddant.

Sic hepar inflammationibus patet, ejusdem naturæ ac eæ quæ cæteras corporis partes infestant, quæque easdem agnoscunt causas & definitione hâc comprehendi possunt, effusio vel extravasatio sanguinis per hepatis regionem à crassitie vel visciditate sanguinis prognata quâ impar cyclico cursui per hepatis capillares tubos absolvendo fit, vel aliter ex sanguinis intemperantia in vasis ubi ratione vehementis quæ concipit, motûs & rarefactionis tubulos coercentes dirumpit, vel alio modo ex contusione ob causas externas violenter agentes in omnibus prædictis casibus difficilis fit

per vasa sanguinis lapsus ; cumque antrorsum progrediendi nequaquam potis sit , merito extremas partium hepar sustentantium dilatationes , & quæ ex his citò sequuntur pede mala minari facilè poterit videlicet per sensum gravedinis in dextro hypocondrio , & acrem irrequietumque dolorem , febrem cum anhelitu , quæ omnia argumentum apodicticum sunt inflammati visceris.

Dolor hic vel ab ægrotantibus ipsis distingui potest si se ab uno in aliud vertant latus qui prout ipsum parenchima , vel membranam cingentem occupârit , magis vel minus punget ; cum illud membranâ minùs sentiat non tam distensionibus hujusmodi afficitur.

Ubi viscus phlegmone tactum , membranæ dolor juxtâ membranam organa spiritalia cingentem excurrens confusionem aliquam pa-

rere potest in distinguenda pleuritide ab hoc morbo.

In hisce rerum circumstantiis indicationes à dolore sumendæ sunt, qui *cæteris paribus* non omninò acerbus est quemadmodum in pleuritide, nec lateris dolorem unquam gravitas ac dextri hypocondrii tumescencia comitatur, in quo situm est hepar; ad hæc peculiaris faciei color qui ut plurimum in omnibus hepatis languoribus ictericus est, morbi genium & indolem in apricum deducit, atque originem subsequantium malorum patefacit, affectus hic nunquam periculo vacat; uti quisquis sibi suaderi potest; ast observantibus practicis periculosior ubi convexam hepatis partem quam ubi concavam male habuerit. Idcirco quod sphaerica ejus superficies arctè diaphragmati unita sit, ideòque inflammationem susceptam illi com

municat, cujus noxa usum quem in spirando præstat, attendenti patebit.

Ubicumque iis quos versamur tumores infederint, utilissimum est si fieri potest eos elidere, vel discutere; ast si molienti negotium faceffiant, omnis movendus lapis ut in suppuratum abeant, & tunc exutâ antiquâ denominatione, aliam sibi adsciscit morbus, nempe *abscessus* qui proficiscitur ex conversione extravasatorum humorum qui antea circumagerentur in tabum, & ubi materia hæc purulenta acrimoniâ suâ partes corrofit & per easdem sibi cuderit viam nomen *ulceris* accipit.

Color & consistentia purulenti liquaminis ex ulcere promanantis hæc ominantur, si nimirum album probèque, digestum sit, non omnem curationis adimit spem, verum si rubore infectum, si fœculentum

& foetidum fuerit , in angusto spes est.

Enarratis jam calidis & inflammatoriis jecoris tumoribus & quæ inde oriuntur mala , reliquum est ut de frigidis dicamus quippè situm vel in ipso hepatis textu , vel in vasis membranisque ad id spectantibus , vel in utrisque vel in universis simul , habent.

Sub primo respectu examini se subjiciunt schirri hepatis , in quibus totum hepatis parenchyma seroso aqueo latice turget, quem spongiæ more fuisse videtur ; vasa horumque tunicæ tono fractæ, & cum sanguine effæto nutriantur, repleanturque , elasticitatem requisitam perdunt , quod cum contigerit, tempore hydrops emerget: malum hoc primum hepar infestare consuevit ibique sedem suam figere , sed haud rarò cæteras, quæ sanguinis tamem interventu laudato vis-

ceri labem conceptam inurunt.

Prisci cum id sanguificationis officinam esse existimarent, credebant quoque sedem & causam præcipuam hydropis hîc residere, confirmabantur ulteriùs in hujusmodi conjecturâ suis fulciti observatis, cum omnes hepatis morbos, si ad certum gradum auferentur, in hydropem terminari deprehenderent, quodque sanè magnam in hoc morbo partem habere probat, ast non uti sanguificationis auctor verum ut pars plurimis ne dicam numero infinitis sanguiferis irrigata vasis accipiendum est per quæ sanguis circulum absolvit, & in quibus coërcita liquida obstructionem efficere valent quibus jugiter ac abundanter à corde pulsus atque hepate impari illis antrorsum urgendis vel saltem eodem quo hîc delati fuere nisi, vel ex labæ peculiari vel ex illâ sanguinis; partes

sanguinis serosæ , in hoc distentionis momento vel diductionis impetu per solidorum porositates transfudant , quæ cum alteratæ omnino sint , sanguinem pariter inquinabunt & hydropem excitabunt.

Ut hoc magis percipiatur , conducere potest sequens periculum. videlicet injiciatur ligatura venæ cavæ inter septum transversum & cor dum sanguis à corde per aortam expulsus ad cor regredi nequeat , venæ ampliantur , & aqueo-serosæ sanguinis partes per textum vasorum perspirant , & bihorio ingens extra vasa effusi feri in imi ventris cavo conspicitur copia.

Quod , opilatio vel infarctus hepatis vel cujuslibet partis , idem potis sit procedente morbo efficere quod per vinculum injectum effectum videmus , satis reor intelligitur.

Singulares hepati ut antea ob-

servatum est, incumbunt tumores id est uti horum causæ in æqualiter per totam hepatis regionem propagantur quique pariter originem trahunt ex nonnullis obstructionibus vel in sanguivehis tubulis vel in biliosis vel in utrisque.

Non intelligi integram liquidorum circulantium stasim hic volumus per obstructionem nequiret enim hoc pacto cum vitâ consistere sed ea humorum apritudo ut liberè vasa prætergredi, ac promptè nequeant quæque tam lentè incedunt, ut *stagnare* videantur & hoc præprimis in quibusdam vasis admitti velim dum cætera sat libera manent, ut circulantibus liquidis transitum præbeant.

Calculi ulcera uti skirrofi tumores ut ex hâc indispositione procedunt, sic quoque horum obturamentorum causam aggravant.

Ast frequentius occurrens causa

336 TRACTATUS

est crassa atque gelatinosa sanguinis crasis, qui cum nimium crassam lympham secum ferat, vel salinas coagulantes moleculas aciditatem illam imminuit, quam habere necessum est, ut par sit minimis jejunioris tubulis pererrandis itaque obstaculis vel obstructionibus hanc partem infestantibus procreandis.

Bilis pariter cum eo pacto soluto spissior sit, sæpè obstructiones parit & cum ferri nequeat per exillissima vasa biliaria ibi hæret & cum à sanguine transeunte exsugatur per *vena cava* radices, vel lymphatica vasa icterus producit, qui juxta colorem quo corporis habitum inficit denominatur *icterus flavus* vel *niger*.

Porum biliferum vel *meatum choledocum* posse à glutinosa ac nimis spissa bile præcludi non adeò conceptu difficile habetur, ac ubi id ipsum tumores calculi & cætera præstitierint

titerint quæ singula præmendo obstruere valent cujus veritatem autopsia detexit.

Ast nullum scrupulum movet tenuia, exilia, capillaria, biliosa vascula, inepta ad traducendam bilem huc delatam fieri, illudque probatur methodo quâ utimur ad debellandos hosce affectus quæ tota est in attenuantibus remediis quæ ut vias occlusas referant, ita suâ viliquidius fluidum reddunt, juxta praxeos observationem, quâ constat subsidia quæ secretionem liquorum sollicitant, cola etiam muneri exsequendo aptiora reddere.

At multorum animis ea infedit opinio ut crederent obstructionem solam insufficientem esse huic effectui generando, illumque sine obstructione evenire posse; ut primum assertum probent eorum exemplum producant qui obstructionibus nequaquam carent, ut chlorosi vel

febre amatoria laborantium & atrabile qui icterum comitem nequaquam adsciscunt sibi ideòque eliciunt inde obstructiones tantum non sufficere, verum evincendum superesset hepar immune esse ab obstructionibus in prædictis casibus ubi non nisi in mente obstructions existunt.

Ut alterum confirmet *silvius* exemplum ex anatomicis petit ictericorum in quibus nulla obstructionis nota reperta est & ulterius hoc demonstrare putat, viperarum morfu quem aliqui autumant arquaturn parere morbum, cum tamen in tam brevi temporis spatio nequaquam ab occludente materia ubi obstrui possent.

Hic affectus refundi potest in energiam seu vim dissolventem & fermentantem liquidorum quæ vipera mordens sanguini in orbem acto impertitur & majori activitate

quâ pollent sanguinem dissolvendi fundendi hunc biliosum magis, faciunt, cum bilis à sanguinis globulis fortè non nisi penes majorem minoremve partium dissolutionem ac attritionem differre videatur.

Animi affectus id ipsum producent, universam pueri utim, quo tempore solanum baccifernum hortense manducaret, flavedine tinctam vidi, quam adeò cito pede secuta curatio, ut nequaquam concipere potuerim colorem illum ab obstructione fuisse ortum ex iis merito excitamur ad hujusmodi affectus in calidum & frigidum partitionem. Alter calidæ causæ alter frigidæ originem suam debet, similiter in eum qui magnoperè attenuatæ bili & viscidæ quæ obstructionis genitrix est.

Ex hâc distinctione aliquid emolumenti in curatione morbi regii habetur qui cum à diversis causis

340 TRACTATUS

procedat, diversam & quoque medelam exposcit, aliâs medici unicâ eâdemque viâ quoscumque affectos sanantes, ad metam nequaquam collimarent.

Jecur ut ex glandulis conflatum propria sedes tumorum schirroso- rum habetur qui hic perindè ac in cæteris corporis partibus duri sunt, ad tactum renitentes & uti exquisiti sunt, dolore vacant; quamvis in incunabulis, antequam adoleverint, dolore stipentur, ex materiâ, quæ insensibilis in principio processu verò temporis in hepate congeratur, profluunt, quamvis aliquando soboles inflammationis sint, ubi evaporatis tenuissimis humorum vitalium partibus, quod remanet originem skirro præbet, & hoc contingere in iisdem hepatis acinibus glandulosis potest. Summè huic rei adaptatum exemplum habemus apud Glissonium, quod acce-

pit ex *rege morter*, qui dum dissectioni cujusdam incumberet, qui dum viveret per plures annos scrofulis conflictatus fuisset, reperit hepar undiquè obstruentibus obturaculis obsitum, in quo glandulæ ad eam molem assurrexerant ut pisi magnitudinem æquarent, aliæ fabe, quæ scalpello dissectæ nihil nisi liquidum continerent, ast quam figuram, quam substantiam adamussin glandulas compositas quales ipse describit ex substantiâ lutei coloris astantium oculis objicerent.

His glandulis, eò perducta moles visceris fuit ut duplo vel triplo solito major videretur, ac duplo vel triplo naturali pondus haberet.

Nonnunquam extravasata lymphæ peculiarem sibi construit capsulam ex se ipsâ, in quâ, veluti in cystide jacet, quæque secundum diversum, quem obtinet intus

342 TRACTATUS

coërcitus humor, cohæſionis gradum, diverſis nominibus inſignitur; itaque ſi materia æmulatur quàm maximè mellis conſiſtentiam *meliceris*, ſi magis coacta in duram ſubſtantiam fuerit, *atheroma* & ſi adhuc durior, conſiſtentiam æqualem ſebi habuerit *ſteatoma* vocabitur.

Horum exempla, rarò quamvis accidunt, tamen unicum referam ex prælaudato Gliffonio ex ſuo elaborato tractatu de hepate excerptum, quodque ſat notatu dignum eſt, nempe *atheromatis* in convexa hepatis parte inventi juxta ſeptum tranſverſum, in quo loco viſcus hoc à venâ cavâ perforatur, figuræ erat rotundæ, & ferè magnitudine pugnum æquabat, atque cum ab hepate liberatum eſſet pendere viſum eſt uncias 5. drachmas 6. & gr. 30. latera non ſecùs ac cutis ſpiſſa ac craſſa erant, dupliciſque

generis materiam recondebant utramque gelatinosam valdè & nullo modo fluidam, alteram lucidam transparentem ad instar gelatinæ, alteram similem spisso cremori, hepar mole plus æquo ampliatum erat, quemadmodum & venæ mezenterii, tractûs intestinalis ventriculi & potissimum splenis, quæ omnia proficiscuntur ex pressione, quam efficiebat prædictus tumor super capillaria sanguiveha hepatis quæ eò usque coarctata erant, ut facilem per ea transeuntis liquidi commeatum sufflaminarint: non solum *vena portarum* in hepate ramos affecerat, sed & omnia vasa quæ huic famulantur quæ per sanguinis hærentiam multum infarcta ac dilatata erant. Simile quid, uti antea observatum, in quavis parte eveniet, ad quam sanguis magno impetu appellit, vel in eâ quantitate quâ per venas exinde ad

cor reduci nequeat.

Obnoxium quoque est hepar tumoribus aquosis, qui *hydatides* appellantur quæque vesiculæ sunt sero pellucido distentæ, ac nihil aliud esse videntur quam ipsameti hepatis membrana ab ejusdem parenchymate interventu aquei humoris divulsa, juxta liquoris contenti copiam, modo mole pugnum exæquat modo hoc minores existunt, interdum pauciores, aliquando plures & uterque tumor in homine non secus ac in reliquis animantibus observatur, si fortè fortunâ ruptionem patiantur aquam in cavum abdominis gement, unde hydrops procul dubio orietur. Non nunquam in ovibus tabe peremptis deprehendere peculiaris ac singularis naturæ in hepatis substantiâ tumores nobis datum est quorum media pars cava non nisi aquam haberet, atque in eâ ve-

mes pariter reperiiebantur.

Unicum est & non nisi continuum constituit corpus in homine etsi in quadrupedibus plurimisque aliis volatilibus in lobos divisum sit ejus rotunda superficies æqualis omnino & glabra visitur at concava sima & scabrosa & præter hæc magnam fissuram aditum venæ umbilicali præbentem in se insculptam gerit, quodque meo videri, illam inutilem disceptationem concitarit de humani hepatis divisione in lobos (vid. D. Drakc anatom. pag. 100. edit. ultim.)

Hos tres, ut aiunt, sinus proficisci existimo à corporibus incumbentibus, horum maximus à sinistris est, ubi jecur dextro lateri stomachi, pyloro & portioni duodeni insidet, alter in infima quasi parte jecoris, & integram pene *fellis vesiculam* amplectitur, tertius in parte supremâ existit, ubi venæ

descendentis cavæ truncus visceris substantiam perfodit & hæc sunt quæ attentionem merentur, cava & quamvis alia non desint à pressione partium circumjacentium factæ, nihilominus ulteriorem notitiam non promerentur ut pote quæ minimi sunt usus.

Mihi videor tutò affirmaturus in omnibus animalibus hepar adesse & hoc unicum utut obijci possint mox referendæ historiæ portentosæ, quarum autem veracitati non est multum fidendum prima habetur apud zacutum lusitanum (de prax. medic. admirab. sect. 38.) de quadam femina quæ suppressis catameniis in *tympanitidem* inciderat quæque tandem è vivis cessit, cujus corpus post mortem cultro anatomico examinatum nullum hepatis vestigium proderet, sed loco ejus inquit, ingens carnis massa conf-

piciebatur , vel spurea & informis sustantia ingentis magnitudinis protensa ex regione hepatis infra umbilicum quam inde avulsam , æqua lance expensam 36.^{lb} ponderare invenit.

Altera est quam refert Skencius (in suo 3. opere observat. 2. sect.) de mercatore antuerpiæ cujus corpus post obitum perlustrando hepar & lienem frustra quæsit , verum intestina , ut tradit , substantiam quamdam carnosam , magisque quam caro muscularis in genere, solidam præse ferebant, & firmitudine ac robore textûs à cordis substantia non recedebant fere ; vena cava oriebatur ex intestinis eodem plane modo quo fœvit vena *portarum* in reliquis corporibus ; illum antequam è statione vivorum discederet obnoxium inflammationibus & abcessibus intestinorum fuisse memora-

tur, & non multò ante mortem hydrope affectum.

Tertiam nudè *Skenkius* ex gemmadepeculatus est de homine quodam qui geminum gereret jecur; verum cum nullum verbum de duabus vesiculis felleis duobus excretoriis ductibus, duabus venis cavis & duabus *venis portarum* concludere faserit auctorẽ illum (si immoderatum amorem describendarum id generis historiarum qui rapere ipsum potuisset excipias) decipi potuisse in eo quod jecur inusitatè discissum perlustraverit cum hoc æque contigerit ac lusus naturæ in duobus jecoribus fabrefaciendis : nec minus eum fefellit quod nullum ibi examinanti se obtulerit hepar præcisè quia non consuetum situm & configurationem tantummodo offenderit.

Quomodocumque sit illud non negandum est quasdam adesse prodigiosas

digiosas sanè historias , exinde tamen nunquam conficient hominem sine hepate vel hujus vicem gente aliquo organo vivere posse.

Purpureus , quem exhibet hepar , color , huic peculiaris nequaquam est , sed à sanguine totum quàm latè patet , textum abluente , unicè dependet ; jecur enim injectionibus adeò mundari potest ut omnino album evadat.

Membranâ cingitur tenui , cujus originem à peritoneo non nulli repetere sueverunt , ast meo videri ipsum peritoneum forte ex præcedenti membrana originatur , cum ambæ hujusmodi membranæ in fætu simul & eodem tempore productæ sint , ac ulterius quando hepar findi contigerit ejusque membranam rixim pati provida natura curationis ergo talis vulneris utrinque pelliculam superstratam molitur , cujus materia ex vas-

culis ipsiusmet visceris & nullo pacto ad peritoneum spectantibus affertur.

Tunica descripta separari quidem à reliquo hepate potest sed non ita facile quin aliqua parenchymatis pars ipsam sequatur.

Ufus ejus est, hepar factum tectumque contra circum ambientium partium injurias tueri, illudque integrum conservare & quasi in unum adunare, friabilis & fragilis admodum namque est hepatis structura quod autem hoc necessarium fuerit, demonstratur, tum ex eo quod liber expeditusque per hepatis textum concedatur integro sanguini per venam *portarum* à splene, pancreate, omento, mezenterio, intestinali fistula, stomacho advecto, tum ex eo quod hinc bilis secretio peragi debeat, hinc est quod hæc præpediatur unaque cum sanguine hærare debeat quo-

tiescumque hujus visceris continuitas soluta, videlicet hiatus fortuito factus fuerit.

Solutionis autem hujusmodi causæ sunt, vel vulnera contusiones vel corrosiones ab acribus durisque humoribus factæ, obstructions de quibus supra, ac inflammationes, quarum mentio ex practicis eruitur, & non sæpè in capitis vulneribus hujusque succussionibus repertum est in hoc viscere apostema memoratum (à Job : a Meekreen in observ. medic. chyr. observ. 1.)

Procedunt (juxta illos) a flatibus spissis in tunica hepatis extima contentis, illudque attollentibus & inflantibus, ac distendendo membranam dolorem producunt de quo conqueritur æger.

Has ægritudines præsentis esse nos docet, extans in dextro hypochondrio tumor, acerbissimo dolore

intermittente tamen aliquando magis interdum minus urgente stipatus, neque secum illud pondus, quod alii hepatis tumores semper, conjunctum habet siquidem manui prementi promptè locum tacite, nullo edito strepitu, cedit, neque ullum fluctuationis sensum, quo posset suspicionem latentis ibidem abscessus injicere, profert.

Non inficiabo tamen ibidem ventum colligi posse ut tunicam extimam ab substante divellat hepate, quemadmodum serofus latex hoc facere potis est, qui aliquando detegitur: nihilominus verisimile habetur circumstantium partium extuberantes dilatationes frequentiores esse quam putatur, quæ ob viciniam fucum faciunt, sicque pro hepatis morbis non raro, perperam tamen accipiuntur, neque unquam me in dissectionibus cadaverum hepar adeò disten-

tum ac infarctum reperiisse memini, nec non concessum est in similibus casibus aspectus cutisque colorem ita à naturali degenerem uti in cæteris ejusdem visceris inflammationibus.

Vulnera, contusiones, rosiones hepatis interminari periculum possunt. Uti quando vulnere cæduntur vasa majus portendunt periculum quam cum parenchima: ut plurimum autem hæc duo simul vulnerantur. Adfunt tamen exempla curationem horum vulnorum confirmantia quamvis si verum fateri velimus, vix ex centum vulneratis unus periculum evadit, & ad hunc finem *Hildanus* hominem tradit sanatum postquam, vulnere accepto, hepatis sui partem amisit, graviæque symptomata pertulit. Possem & alia exempla in apicum proferre, ast hoc sufficere reor ad demonstrandum he-

patis vulnera non semper lethalia existere , ut antea innuimus.

Hepatis figura apprimè congruit muneri , cui natura id destinavit , nec non exercitio functionum cui incumbere debet quemadmodum eam multum adaptatam vicinis partibus comperies , alias si hujusmodi convenientia atque artificium abesset inter contentas continentisque partes necessitate quadam partes se mutuo molestarent , & naturam huic incommodo artificio prædicto consuluisse evincitur ex diversâ hujus visceris in variis animalibus configuratione , quâ abdominis cavum sequitur & melius ad quanlibet loci mutationem disponitur , prout diversis motibus , animalis situs in pluribus actionibus mutatur. Ex molli fragilique substantia conflatum consurgit hepar si vasa & membranas exceperis , facilèque ablui,

scalpi, vel abradi ab intertextis vasculis potest (modus quo hoc fit videatur in anat. Couper.) veteres non nisi concretum sanguinem esse putabant. Ast tempus ac industria nos meliora docuerunt quibus planum est hoc *parenchima* ut aiunt nihil præter glandulas admittere capillaribus tubulorum finibus annexas vel in quas exonerantur adferentia, & undè exportantia proficiscuntur vasa ad recipiendas plures particulas quæ ob similitudinem suorum pororum maximè huic fini conveniunt: vasis cujuscumque generis superbit præfatum viscus, & quidem affluenter uti venis, arteriis, nervis, lymphaticis vasis, (vide Nuck. adenograph. curios. vid. Drack. anat. hepat.) & peculiaribus excretoriis ductibus quibus non nulli fel adjungunt: hocque considerant veluti meatus cysti-

ci expansionem aliquam.

Duplicis generis venæ idem irrigant, quæ duplex munus obendum habent; vena siquidem *portarum* adferendi hùc sanguinem, quâ prærogativa nulla alia corporis pars donatur, & hoc pacto finem atque usum arteriæ assequitur; ubi primum viscus ingressa est, altera vestitur tunica quæ quibusdam *portæ vagina*, aliis *capsula communis* audit, & quia ibidem porus biliaris includitur, idcirco densa & musculosa observatur, *venamque portarum omnesque* hujus furculos ubique comitatur, sicque arteriæ *personam* si fas sit ita loqui, gerit, postquam se in viscus ad pollicis medietatem insinuavit, tanquam *sinum* hic efformat moxque se in quinque magnos dirimit ramos qui se se per totam quâ latè patet hepatis provinciam diffundunt.

Ita vas hoc in eo loco ubi extremitates duas profert se in innumerabiles ne dicam infinitos dispescitur ramos; superior horum juxtà datam descriptionem per hepar incurfat. Inferior similes radices habet per universa imi ventris exta partitas splenem, ventriculum, intestina, horum fimbriam, vel mezenterium, ex quibus sanguinem acceptum ad truncum adsporat ex quo ulteriùs ad superiores venæ cavæ ramos transmittendus est cui pariter exiguissimæ sunt radices per universum jecur dispersæ quæque hic capillaribus *portæ* respondent, uti venæ arteriis in reliquo corpore: hujusmodi quam plurimæ ramificationes in tres vel interdum plures notabiles truncos coeunt, qui pariter antequam hepati valedicant communem alveum efformant qui mox ab egressu per diaphragma

discurrit , ascendentiſque cavæ nomen trunci mutuatur.

Venæ *portarum* ramuli per ſinuofam jecoris partem diſſeminati atque ſupernè & internè uti illæ venæ cavæ obliqua via ad inferiora incedentes ſæpiùs ſe mutuò deduſſant ; aſt ſi hujusmodi vaſcula ita intorta ac convoluta à ſubſtrato jecore ſeparaveris atque parenchyma abraſeris quo melius latiores alvei in conſpectum veniant facilè poteris ramum ab altero diſtinguere aërem inſufflando per truncum : tunc enim temporis rami tantum ad truncum in quem adactus fuerat aër , inflabuntur , intactis & quieſcentibus cæteris. Verum id generis ramuſculos facile eſt demonſtrare ceræ injectu in capaciores è quibus oriuntur , truncos , quæ variis diverſiſque coloribus partes inficiens , claram horum exhibet viſionem , cujus

figuram vide apud Couper. in anat. corpor. human.

Atque hic non omittendus quidam transitus qui in foetu & non in adultis est ; *canalis* nimirum venosus ex venæ *portæ* sinu discedens magnam sanguinis partem gestans ad *umbilicalem* rectâ plenoque gurgite in *cavam* suprâ hepar quique à partu magnam partem clauditur.

Ramificationes præfatæ tandem in minima ac tenuissima vascula definunt ut nec nudo oculo nec eidem optimo mycroscope armato pateant. Hinc pro subreptitiis habeantur , exindeque prægrandis oborta disceptatio circâ modum quo sanguis per jecoris substantiam circulatur.

Asserunt quidam vasa hæc unita inter se anastomosi , & quod *vena cava* videlicet furculi hujus *portæ* aliis continuæ sint putantque

hanc structuram æque rationabiliter supponi debere ac quæ ab anatomia defumitur in yeroscopii auxilio in pluribus casibus atque obicientibus; si hæc vasa sanguinea ita connubium inirent, impossibilis foret bilis à sanguine separatio, satisfieri posse arbitror si concipiamus radices biliarium ductuum originem trahere à lateribus vasorum capillarium hujus generis venarum.

Itaque cum hepar totum vasculosum ponant glandulæ ejusdem accipiendæ sunt veluti totidem innumerabilium exiguorum vasculorum glomeres uvarum adinstar quæ vasa hic assimilantur totidem glomeraminibus parvis simul unitis sedulo atque diligenter, quæque in tota sua longitudine canales habeant vasculorum *biliarium* apertorum indefinitam prope modum seriem in parvis eorum
osculis

osculis ut biliosum humorem & sanguine circumactō sequestratum exsugant, qui & ob similitudinem partium, & configurationem pororum non ineptus huic operi est eodem planè modo quo, chilaceum pultamen à lacteis in intestinis accipitur.

Verum etsi supponatur convolutiones tantum prædictas tubulorum sanguiferorum glandulas efficere, ipsamque hepatis texturam conflare quodque in longo vasorum tractu sufficiens supersit locus ad emittenda vascula bilifera, affixa lateribus eorundem juxta longitudinem, ut bilem à sanguine suscipiant; remanet nihil osseciùs semper difficultas explicanda, videlicet sapor quem exhibet jecur, quippè ab omnibus, quibus irrigatur humoribus, lotum ac mundatum diversum saporē ab illo cujuslibet corporis

glandulæ redolet, quod videtur meo sensu diversitatem substantiæ arguere, atque varii generis cola diversi etiam esse textûs, quia si glandulæ ex vasis solummodo componerentur videlicet venis, arteriis, nervis unà cum suis ductibus excretoriis: hæc cum in quâcumque corporis parte eundem saporem gustandum præbeant, glandulæ à succis indigenis liberatæ deberent eodem modo sapere; cuius contrarium tamen demonstratur, sicque concludendum glandulas ad hepar pertinentes diversam à vasis obtinere naturam, quæ se ipsa peculiari sapore se prodere sueverunt.

Et hinc in eam opinionem me trahi sentio, ut credam glandulosa, de quibus sermo est, corpora, quæ peculiarem hancce jecoris substantiam constituunt, appensa esse finibus ramorum à vena *portarum*

proficiscentium , ut dictum est antea &c. quæ glandulæ (juxtà solertiss. Malpigh.) superficies sex cubi adinstar habent , & ut tradit ille conspicuiore in pisce & in imperfectis , ut aiunt , animalibus quam in homine.

Glandulæ hæ veluti uvæ à botris sic à vasculis sanguiferis pendent ac veluti totidem lobulos efformant exiguos , quos omnes propria membrana investit , amicitque : medium ut credo inter adsportantia , & reducentia obtinent vasa , quodque harum glandularum ope vasa deheventia , in reducentibus refundant liquida , qui autem hoc peragitur non est hic loci discutere.

Etsi vena portarum sanguinem ad hepar ferendo munus arteriæ suppleat, nihilominus tamen inest ipsi alia peculiaris arteria à *celiaca* oriunda *hepatica* vocata in homine insignis & diametro *pори bi-*

liaris proportionē respondet: secus autem in quadrupedibus, probabiliter idcirco quia venæ cavæ horizontalis in quadrupedibus situs arteriæ auxilio ad trudendum anteriùs sanguinem nequaquam eget: è converso in homine ascendens cavæ truncus, dum rectè stat ille, perpendicularis existens ab arteriâ communicato impetu, opus habet: Vid. anat. Drake.

Nervis non destituitur jecur a superiori imi ventris plexu oriundis, qui Willisio *hepaticus* dicitur, tenuesque propagines ad intercostalem dextri lateris mittit truncum: ex hoc plexu magnus fibrarum nervearum fasciculus emanat ad hepar tendens & reticulariter arteriam undique cingit, ut nempe (non nullorum sententia) plus justò rapidum ac velocem sanguinis motum tantisper cohibeat.

Nervea vascula, fluido, quod

gerunt, suppetias hepati ferunt, quod etsi suâ miscelâ secretionem bilis non promoveat, saltem necessarium elasticitatis gradum ac roboris membranis, tubulisque largitur, quæ sic in certo tensionis gradu detenta paria obeundis muneribus fiunt; secus autem si hujusmodi auxiliis orbarentur feriarentur quemadmodum & nihil nutrimenti reciperent.

Exsuperat ingenti lymphaticorum ductuum prole satis detegendorum in quam plurimis inspectis corporibus etsi prædicta proportio in diversis variaverit.

Malpighius volens hepar ex glandulis conglomeratis componi quæ unicum tantum excretioni dicatum ductum haberent, putavit vasa lympham ducentia nequaquam ex ipsâ hepatis substantiâ fore bolescere, sed ex illis conspicuis glandulis tantum globatis inve-

366 TRACTATUS

niendis in visceris cavo sub capsulâ, & ubi *porus biliaris* & *portæ* ingrediuntur jecur, à quibus locis, ait ille, tramitem ad mezenterium dirigunt, ut indè contentum humorem in receptaculum chili effundant.

At contrarium, ut arbitror, potius apparere debet, istos nempe lymphaticos ductus radicari in universo jecoris corpore, cum nulla corporis pars iisdem destituta sit, patet non denegandos huic visceri esse ut hæc melius percipi queant examinanda methodus quam natura sequitur in nutrimenti per corpus distributione etenim huc vergere videtur sanguinis in orbem lapsus quo partes nutrientes per universa corporis loca diffundantur.

Serosus latex magnam partem circulantis liquidi constituit altissimumque molecularnm sanguinis

vehiculum est, nec non sat sanguinem diluit, ut facile adpfortari ad partes respectivas valeat, quæ, sumpto à parte, quod ad vitæ usus necessarium sit, in massam sanguinis regurgitant.

Utique lympa vel serosa sanguinis pars (quod obiter dictum sit) magni est usûs, atque juxtâ glandularum corporis in quibus sæcernitur diversitatem varia.

Humor jam ope glandularum oris, ventriculi, intestinorum, pancreatis sequestratus è reliquâ massâ macerandis, digerendis, dissolvendisque cibariis incumbit, & ex iis gelatinosam ferè & nutritiam partem extrahit, quæ in sero tanquam vehiculo advecta, in lactea fertur ut exindè in sanguinem, & in omnes corporis recessus, & quod indè sequitur hepar migret quæ, absoluto in omnibus hisce partibus nutritionis munere, ita

depauperata in sanguinis massam redit atque ab omnibus corporis partibus perquædam vasa *lymphatica* nuncupata recipitur ad novam hic subeundam alterationem.

His tanquam certis concessis, tutò concludi potest, nullam in corpore adesse partem, cui præfati non insint ductus, & proindè jecur per totam suam substantiam instructum iisdem esse debere: ast non videtur necessarium ad hoc, ad glandulas conglobatas tantum confugere, uti prælaudatus auctor videtur sentire, quia id generis vasa quæ ab artubus ad sanguinem lympham reducunt, nullam à vicinis glandulis originem habere videntur; & facilè, ut puto, concipitur, quâ fit ut partes lymphatici liquidi tenuiores à cæteris crassioribus scrobiculis partium alendarum impactis segregatæ, per radices lymphæ ductuum absor-

beantur , qui deindè in ampliores coëunt alveos , ex iis truncos efformant , qui se in hepatis superficie manifestant.

Fateor extrema hujus generis ductuum capillamenta non esse autopsiâ hætenùs probata quemadmodum venarum & arteriarum ; at si conferantur clari hi lymphatici ductus cum vasis sanguiferis ejusdem magnitudinis , examini-que mentis subjiciatur ; numerus eorundem simul inveniendorum , antèquam datæ magnitudinis extruant truncum , facilè noscere poterit quisque sufficientem adesse exiguißimorum tubulorum lymphaticorum copiam , ut totam hepaticam substantiam cooperiant , vel potiùs eorundem numerum adeò magnum , ut paria sint constituendis canalibus præditæ magnitudinis.

Vesicula fellis est cavitas mem-

branacea pyriformis in concavâ jecoris parte à dextris sita subter crassio rem ejusdem partem ubi fossa insculpta adest ad vesiculam recipiendam destinata , parsque extrâ jecur prominet , ventriculi dextro lateri & colon incubit , quæ sæpè flavo colore inficit. Dividitur in fundum & collum seu cervicem. Hæc angustior pars est lateraliter corrugata ad impediendum nimis præcipitem bilis descensum.

Fundum amplius, majus, bilem que continet, & in genere ejusdem tingitur colore. Moles hujus vesicæ rarò eadem in diversis animantibus observatur. Fundum à bile intus detenta inflatum quatenus figuram & molem , pereleganter parvum gallinæ ovum repræsentat quod contractum & coarctatum in angustius collum , continuum *meatum cysticum* efficit , cujus figura in variis differt plurimum , in quibus-

dam longior & strictior, in aliis brevior & latior Hepati adhæret & per vasa & membranas videlicet per communem tunicam & per processum capsulæ involventem porum biliarium & *portam*.

Præter has, nonnulli volunt tres adhuc adesse tunicas *cystidem felleam* componentes primam seu anteriorem quam vascularem vocant, secundam muscularem duplici fibrarum ordine instructam, tertiam nervosam appellant eodem planè modo ac tunica ventriculi, ast quidquid sit quod hos auctores in errorem inducere potuerit, planum esse arbitror hanc texturam non talem esse qualem describunt ocularii demonstratione etenim mycroscopii ope perpenſa coagmentata ex duplici tergore videtur, interjectâ quadam spongiosa substantiâ: assimilantur autem hæ tunicæ duobus parietibus medium tenentem inter

eas substantiam tegentibus , quæque ex innumerâ sanguiferorum per longitudinem cystidis decurrentibus prole conflatur ; ac si essent inter duas *lamellatas tunicas* quemadmodum occasionem habui hæc perpendendi per mycroscopeum in quâdam *fellis cystide* quam antea oris spiritu inflaveram.

Vasa hæc procul dubio in glandulas desinunt , quas secretioni mucici cujusdam natura decrevit : ut leniatur bilis acrimonia , vel interior hujus sacculi membrana ab eâdem transeunte tueatur.

Sic explicatâ *vesicæ hujus* structurâ , nullum dubium subest , quin passivè , ut aiunt , se gerat in evacuandâ bile compressa à vicinis partibus.

Venis , arteriis , nervis , & lymphæ ductibus gaudet , & biliosos sibi attinentes habet tubulos , venæ se in portam exonerant , duæ sunt ,

&

& hinc *cystica gemella* vocatæ : arteriæ & nervi ab hepatis vasis fo-
bolescunt.

Ut venæ exeunt, ita arteriæ & nervi ingrediuntur *cystidem* quâ *cervicem* respicit exindè discurren-
tes versus finem magis ac magis
adinftar ramorum arboris dividun-
tur, perque totam *vesiculæ* circum-
ferentiam propagantur.

Lymphæ ductus juxtâ incurfant
ex fundo ejusdem ad *cervicem*,
ubi in truncum abeunt.

Biliofa vasa duplicis sunt gene-
ris videlicet alia advehentia, &
alia reducentia. Vascula primi ge-
neris ex jecore ortum habent, quo-
rum non nulla fortè semitam ad
vesicam dirigunt, ex quibusdam
respectivis glandulis, dum cætera
uti demonstravimus, antea in *hepa-
ticum ductum* hiant.

Glyssonius jam pridem prodidit
notabilem biliferum canalem quod

cystidem penetraret ad ejus collum ubi rugosa est : truncus hic etsi adeò exiguus , ait , ut vix 100. partem ductus biliarii æquet ; nihilominus suos exiguissimos furculos , per jecoris parenchyma distributos habet videturque habere *venæ portæ* ramum focium , quemadmodum *porus biliaris* qui ramus tamen difficilè distinguitur , qui tamen ad *felleam cystidem* tendit.

Ulteriùs addit difficiliorem esse inventu hujus ductûs biliferi insertionem , quemadmodum ureterum in vesica urinaria , verùm supponi posse esse partem hujus spongiosæ protuberantiæ quæ visui se offert propè *meatum cysticum valvula* officium gerens , & retrogredientem bilem impediens.

Doctissimus hic auctor fatetur ulterius se hujusmodi vasa detexis-

se ; verùm existimat fuisse naturæ
lusum.

Adfunt & quoque in hepate
quam plurimi tubuli propè cysti-
dis collum , atque in *meatum cysti-*
cum contentum liquidum effunden-
tes.

Hoc planè observari in bovina
fellea *cystide* ligando *meatum cysti-*
cum ubi poro biliario connectitur
adeò arctè & strictè, ut nec spiritus
pateret aditus ; quippè aëre reple-
to ductu hepatico, cernes *vesiculam*
fellis eodem spiritu turgidam : &
ulteriùs si cultro admoto *cystidem*
linà cum meatu suo ad vinculum
injectum findas, insufflando depre-
hendes aërem per plura oscula spi-
rantem & in *cystide* & in ductu *cysti-*
co, quodque patefacit uti antea vi-
sum est , commercium inter *duc-*
tum hepaticum & ductus *cystidis*.

Qui ductus adeò exiles sunt ut
nequaquam potuerim eos injicere,

376 TRACTATUS

nec unquam impletos viderim cerâ vel alia quapiam re ut nobis se proderent. Verùm existimo ex præcedenti experimento eorum existentiam esse planè demonstratam quosque habere poterit quisque ad recipiendam bilem suis exiguissimis radicibus paratos ut *porus biliaris* respectu cystidis bilem adsportando hùc efficit, ubi reponenda ad animalis æconomix usus juxta naturæ institutum.

His pro munere, denominatio hepatico-ductum indita est, adsunt & hic quoque bilem ex hepate & vesica fellea deferentes tubuli, & *hepatici ductus* nominantur, adest & quoque meatus cysticus, & ductus communis choledocus.

Hepaticus ductus ab hepate ramosus prodiens, quo relicto, in itinere alteri ductui adjungitur qui *meatus cysticus* audit, bilem ex felle ferens duos pollices infrà (eam-

dem distantiam ab hepate servat ductus hepaticus) vesicam, alteri unitur, ubi & ob munus quod præstant, & respectu hepatis & cystidis aliam denominationem accipiunt nempè *ductus communis* vel *communis choledoci* qui est tertius de quo egimus ac ulterius iter ad duodenum tenet vel jejunium ubi oblique in alterutrum ex his inferitur infra janitorem 4 vel 5 digitos circiter in eodem loco ubi se ipsum aperit pancreaticus ductus: flexuosa hujus modi insertionem, & media spongiosâ protuberantiâ sui ostioli, vicem ut videtur, gerentis sphincteris regurgitare bilis ad hepar præpeditur.

Hepaticus ductus & vena *porta* unâ ruunt per totam hepatis substantiam & unica communi circumvestiantur membranâ ampliores ex illis emergentes canales, non secus ac minores, non nisi uni-

cum constituere videntur canalem ;
 ast examine discernendi , siquidem
biliarii ductus omnes breviores in
 suis propaginibus cernuntur quam
portæ, insuper flavo tinguntur à bi-
 le contenta colore , aspicique pos-
 sunt porum biliarium inflando ,
 & adhuc magis conspicui procul
 dubio ceræ injectu , uti antea vi-
 dimus.

Non rarò reperiuntur lapilli
 in cystide leviores & spongiosio-
 res quam qui est *vesica urinaria*
 prodeunt aquæ innatant & inter-
 dum in cystidis parte arctiori seu
 collo subsistunt , *hepaticum ductum*
 hic apertum obturando & hoc
 pacto bilem per cervicem fluen-
 tem coërcent & incurabilem pro-
 ducunt icterum , in hoc casu non
 nunquam observatum est cysti-
 dem liquore à bile crnino dis-
 crepante repletam , quemque jure
 merito putamus à glandulis *vesi-*

cula fellea secretum de quibus locuti sumus.

Etxarato fusiùs hepate , nec non vasis ad idem pertinentibus proximè discutienda se offert functio ejusdem , quæ evidenter in bilis secretionem à sanguine videtur esse posita. Mechanismus hic dignus censendus est , qui eventiletur. Ut id explicarent , putârunt aliqui secretionem hanc fermento perfici , dum aliis solâ mechanicâ , omne oblegantes fermentum , sed simpliciter impulsu progressu , & intestino sanguinis motu , opus hoc secretorium statuere placuit , in quo glandulæ jecoris duplici vasorum ordine adîportantium videlicet & reducentium instructæ , cola æmulareatur , quæ unicè biliosis moleculis iuxta pororum figuram , & earundem molecularum conformationem per ipsas transeuntium præberent aditum.

Quibus magis arridet illud , glandulas tantum passivè se habere , easque aliquid fermenti retinere ope cujus eò usquè circulantia liquida inficiuntur , ut magis prona ad relinquendas bilis partes præ cæteris evaserint , ad hoc dicendum moventur ex eo quod firmam stabilemque unionem animadvertant inter sanguinis venæ *portarum* & bilis moleculas quæ non est simplex contactus , nec ità facilè separantur , ut contendunt quemadmodum corpora quæ imbecilli debili que nexu junguntur.

Hoc probate moliuntur ex sanguine *portarum* , qui nec minimum bilis , gustatus , profert , quæque à sanguine separata , si ejusdem majori copiæ misceatur , vel paucæ hujus guttæ notabilem amarorem toti massæ conciliant : hoc ut arguit levem unionem inter hæc liquida , ità & quoque

eamdem firmam cum reliquis *venæ portarum* humoribus demonstrat , ubi bilis sic præsens est ac si deperdita esset.

Id confirmant urgendo : sanguinem lentius tranare per hepar quam per reliquas corporis partes cum non acceleretur directo rapido motu & pleno. Arteriosi sanguinis ut in renibus & aliis organis secreto-riis , undè magis obnoxium est hoc viscus obstructionibus à quibus vulgò tunc oritur *icterus* : arteriæ enim hic pauciores venis afferentibus , & hujus modi circulatio consilio ac providentiâ naturæ facta est ; ut nempè sat temporis haberet fermentum ad operandum , nexumque hunc arctum dissolvendum. Verum utut plausibilis videatur hæc opinio , & hujusmodi fermentationes majores alterationes in sanguine efficiant atque exilissima glandularum vascula sint loca convenientia

382 TRACTATUS

ad ejusmodi fermenti actionem , nihilominus semper difficile erit explicare , undè hoc fermentum jecori proveniat , vel enim in ipso conficitur , vel aliundè confectum ei suggeritur & quod postremum spectat percipere nequeo adesse hujusmodi ductus deferentes cum nec ullo modo detegi potuerint id generis vasa *fermenti fera* ad hepar tendentia.

Nec magis arridet jecur officinam esse hujus fermenti : ut omit- tam enim quo modo illud efficere- tur , clarum aliundè est nullum hìc adesse peculiarem humorem huic operi aptum nec ulla organa alicu- jus similis liquidi separationi (si bilem excipias de cujus secretionem quæstio agitur) dicata possint detegi. Insuper glandulosæ hepa- tis substantiæ sapor qui non omni- nò ingratus est , si illud probè bile & excretoriis ductibus mundatum

fit, nihil bilis manifestat.

Præterea qui legibus mechanicæ secretionem hanc dilucidare nituntur, quique assistentiam fermenti non necessarij supponunt, non coguntur adstruere improbabilia, imò e contra hujus visceris mechanica ad hanc explicationem amplectendam vires addere videtur: adest hîc *vena portarum* in minima capillamentata se dividens; adest substantia quædam adinstar parenchymatis, vel textura hepatis fibriformis: adsunt oscula exportantium ductuum hiantium in glandulas diversis poris instructas, ut liquoris proportionatas particulas recipiant: adest hic circulatorius sanguinis motus & intestinus cum ulteriori vi motivâ ab imi ventris compressione communicata in aëris inspiratione de quâ antea actum est, ut diversi succi in propria foramina trudi possint, & hinc est cur emetica ve-

gio morbo opem ferant.

Quò meliùs hanc considerationem assequatur B. L. advertendum est fluiditatem liquoris quæ posita esse videtur in actuali partium suarum divisione quæ singulatim sumptæ nonnisi parvæ, duræ, & figuratæ moleculæ sunt, quæque unitæ in corpore contiguæ sunt, ad motum magis dispositæ ut perpetuò locum mutant, ut patet ex diversorum corporum cum illis facili ac promptâ miscelâ.

Diversa consistentia, structura, configuratio, & motio particularum fluidi peculiaris diversas quoque naturas & affectiones producit, ità moleculæ aquæ corpus componentes homogeneæ sunt, & sibi ipsis similes quamvis ab illis olei differant.

Jam verò si quocumque tempore duo fluida diversæ naturæ simul misceantur & eorumdem par-

ità adaptatæ sunt , ut tenui debiliq; nexu vinciantur , mixtio exindè emergens comparari poterit miscelæ corporum solidorum confusorum & simul mixtorum , quæ quoniam videmus mediante incerniculo denuò seperari , ita liquida commixta filtratione segregabuntur , quod probabiliter in hunc modum fit videlicet per fibrarum structuram , ac si secretio duorum corporum per cribrum fieret; quamobrem figuræ molecularum fluidi sunt ità poris , quos pertranseunt , congruentes , ut pori unius speciei tantum particulas recipiant , cæterasque non quadrantes excludant.

Hujusmodi mechanica facile disponere potest ad illam fluidorum , quæ prædicto modo uniuntur ; ast ubi molecularæ fluidum constituentes heterogeneæ sunt , vel fluida dissimilia componun

(quæ tamen ex partibus adeò firmè connexis conflantur ut respectu habito ad earumdem superficies haberi possint velut homogenea) tunc videtur adesse aliquid violentum & impellens , tale est fermentum vel aliud quod hujusmodi textum dividat ; probandum est hepar suâ structurâ absque ullo fermento alterationem præfatam in heterogeneis sanguinis partibus efficere.

Ut hoc clariùs elucescat considerandi mechanici fermentorum progressus in dissolvendis corporibus quique , ut omnes norunt , positi sunt in eorumdem intrusione , vel insinuatione intrâ poros partium corporis mixti , ubi fermenti particulæ tanquam totidem cunei , cum sint prætereà ab aliquo impellente motu dividunt , discindunt , dilacerant partes in quas insinuantur , & hoc pacto unitatem corporis destruant , verùm longiùs

temporis spatium requiritur ut fermentum munus suum obeat, quàm est quod absumitur in circulatione sanguinis per hepar perque minima vasorum sanguineorum capillamenta concessa, ut suprà observatum est. Prætereà si sanguis utut strictè unitus bili unà cum eadem nullo addito fermento intrà substantiam glandularum *cribriformium* impellatur, undè oscula exportantium similiter originem hauriunt, quæque vascula in fanitate non parere humoribus per ea incedentibus, vel in suorum pororum configuratione alterata supponantur, sanguinis & bilis textus dissolvitur, mixtioque separatur, ut diversi generis ductuum orificia non admittant partes nisi hæ eorum diametro convenient: quin ulterius mente assequi possumus quâ fit ut impulsiva sanguinis per hepar circulantis vis, satis sit ad san-

guinis moleculas in quam plurimum ductuum vehentium foramina pellendas & ubi adinstar metallorum igne fusorum partes prædictæ proplasmatis, vel matricis, in quam injectæ sunt, formam induant, proindèque quemadmodum fermentorum partes officium cunei supplentes in molecularum poros & heterogeneous mixtorum partes intromissæ vinculum & nexum eorumdem destruunt, ità hìc hæ particulae per arcta partis foramina advectæ in particulas disiciuntur & in congruentes partibus, quas pertranseunt figuras facefcunt.

Hanc hypothesim confirmasse videtur ipsa natura dum sollicitè sanguinis per jecur motum, penso eidem tributo æquavit, huicque fini in variis subjectis varia extructa sunt machinamenta hominem, qui erecto incedit capite, arteriâ hepatica capaciore, quàm in cæ-

teris animantibus , quibus corporis status horizontalis est , natura donavit: idem in equis observatur, quamvis hepatis molem grandiorē cæteris habeant, ac si hæc motus proportio foret magni momenti : etenim si sanguis ocius ad hepar moveretur vel majori impetu actioni præfatæ sufficiens non daretur tempus , vel violentiam partibus quas permeat, inferret (vid. Drak. anat. of. liver.)

Vis hæc si justo debilior esset non posset dissociare sanguinis moleculas , hunc per angustata partium spiracula trudendo, ubi denuò est , ita dixerim , modificandus , & undè præsentem formam; configurationem partium , & structuram obtineret.

Et hæc est ratio , cur homini arteria hepatica capacior : quàm in reliquis animalibus naturâ concessa fuerit, ut celeriori gradu mo-

veretur sanguis sicut & ob secundam rationem vi diminutâ per lienem transit quamcumque enim alterationem à sanguine acceptam vel in eodem factam dum per lienis substantiam transit, imaginetur quis; illud semper certum manebit sanguinis vim & energiam plurimum infractam ac debilitatam esse, qui ab liene ad portam properat, ut exindè deferatur ad hepar. Pretercà adest in splene lymphæ secretio, uti apparet ex lymphaticis quibus lien superbit (vid. Coup. antat. & Nuck, adenograph.) & probabile diminutionem lymphæ hic separatæ frænum quoddam sanguinis fluxui objicere.

Nullam rationem certam subesse puto, cur effectus, qui extracto splene contingere soleant in asplenis prædictæ extractioni, ut volunt quidam anatomici, potius

adscribantur. Ast si hoc ita foret, fatius erit ab inopia lymphæ billem diluentis id eruere ; licet enim in liene plurimum lymphæ è sanguine secedat, tamen minori coipâ respectu ad cæteras partes habito, quæ per sanguifera sanguini *portæ* famulantur.

Bilis in hepate ita separata partim per *porum biliarium*, partimque per alios ductus per substantiam ejus dispersos ad *vesicam felleam* adfertur ut exinde in intestina depluat ubi proximè accedit inquirendus usus quem præstat in animali æconomia, qui meo videri subtilisatio vel attenuatio chili est seu dissolutio materiæ alimentorum ex ventriculo in intestina lapsæ.

Huic fini destinata videtur pars una bilis huc delatæ à *vesicâ fellis* quæ conservanda est ad plures usus & ubi materia morâ contrahit ma-

jorem acrimoniam, fitque potentiùs dissolvens.

In statis hisce bilis evacuatio-
nibus difficile est conceptu quomo-
dò fel vel *bilis cystica* ad intestina
detrudi queat: nullæ enim mem-
branæ carneæ, ut antea vidimus,
ei insunt, quò contrahi valeat.

Bilis itaque hoc modo in in-
testina detrusa, chilo commisce-
tur: existimo id omne adjacen-
tium partium pressioni deberi,
quæ potissimum in inspiratione,
& tempore quo ventriculus cibariis
dilatatur exeratur, quique, dum ali-
menta in intestina descendunt,
cystidem comprimit.

Hinc usus vomitoriorum in ictero
elucescit, cum vi & energia sub-
tilium & lixivialium salium, fel
ulteriùs alimenta comminuit, quæ
ita divisa, ac in exiguissimas mo-
leculas contrita, gastricum & in-
testinalem liquorem alimentosis

partibus affatim ditant, quo sufficienter onusto, facile quis percipit quomodo à chiliferorum osculis sine ullo subreptitio fermento vel præcipitatione excipiatur liquidior, & magis alibilis cibariorum portio, dum crassior pervadendis lacteis inepta, per intestinalem tractum amandatur, quæ suo motu peristaltico impulsioni chили per lactea favet, non secus ac facum per intestin descensui.

In promovendâ intestinorum oscillatione bilis non videtur conferre tantum, quantum statuitur, etenim præter quam quod verisimile non est, ipsam sic chilo dilutam, ejus naturæ esse, ut tubum intestinalem ad contractionem provocet, quandò sincera & sola in sanitate nullo pacto cystidis tergores, ut ut æquè exquisitè sentiant ac intestina laceffit, atque in fluxu celiaco, ubi crebræ sunt dejectio-

nes colore videtur iis parum bilis commixtum æque chilosæ : quod procedit ex defectu bilis pastam chilaceam dividētis suffriantisque quo possit oscula lacteorum ingredi, ut conjecturari potest ex methodo medendi, in quâ attenuantia, ut in obstructis, nobis indicantur. Borellus cum animo reputaret sanguinis copiam hepar pertranseuntis proportionē habitū vasorum sanguiferorum eam statuit esse 25. partem totius massæ atque etiam bilem esse ex proportionē ad cætera liquida per hepatis substantiam discurrentia 10.^{am} partem eorundem putavit, atque pariter sustinet quantitatem bilis quæ in quâlibet sanguinis per jecur circulatione secernenda est, si ductus biliferi aperti liberique sunt, vasa que seu venæ reducentes nullâ obstruentæ materiâ infarctæ, respondere diametro ductuum bilioso-

rum , quæ quantitas , unius diei spatio , sexdecies superabit quæ in toto corpore continetur cum bilis tantum ex chilo promanet ; juxta illum , concludit ex his necessitatem circuitûs bilis hancque per meze-raicas venas ad intestina appellere , ut exindè cum sanguine deferatur ad hepar. Verùm pace tanti viri dicendum , quæcumque ponatur necessitas circulationis bilis eam nunquam in sanguinem reduci cum autopsiâ compertum habeamus :
 1°. Nullam aliam viam præter lactea adesse quæ ab intestinis ad sanguinem ducat. 2°. Nullum liquorem in sanitate sub formâ bilis remeare ut ex sapore chili colligitur. 3°. Nullum proximius iter ad jecur perstare nisi quod per cor ad ipsum ducit.

Ast præter hæc nullo stabili fundamento innititur ad persuadendum bilem non oriri ex sanguine,

396 TRACTATUS

& exemplum quod de Serpentibus affert, in quibus *vesica fellea* cum poro biliario turgescunt bile post plurium mensium inedia, non secus ac in quovis alio tempore: hoc exemplum nihil arguere videtur nisi quod bilis materia non à parte sanguinis tubrà suggeratur, quodque non sine ratione suprà dicebamus bilem & purpuream gelatinosam sanguinis partem non distinguì, nisi in majori vel minori particularum attritione, quæ repetitis circuitibus obtinetur; ità in calidis constitutionibus ubi viget pulsus, grandiorique gradu movetur sanguinis videmus bilis ubertatem & subjecta admodum in biliosas ægritudines prona, verùm ut ulterius exemplum persequar, si bilis ex chilo, unicè suppeditaretur vel ex partibus esculentorum recenter exceptis; post iteratos sanguinis in orbem motus, & jejunium

nium diù toleratum , bilis penuria emergeret ; quod non convenit casui superiùs adducto de fame plurium mensium , siquidem ex prælaudato auctore ; quâlibet circulatione , bilis portio deorsùm unâ cum fæculentâ alimentorum parte per intestina præcipitatur , quod copiam ejusdem diminuere deberet, quod tamen experientiæ reluctatur.

Ulteriùs negare possem (non enim id probavit, (biliferos tubulos semper in summo distensionis esse ; tales profecto esse possunt cum bilis secreta ad eos replendos suffecerit ; verùm hic non evincitur necessitas hujus perpetuæ expansionis , sed tantum ità esse à naturâ constructos , ut pro majori vel minori quantitate secreti liquidi , tantum educant , quantum ab organis secretoriis acceperint.

Nihilominùs tutò affirmari po-

test in uno tantum sensu magnam partem bilis in sanguinem per lactea remeare : etenim sicuti analysi bilis edocemur ; hæc confurgit ex abundanti aquâ , pauco oleo , & sale : hæc aqua , quæ est serosa vel lymphatica sanguinis pars & quæ sanè majorem partem sanguinis constituit , magni est momenti , usque dum vehiculum est partium quas dissolvere potest uti superiùs notatum est , de chilificatione.

Hanc lympham ergo asserere possumus idem officium præstare iis partibus sanguinis quibuscum mixta nomen bilis assequitur , quam diluit , earumque vehiculum est , atque benè intermixta , eisdem ad intestina deportandis inservit , ubi peractâ cum contentis in fistulâ intestinali miscelâ , partes quæ pertranseundis lacteis destinatæ sunt ab iisdem fugentur ut indè ad sanguinis lacum migrent. Ast ut antea

observatum est nec gutta hujus humoris formam bilis sensibilem habens ad sanguinem remeat dum sanitate fruitur homo, bilis penes diversa vitia in qualitate vel quantitate sæpiùs magnos accersit morbos.

Quod naturalem statum attinet, quando in sanguine biliosæ partes abundant, non eò usquè ut ordinem functionum animalis æconomix interturbent (aliter morbi orirentur) tunc exsurgit temperamentum, veteribus dictum *calidum hepar*, observamus corpora nostra semper in calidos affectus prona esse, ut febres, & è converso ubi minor adest earumdem particularum in sanguine quantitas, via ad frigidos sternitur, ut obstructions, cachæxiam, ista in morbofo, quæ alterationes & quantæ proveniant facilè indagari potest? Uberiori bile fluidior spirituosior efficitur sanguis: pariori

idem crassior & effoetus.

Bilem in qualitate delinquere , demonstrari credo posse ex alterato colore , qui in præternaturali statu apparet : naturalis enim est flavus : morbosus ad luteum profundiorē accedens quemadmodum & ex leviori colore viridi , obscurum viridem induit , indèque in atrum transit , uti periculis multis , ubi acidis miscetur bilis , elucescit. Hæc enim bilem coagulare videntur (uti innuimus) in substantiam non multum à lapideâ abludentem ex *felleâ* excretam : affusio spiritûs cornu cervi concretam dissolvit , modò non summè coierit. Ast an liquor sub specie acidī vel hujus vi pollens in jecore connubium cum bile ineat ? Ambigi potest. Non est tamen negandum eam in ventriculo & intestinis tali humori acido occurrere posse , ubi (juxtà gradum fermenti-

tationis initæ) producuntur flatu-
lentiæ, vomitus, cholera-morbus,
diarrhæa, dysenteria, juxta partes
affectas, vel quas liquida ista diver-
sæ naturæ impetunt.

Ex Bilis cum cæteris vitiatis hu-
moribus effervescentiâ flatus mo-
ventur sæpè, quâque magna pars
symptomatum quibus histericæ &
attra bile vexati corripri soleant ex-
planari potest. Quemadmodum
videmus histericas colicas sæpiùs
in morbum arquatum desinere.

Fermentatione bilis cum cor-
ruptis succis quos in primis viis
invenit nidulantes prima febrium
symptomata explicari valent. Pari-
terque eorum consuetudina uti faten-
tur practici & huic speculationi
periodicæ bilis felleæ evaculatio-
ni *intermittentium* febrium doctri-
na meliùs innixa videtur, quàm
hactenus fuit. Ast hæc ulterius pro-
sequi, extrà meum institutum di-

vagari esset , quocircà gradum hic
sistere juvat, hujusmodi specimina
ulteriori tuæ indagini relicturus.

F I N I S.





